

Р. ний

1876.

£ $\frac{3}{191}$

✓

Не копировать



3
191. На отиве

Не копировать

стр 1-420

ДОМАШНІЙ
ГОМЕОПАТИЧЕСКІЙ ЛЕЧЕБНИКЪ.

СОЧИНЕНІЕ

Д-РА К. МИЛЛЕРА.

ПЕРЕВОДЪ СЪ ДОПОЛНЕНІЯМИ И ВВЕДЕНІЕМЪ

В. ДЕРИКЕРА.

ИЗДАНИЕ Ф. ФЛЕММИНГА, ПЯТОЕ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

ВЪ ТИПОГРАФИИ ГОГЕНФЕЛЬДЕНЪ И КОМП.

(Вас. Остр., 3 л., № 44).

1876.

Книга имеет:

деревянная
ст. книга
и сентября
подпись


Печатных листов	Выпуск	В переплестн. един. соедин. №№ вып.	Таблиц	Карт	Иллюстр.	Служебн. №	Наклад и исписка	
28		1876				79		139 362

ДОМАШНІЙ
ГОМЕОПАТИЧЕСКІЙ ЛЕЧЕВНИКЪ.

WILLIAM

WILLIAM

на отв. 804-88
9487-3



ДОМАШНІЙ

ГОМЕОПАТИЧЕСКІЙ ЛЕЧЕБНИКЪ.

СОЧИНЕНІЕ

Д-РА К. МИЛЛЕРА.

ПЕРЕВОДЪ СЪ ДОПОЛНЕНІЯМИ И ВВЕДЕНІЕМЪ

В. ДЕРИКЕРА.

ИЗДАНІЕ Ф. ФЛЕММИНГА, ПЯТОЕ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

ВЪ ТИПОГРАФИИ ГОГЕНФЕЛЬДЕНЪ И КОМП.

(Вас. Остр., 3 л., № 44).

1876.

82498·0



2012401359

ПРЕДИСЛОВІЕ

КЪ ЧЕТВЕРТОМУ И ПЯТОМУ ИЗДАНИЯМЪ.

Въ предисловіи къ первому изданію (1856 г.) намъ еще казалось нужнымъ нѣкоторымъ образомъ оправдывать появленіе этой книги, чтобы не подать повода къ заключенію, будто бы мы, ради книгодѣльческой спекуляціи, устраняемъ во мнѣніи публики надобность въ личномъ присутствіи и пособіи врача. Мы объяснили, что рядомъ съ ученою медициною и съ врачами, къ пособію которыхъ больные прибѣгаютъ въ важныхъ или опасныхъ случаяхъ, во всѣ времена и при всѣхъ смѣнахъ ученыхъ медицинскихъ теорій всегда существовали такъ называемыя “домашнія средства”, иногда заимствованныя у науки, иногда почерпнутыя изъ преданій народной медицины. Матери семействъ, особенно живущія вдали отъ большихъ городовъ, по преимуществу всегда владѣли знаніемъ этихъ домашнихъ средствъ, знаніемъ совершенно необходимымъ для оказанія первой помощи заболѣвшему. Въ важныхъ случаяхъ такая

помощь облегчаетъ трудъ врачу и часто предупреждаетъ смертельную опасность; въ неважныхъ можетъ устранить всю болѣзнь. Не всегда и не во всякое время можно имѣть подъ рукою врача, мѣжду-тѣмъ какъ потребность скорой помощи и надежнаго совѣта не можетъ быть отложена. Отсюда произошли домашніе лечебники, или справочныя книги, къ которымъ бы въ нужномъ случаѣ можно было обратиться за указаніемъ, какъ къ своему домашнему врачу. Правда, что многія подобныя книги не соотвѣтствуютъ своему назначенію; но отъ нуждающихся въ домашнемъ лечебникѣ зависитъ купить его по совѣту и указанію своего довѣреннаго врача.

Написавъ свою справочную книгу для домашняго употребленія за отсутствіемъ врача и, желая придать ей необходимую полноту, авторъ чувствовалъ, что для имѣющихъ возможность призвать врача, онъ заключаетъ въ себѣ много лишняго и, главное, слишкомъ труднаго, а потому при всякой сколько-нибудь важной болѣзни напоминаетъ о необходимости поручить леченіе опытному врачу и предостерегаетъ отъ собственныхъ попытокъ, могущихъ остаться безуспѣшными. Для избѣжанія лишнихъ повтореній эти предостереженія мы здѣсь замѣняемъ общимъ объясненіемъ значенія книги.

чемъ, если принять въ соображеніе нынѣ издающіеся медицинскіе календари, то мы смѣло можемъ рекомендовать ее и начинающимъ врачамъ.

Мы полагаемъ, во-первыхъ, что для неимѣющихъ возможности пригласить врача (въ деревнѣ, въ дорогѣ и т. д.) предостереженіе не лечить самимъ, ни къ чему не служитъ, а имѣющіе возможность пользоваться совѣтомъ знающаго дѣло, не станутъ, ничего не понимая, лечить важную болѣзнь, хотя-бы имѣли подъ руками сто лечебниковъ; во-вторыхъ, что всякій, пользующійся подобною книгой, самъ знаетъ, когда призвать врача.

Теперь потребовалось пятое изданіе; нѣмецкій; оригиналъ въ прошломъ году вышелъ девятымъ слѣдовательно, книга полезна и, сколько намъ извѣстно, не умалила врачебной практики тамъ, гдѣ есть врачи-гомеопаты, по той простой причинѣ, что въ такомъ дѣлѣ, какъ врачеваніе болѣзней, никакая книга не можетъ замѣнить знающаго человѣка. Не говоря уже о положеніяхъ, у насъ въ особенности частыхъ, въ которыхъ люди разстояніями лишены всякой возможности пригласить врача, хорошій домашній лечебникъ не только не вредить, но, напротивъ помогаетъ врачу, облегчаетъ ему трудъ: мелкіе случаи заболѣванія, при знакомствѣ окружающихъ съ потребными срѣдствами, уничтожаются безъ напраснаго безпокойства; внезапно возникающія и быстро развивающіяся опасныя болѣзни, будучи захвачены въ самомъ началѣ, хотя бы только общими паллятивными срѣдствами,—какъ напримѣръ всѣ воспаленія Акони-томъ,—въ бо́льшей части случаевъ предупреждаютъ грозящую опасность и даютъ неоцѣнимый

выигрышъ времени для спокойнаго приведенія дѣла къ благополучному исходу. Не истинный врачъ, а только эгоистъ-ремесленникъ можетъ съ неудовольствіемъ взирать на самопользованіе, подчасъ мѣшающее ему изъ мухи сдѣлать слона.

Имѣя въ виду только практическую сторону лечебника, мы въ первыхъ двухъ изданіяхъ пропустили большую часть теоретическаго объясненія основаній и правилъ гомеопатіи и ограничились только краткими указаніями самаго необходимаго. Въ третьемъ изданіи, на основаніи заявленій читателей, уже оказалось необходимымъ нѣсколько пополнить эту часть. Въ четвертомъ мы развили, ее еще больше, въ особомъ введеніи, но всетаки разумѣется, даемъ лишь сокращенный сводъ общей гомеопатической терапіи или теоріи гомеопатіи.

Въ практической части мы, во-первыхъ, старались группировать болѣзни болѣе систематически и такъ, чтобы облегчить читателю отысканіе ихъ; во-вторыхъ, мы сдѣлали еще разъ значительныя дополненія, частію по сочиненіямъ Гиршеля, Бера, Кафки и др., частію по собственнымъ наблюденіямъ. Къ числу такихъ дополненій принадлежатъ въ особенности статьи о болѣзняхъ печени, селезенки, мочевыхъ и половыхъ органовъ, сифилисѣ, полнокровіи, малокровіи, приливахъ крови, прилицивомъ воспаленіи глазъ и душевныхъ болѣзняхъ.

В. Дерикеръ.

Ноябрь 1875.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

Предисловіе.

Введеніе.

Общее понятіе о болѣзни и леченіи. Здоровье и болѣзнь.	1
Происхожденіе и свойства болѣзни.	5
Излечимость и неизлечимость болѣзни. Самоисцѣленіе и искусственное леченіе	12
Старая и новая медицина	14
Ганеманъ и его открытіе	15
Отношеніе гомеопатіи къ факультетской медицинѣ . .	19
Старый аллопатическій законъ: <i>contraria contrariis cu-</i> <i>rantur</i>	22
Новый законъ и намеки на него въ древности. Иппо- кратъ и Парацельсъ	27
Специфизмъ. Парацельсъ и Радемахеръ	29
Настоящее значеніе специфизма.	30
Логическая послѣдовательность гомеопатическихъ пра- вилъ	31
Дознаніе болѣзни. Осмотръ	33
Допросъ	34
Исторія болѣзни	—
Картина болѣзни	35
Выборъ лекарства	36
Дѣленіе лекарствъ и формы препаратовъ	39
Сила лекарствъ	41
Дача лекарствъ. Величина приѣма	42
Повтореніе приѣмовъ	43
Гомеопатическое ожесточеніе.	45
Антидоты.	46
Сохраненіе лекарствъ	—

Вспомогательныя средства	47
Дієта	50

ГЛАВА I.

§ I. Болѣзни головы.

1. Головная боль	53
2. Головокруженіе.	62
3. Воспаленіе мозга	64
4. Головная водянка	66
5. Лицевыя боли	68
6. Флюсъ	71

§ II. Болѣзни глазъ.

1. Катарральное и ревматическое воспаленіе глазъ.	72
2. Золотушное воспаленіе глазъ	75
3. Прилипчивое воспаленіе глазъ	77
4. Слабость зрѣнія	80

§ III. Болѣзни уха.

1. Воспаленіе околоушныхъ железъ, свинка	82
2. Воспаленіе уха	83
3. Ушная боль	84
4. Течь изъ ушей.	85
5. Шумъ въ ушахъ и глухота.	86

§ IV. Болѣзни носа.

1. Насморкъ	90
2. Опухоль носа и болячки	92
3. Внутренняя опухоль и полиппъ въ носу.	94
4. Кровотеченіе носомъ.	—

§ V. Болѣзни рта.

1. Молочница, афты	96
2. Гнилость и антоновъ огонь во рту	97
3. Воспаленіе языка	99
4. Дурной запахъ изо рта.	—
5. Слюнотеченіе	100
6. Измѣненіе вкуса и обложеніе языка.	101
7. Зубная боль.	103

§ VI. Болѣзни гѣва и горла.

1. Воспаленіе гѣва, жаба	113
2. Дифтеритъ, гнилая жаба	115
3. Крупъ, плевистая жаба гортани	117
4. Кашель, острый и хроническій катарръ	120
5. Коклюшъ	126
6. Гриппъ	129
7. Охриплость и потеря голоса	—
8. Кровохарканіе	132

§ VII. Болѣзни груди.

1. Воспаленіе легкихъ	135
2. Воспаленіе подреберной плевы	139
3. Воспаленіе сердца	141
4. Сердцебіеніе	—
5. Одышка и спазмы въ груди	143
6. Судороги въ груди у дѣтей. Малларовъ одышка.	146
7. Воспаленіе грудной железы у женщинъ, груд- ница	147
8. Болящіе соски	148
9. Воспаленіе грудобрюшной преграды	149

§ VIII. Болѣзни желудка.

1. Слабость желудка, невареніе, катарръ желудка.	150
2. Разстройство желудка	153
3. Тошнота и рвота	155
4. Спазмы, судорожныя схватки и боль желудка.	157

§ IX. Болѣзни живота.

1. Воспаленіе	161
2. Колика, рѣзь въ животѣ	164
3. Поносъ	167
4. Натужной кровавый поносъ, дисентерія.	172
5. Холерина	174
6. Холера	175
7. Запоръ	177
8. Пученъе отъ вѣтровъ.	181
9. Грыжа.	182
10. Выпаденіе заднепроходной кишки.	184

11. Геморрой	185
12. Глисты	188
§ X. Болѣзни печени и селезенки.	
1. Воспаленіе и другія болѣзни селезенки . . .	196
2. Желчныя страданія	198
3. Воспаленіе печени	200
§ XI. Болѣзни мочевыхъ и половыхъ органовъ.	
1. Разстройство мочеотдѣленія	203
2. Воспаленіе почекъ, пузыря и мочевого канала.	207
3. Катарръ мочевого пузыря и канала	210
4. Нервные и судорожныя страданія мочевыхъ органовъ	211
5. Органическія болѣзни мочевыхъ органовъ . .	212
6. Гоноррея, трипперъ, перелой.	213
7. Опухоль и воспаленіе ядеръ.	217
8. Сифилисъ	218
9. Разстройство регулъ и сопровождающія стра- данія. Кровотеченія	224
10. Бѣли	230
§ XII. Болѣзни кожи.	
1. Рожа	232
2. Поясовидная рожа	233
3. Скарлатина.	234
4. Красуха	236
5. Корь	237
6. Оспа	238
7. Просовидная сыпь и крапивная лихорадка. .	239
8. Чесотка	241
9. Зудъ	243
10. Лишай	244
11. Садно, обопрълость.	245
12. Вередь, чирей, карбункулъ	246
13. Ноготьда	247
14. Отмороженъе	248
15. Ожегъ	249
16. Язвы	—

17. Мѣшечная опухоль или подкожный желвакъ.	251
18. Бородавки и мозоли.	252
19. Печеночныя пятна и веснушки.	253
20. Угри, прыщи на лицѣ и мѣдный носъ	254
21. Молочный струщъ	—
22. Парша на головѣ	255

ГЛАВА II.

§ XIII. Общія болѣзни.

1. Ревматизмъ	256
2. Ломота, подагра	260
3. Боль въ бедрѣ вертлужная боль	262
4. Боль въ поясницѣ	263
5. Горячка.	264
6. Тифъ, нервная и гнилая горячка	268
7. Перемежающаяся лихорадка.	275
8. Приливъ крови	281
9. Полнокровіе	282
10. Ударъ, параличъ и онѣмѣніе	286
11. Малокровіе и блѣдная немочь	289
12. Золотуха	292
13. Рахитизмъ, англійская болѣзнь.	294
14. Зобъ	295
15. Чахотка.	296
16. Цынга и кровавыя пятна.	297
17. Водяная.	298
18. Судороги и конвульсіи.	302
19. Эпилепсія, падучая болѣзнь.	304
20. Виттова пляска	306
21. Сголбнякъ и корча челюстей	308
22. Обморокъ	—
23. Безсонница, страданіе во время сна.	310

ГЛАВА III.

§ XIV. Душевные болѣзни 313

ГЛАВА IV.

§ XV. Болѣзни беременныхъ и роженицъ . . .	316
§ XVI. Дѣтскія болѣзни	326
Болѣзни новорожденныхъ	334

ГЛАВА V.

§ XVII. Механическія поврежденія	
Ушибы, раны, вывихи	348
§ XVIII. Отравленія	352
Химическіе антидоты	358
Гомеопатическое леченіе отравленныхъ . . .	358
Гомеопатическіе антидоты	361

Списокъ лекарствъ, предложенныхъ въ этой	
книгѣ съ объясненіемъ сокращеній . . .	367
Препараты гомеопатическихъ лекарствъ . . .	374
Составъ аптекъ	395

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ БОЛѢЗНЕИ.

А.

Англійская болѣзнь 294.
 Антидоты химическіе 253.
 — гомеопатическіе 361.
 Антоновъ огонь 251.
 — во рту 97.
 Апплексія 286.
 Аскариды 189.
 Атрофія 340.
 — ядѣрь 218.
 Афты 96.

Б.

Берда боль 262.
 Безсонница 310.
 — у новорожденныхъ 345.
 Безпокойство новорожден. 345.
 Беременныхъ болѣзни 316.
 Біеніе сердца 141.
 Блѣдная немощь 55, 289.
 Болячки носа 91, 93.
 Болящіе соски 148.
 Бородавки 252.
 Брайтова болѣзнь 205
 Бубонъ 223.
 Бѣлая опухоль 325.
 Бѣли 230.
 Бѣзкъ въ мочѣ 205.
 Бѣшенство 314.
 — собачье 361.

В.

Вереть 246.
 Вертлужная боль 262.

Чрайтова болѣзнь 502.
 Веснушки 253.
 Видѣнія 314.
 Вина, страданія отъ 55, 62, 95,
 153.
 Виттова пляска 306.
 Вкуса измѣненія 101.
 — извращеніе 318.
 — потеря 102.
 Водяная 298.
 Водянка головная 65, 66.
 — шулять 218.
 Волось выпаденіе 326.
 Воспаленіе брюшины 161.
 — глазъ 72.
 — — у новорожденныхъ 343.
 — — золотушное 75.
 — — ревматическое 72.
 — — катарральное 72.
 — гемерроидальныхъ шишекъ
 188.
 — горла 117, 120.
 — грудной железнъ 147.
 — грудобрюшной преграды
 149.
 — зѣва 113.
 — живота 161.
 — кишекъ 161.
 — легкихъ 135.
 — матки 326.
 — мозга 64.
 — — вслѣдствіе ушиба 65.
 — — — солнечного
 удара 65.
 — мочевого пузыря 207.
 — околоушныхъ железнъ 82.

Воспаленіе печени 200.
 — подреберной плевы 139.
 — почекъ 207.
 — селезенки 196.
 — сердца 141.
 — уха 83.
 — ядеръ 217.
 — языка 99.
 Вывихъ 348, 351.
 Выкиды, расположеніе къ 320.
 Выпаденіе заднепроходной киш-
 ки 184.
 Вѣки парализъ 75.
 — затвердѣніе 76.
 Вѣтры, пученье 181.

Г.

Гангрена 251.
 Гастрическая головная боль 62.
 — лихордка 277, 268
 Геморрой 185.
 Геморроидальная колика 164.
 Геморроид. кровотеченіе 188.
 Геморроидальныхъ шишекъ вос-
 паленіе 188.
 Глаза, болѣзни 72.
 Глазъ воспаленіе 72.
 — — золотушное 75.
 — — катарральное 72.
 — — приличивое 77.
 — — ревматическое 72.
 — — отъ инороднаго
 тѣла 74.
 — — отъ механич. по-
 вреженій 74.
 — — уноворожден 343.
 — скашиваніе 75, 77.
 — моклость 75.
 — темныя и свѣтвыя явленія
 въ 81.
 — напряженіе, утомленіе 74.
 Глухота 90.
 Глисты 188.
 — круглые 190.

Глисты тесемочный 191.
 Гнилая жаба 115.
 Гнѣва слѣдствія 314.
 Головная боль 53.
 — — гастрическая 56.
 — — истерическая 57.
 — — катарральная 55.
 — — ломотная 57.
 — — нервная 56.
 — — ревматическая 57.
 — — сифилитическая
 58.
 — — отъ крѣпкихъ на-
 питковъ. 55.
 — — отъ малокровія 55.
 — — отъ прилива кро-
 ви 55.
 — — отъ умствен. за-
 нятій и сидя-
 чей жизни 54.
 — — отъ ушиба 54.
 Головная водянка 65, 66.
 Головъ, парша на 255.
 Головокруженіе 62.
 Голоса потеря 129.
 Гоноррея 213.
 Горла болѣзни 113.
 — воспаленія 113.
 Горячка 264.
 — гнилая и нервная 268.

Грибовидные наросты 251.
 Гриппъ 129.
 Грудн болѣзни 135.
 — судороги въ 143.
 — — у дѣтей 146.
 Грудница 147.
 Грудной железы воспаленіе 147.
 Грудобрюшной преграды воспа-
 леніе 149.
 Грыжа 182.

Д

Десны, боль, опухоль 107.
 — отпаденіе 127.

Дикое мясо 251.
 Дисентерія 172.
 Дифтеритъ 143.
 Досады слѣдствія 314.
 Дурной запахъ изо рта 99.
 Душевные волненія 62, 145.
 — болѣзни 313.
 Дѣтскія болѣзни 326.

Ж.

Жаба 113.
 — гнилая 145.
 — плевиная гортани 117.
 Жаровая сыпь 245.
 Желвакъ подкожный 251.
 Желѣзы грудной воспаленіе 147.
 — околоушной воспаленіе 82.
 — околоушной затвердѣніе 83.
 — виндаливидныхъ вѣсп. и нагноеніе 113.
 — ушибъ 351.
 Желудка болѣзни 150, 157.
 — катаръ 150.
 — несвареніе 150.
 — обремененіе 153.
 — расстройство 153.
 — слабость 150.
 — спазмы, схватки 137.
 Желтуха 198.
 — у новорожденныхъ 199.
 Желчная колика 199.
 — лихорадка 198.
 Желчные камни 199.
 — состоянія 198.
 Живота болѣзни 161.
 — вздутіе 181.
 — воспаленіе 161.
 — колика, рѣзь 164.

З.

Задержаніе мочи 203.
 — — у новорожденн. 337.

Заднепроходной кишки выпаденіе 184.

Заложеніе носа 91.
 Запахъ дурной изъ носу 93.
 — — изо рта 99.
 Затвердѣніе на вѣкъ 76.
 — околоушной желѣзы 83.
 — ядѣрь 217.

Запоръ 177, 322.
 — у груди дѣтей 338.
 Зобъ 295.
 Золотуха 292.
 Зрѣнія слабость 80.
 — расстройства 80, 82.
 Зубная боль 103.
 — во время регулъ 110.
 — у беременныхъ 110.
 Зубовъ прорѣзаніе 331, 342.
 — шатаніе и порча 107.
 — сохраненіе 111.

Зудъ 243.
 — въ заднемъ проходѣ 244.
 — въ мошонкѣ 218.
 Зѣва болѣзни 113.
 — воспаленіе 113.

И.

Измѣненіе вкуса 101.
 Изжога 155.
 Изнурительной болѣзни слѣдствія 142.
 Икота 155.
 — у груди дѣтей 340.
 Икры, судороги 303.
 Ипохондрія, меланхолія 314.
 Испражненій дурное качество 170.
 Искры въ глазахъ 81.
 Истерика 303.
 Испугъ, слѣдствія 142, 314.
 Истерич. головная боль 56.
 Истощеніе послѣ родовъ 324.
 Истощеніе 229, 343.

Б.

- Камни желчные 199,
 — мочевые 213.
 Карбункулъ 246.
 Катарръ дыхат. путей 120.
 — желудка 150.
 — мочевого канала 240.
 Каченіе въ экипажѣ и на водѣ 62.
 Кашель 120.
 — со рвотою 124.
 — у новород. 343.
 Кишечкѣ воспаленіи 161.
 Кишки заднепроходной выпаденіе 184.
 Кожи болѣзни 232.
 — у грудн. дѣтей 344.
 Колотые въ селезенку 197.
 Коклюшъ 126.
 Колика 164.
 — геморроидальная 188.
 — желчная 199.
 Конвульсіи 302, 324.
 — послѣ родовъ 324.
 — у дѣтей 341.
 Корча челюстей 308.
 Корь 236.
 Костей поврежденіе 351.
 Костоѣда 251.
 Кошмаръ 312.
 Крапивная лихорадка 239.
 Красуха 236.
 Крикъ у дѣтей 327, 345.
 Кровавый поносъ 172.
 Крови приливъ 281.
 Кровотеченіе носомъ 95.
 — маточное 228, 219, 318.
 — у беременныхъ 229, 318.
 Кровоточивая язва 251.
 Кровохарканіе 132.
 Кровяныя пятна 297.
 Крупъ 117.
 Крѣпкихъ напитковъ, страд. отъ 55, 62.

Л.

- Легкихъ воспаленіе 135.
 Легкихъ чахотка 297.
 Лихорадка крупивная 239.
 — молочная 223.
 — перемежающаяся 275.
 — родильная 325.
 Лицевая боль 68.
 — сыпь на 76, 253, 254.
 Лишай 244.
 Ломота 260.
 Ломотная головная боль 57.

М.

- Малокровіе 55, 289.
 Матки воспаленіе 326.
 Меланхолія 314.
 Механическія поврежденія 54,
 62, 65, 74, 348.
 Мешечная опухоль 251.
 Миллрова одышка 146.
 Мнимо мертво-рожденные 334.
 Мозга воспаленія 64.
 Мозоли 252.
 Молока отдѣленія 323.
 — дурное качество 324.
 — течь 323.
 Молочница 96.
 Молочная лихорадка 323.
 Молочный струнъ 254.
 Мочевого канала воспаленіе 207.
 Мочевого канала катарръ 240.
 — пузыря — 240.
 — — воспаленіе 207.
 — — судороги 211.
 Мочевые осадки 206.
 Мочевой камень 212.
 Мочевыхъ органовъ болѣзни 203.
 Мочевыхъ органовъ болѣзни органическія 212.
 Мочевыхъ органовъ болѣзни нервныя и судорожныя 211.
 Мочеотдѣленія разстройство 203.

Мочерѣзь 203.
 Мочи задержаніе 203.
 — — у беременныхъ 317.
 Мочи задержаніе у дѣтей 337.
 Мочи качество 204.
 Мочезнуреніе бѣлковиднос 205,
 — сахарное 206.
 Мочетеченіе 205.
 — у дѣтей 338.
 Мошонка, зудъ 218.
 — линая 218.
 Мушки въ глазахъ 81.
 Мѣдный носъ 154.

Н.

Надкостной плевы поврежденіе 351.
 Напитковъ крѣпкихъ слѣдствія 55, 62, 95, 153.
 Наросты грибовидные 231.
 Нарывы 114, 148, 246, 247, 294.
 — на глазахъ 76.
 Насморкъ 90.
 — хроническій 92.
 — у новорожденныхъ 348.
 Нанужной кровавый поносъ 172.
 Немочь бѣдная 289.
 Нервная боль 56.
 — горячка 268.
 — головная боль 56.
 Несвареніе 150.
 Новорожденныхъ болѣзни 334.
 Ноготѣда 247.
 Носа болѣзни 90.
 — болячки 91, 93.
 — внутренняя опухоль 94.
 — заложеніе 91.
 — кровотеченіе 94.
 — опухоль 92, 94.
 — полипъ 94.
 Носъ мѣдный 254.

О.

Обложенеіе языка 102.
 Обморокъ 308.
 Обопрѣлость 245, 336.
 Общія болѣзни 256.
 Огорченія слѣдствія 142.
 Одышка 143.
 — милларова 146.
 Огонь антоновъ 251.
 Ожегъ 249.
 Околоушныхъ железъ воспаленіе 82.
 Оштыніе 286.
 Опухоль 348.
 — бѣлая 425.
 — головы у дѣтей 335.
 — мѣшечная 251.
 — отъ ушиба 348.
 — груди у новорожденныхъ 336.
 — щеки 71, 107.
 — ядеръ 217.
 — языка 99.
 Оспа 238.
 — вѣтряная 238.
 Отмороженіе 248.
 Отравленія 352.
 Отравленныхъ гомеоп. леченіе 358.
 Отрыжка 154.
 Охриплость 129.

П.

Падучка 304.
 Памяти слабость 315.
 Параличъ 286.
 — вѣкъ 288.
 — языка 288.
 Парша на головѣ 255.
 Перелой 213.
 Перемежающаяся лихорадка 275.
 Печени болѣзни 196.
 — воспаленіе 200.

Печеночныя пятна 253.
 Плевры надкостной поврежденіе 354.
 — подреберной воспаленіе. 139.
 Пляска Виттова 306.
 Поврежденія механическія 348.
 — костей 354.
 — надкостной плевры 354.
 Подагра 260.
 Подкожный желвакъ 254.
 Подреберной плевры воспаленіе 139.
 Подтеки 336, 348.
 Полигъ въ носу 94.
 Полнокровіе 282.
 Половыхъ органовъ болѣзни 203.
 Помятія у новорожд. 335.
 Поносъ 167.
 — кровавый, натужной 172.
 — у дѣтей 340.
 — со рвотою 157, 174, 175,
 Послѣдъ 321.
 Послѣродовыя боли 322.
 Петеря вкуса 101.
 — голоса 129.
 Потовая сыпь 345.
 Потуги 324.
 Почекъ воспаленіе 207.
 — боль въ 241.
 Поясничная боль 263.
 Поясовидная рожа 233.
 Приливъ крови къ головѣ 55, 281.
 — головокруженіе отъ 64.
 Пролежни 275.
 Прорѣзаніе зубовъ 334, 342.
 Просовидная сыпь 239.
 Противоядія гомеопатическія 364.
 — химическія 37.
 Прыщи на лицѣ 254.
 Пульсъ число биеній 330.
 Пуговины воспаленіе 335.
 Пученъе отъ вѣтровъ 181 35.

Пученъе у груди. дѣтей 338.
 Пузыря мочевого воспаленіе 207.
 — — катарръ 240.
 Пятна кровавыя 297.
 — печеночныя 253.
 — на глазахъ, на роговинѣ 70.

Р.

Разстройство желудка 153.
 — мочеотдѣленія 203.
 — регуль 224.
 Раковидная язва 251.
 Ракъ 241.
 — ядерь 247.
 Раны 348.
 Расположеніе къ выкиду 349.
 Растяженіе жилъ 347.
 Рахитизмъ 294.
 Рвота 155.
 — кровью 156.
 — съ поносомъ 157, 174, 175.
 — у груди. дѣтей 336, 339.
 — у беременныхъ 317, 156.
 — при глустахъ 155.
 Ревматизмъ 256.
 Ревматическая головн. боль 57.
 Ревматич. воспаленіе глазъ 72.
 Регулы, боли во время 226.
 — остановка 225.
 — разстройство 224.
 Родимчикъ 341.
 Роды преждевременныя 348.
 — кровотеч. во время 328.
 Родильная лихорадка 325.
 Рожа 232.
 — у новорожд. 335.
 — поясовидная 233.
 Рожистоѡ воспаленіе 232, 349.
 Роженицъ болѣзни 316.
 Рта болѣзни 96.
 — антоновъ огонь 97.
 — дурной запахъ 99.
 — гнилость 97.

- Рѣзь въ животѣ 164.
 — во время регуль 164.
 — у грудн. дѣтей 338.

С.

- Садно 245.
 Свинка 82.
 Свѣтобоязнь 76.
 Селезенки воспаленіе 196.
 — опухоль 197.
 Сжатіе челюсти судорожн. 307.
 Сердцебіеніе 141.
 Сердца воспаленіе 141.
 Сибирская язва 360.
 Сидячая жизнь 54
 Синяки 348.
 Сифились 218.
 Сифилитическая головн. боль 57.
 Скарлатина 234.
 Скашиваніе глазъ 74, 77.
 Скорбутъ 297.
 Слабость зрѣнія 80.
 — желудка 150.
 — памяти 315.
 — послѣ родовъ 324
 Слезотеченіе 75.
 Слюнотеченіе 100, 108.
 Собачье бѣшенство 361.
 Солитеръ 191.
 Сонъ, страданія во время 310.
 Соски болящія 148.
 Сосочковъ грудн. отвердѣніе 336.
 Спазмы въ груди 143.
 — въ желудкѣ 157.
 — во время регуль 226.
 Спячка 312.
 Стѣнь, кошмаръ 312.
 Столбнякъ 308.
 Страха слѣдствія 142.
 Струпь молочный 254.
 — на лицѣ 76.
 Судороги 302, 324.
 — у дѣтей 341.
 — — въ груди 143.
 146.

- Судороги послѣ родовъ 324.
 — при понось 175.
 — при прорѣзаніи зубовъ 342.

- Судорожное сжатіе челюстей 307.
 — схватки желудка 167.

- Сухотка 340.
 Сыпь крапивная 239.
 Сыпь потовая 345.
 — просовидная 239.
 — пузырчатая 344.
 — скрывающаяся 141.
 — на лицѣ 76, 253, 254.
 — на мошонкѣ 218.

Т.

- Течь изъ ушей 85.
 Тифъ 268.
 Тошнота 155.
 — во время беременности 156, 317.
 Трипперъ 213.
 Триханы 193.
 Туберкулы въ ядрахъ 217.
 Туманъ передъ глазами 81.

У.

- Ударъ 286.
 Укушеніе бѣшеною собакою 361.
 Умственное напряженіе 54.
 Утомленіе глазъ 74, 80.
 Уха болѣзни 82.
 — воспаленіе 83.
 — костоѣда 83.
 Уши, боль 84.
 — сухость 87.
 — течъ 85.
 — шумъ 86.
 — глухота 86.
 — железъ воспаленіе 82.
 Ушибъ 348.
 — головы 66.
 — железъ 351.
 Уязвленіе змѣею 361.

Ф.
 Фистула 254.
 Флюсь 71.

Х.
 Холера 175.
 Холерина 174.
 Храпъ во снѣ 312.
 Хроническій катарръ 122.
 — насморкъ 92.

Ц.
 Цынга 297.

Ч.
 Чихотка 296.
 Челюстей судорожн. сжатіе 307.
 Чесотка 241.
 Чирей 246.

Ш.
 Шанкеръ 219.

Шишки геморроидальныя 188.
 Шулять опухоль и воспаленіе 217.
 Шумъ въ ушахъ 86.

Щ.
 Щеки опухоль 71, 107.
 Щетинка 344.

Э.
 Эпилепсія 304.

Я.
 Ядеръ воспаленіе и опухоль 217.
 — атрофія 218.
 — воюанка 218.
 Язва сибирская 360.
 Язвы 249.
 — золотушныя 250.
 — раковидныя 251.
 Языка воспаленіе 99.
 — обложеніе 101.
 — параличъ 288.
 — сухость 102.
 Ячмень 76.

ВВЕДЕНІЕ.

ОБЩЕЕ ПОНЯТІЕ О БОЛѢЗНИ И ЛЕЧЕНІИ.

Здоровье и болѣзнь. Человѣкъ здоровъ, когда всѣ внутреннія и виѣшнія части его тѣла совершаютъ свои отправления (дѣйствуютъ) какъ слѣдуетъ, въ надлежащемъ порядкѣ, правильно и безостановочно.

Наука различаетъ въ жизни человѣка три вида или три отдѣла, тѣсно между собою связанные и одно отъ другаго зависимые: 1) жизнь растительную, которая состоитъ въ питаніи тѣла и въ выдѣленіи и изверженіи остатковъ и отслужившихъ частицъ вещества; 2) жизнь животную, состоящую въ надлежащей способности всѣхъ орудій тѣла,—зрѣнія, слуха, осязанія, обонянія, вкуса и двигательныхъ мышцъ,—къ тѣмъ дѣйствіямъ, для которыхъ они устроены и предназначены; 3) жизнь нравственную и духовную, умственную; жизнь чувства и мысли.

Для каждой изъ этихъ трехъ родовъ жизненной дѣятельности въ человѣческомъ тѣлѣ есть особо принаровленные органы (орудія). Для ра-

стительной жизни: пищеварительный и дыхательный снаряды, кровеносные сосуды (жилы), всасывающіе сосуды, отдѣльныя железы и т. д.; для животной: глаза, уши, носъ, языкъ, мышцы, нервы и т. д.; для умственной — головной мозгъ. Соединеніе нѣсколькихъ органовъ, дѣлающихъ одно и то же дѣло, какъ напримѣръ желудокъ и кишки съ принадлежащими къ нимъ частями, железами и сосудами, называется *снарядомъ*; а самая дѣятельность органа или снаряда — *отправленіемъ*.

Первое условіе здоровья, т. е. правильности всѣхъ жизненныхъ отправленій — надлежащій порядокъ растительной жизни тѣла, питанія и выдѣленія. Тѣло наше и всѣ части его сложены изъ незримо-мелкихъ частичекъ (ячеекъ), изъ которыхъ каждая живетъ своею особенною жизнью, — рождается, растетъ, питается, выдѣляетъ и распадается, — однако можетъ жить только при содѣйствіи и совмѣстной жизни окружающихъ ее такихъ же ячеекъ. Питаніе и выдѣленіе, совершающееся въ каждой ячейкѣ, называется *обмѣномъ веществъ*. Этотъ обмѣнъ веществъ совершается постоянно. Стало-быть, во всемъ тѣлѣ и въ каждой незримо-малой частичкѣ его при жизни происходитъ непрерывное движеніе, такъ что можно сказать — жизнь есть движеніе. Когда движеніе въ области растительной жизни, или обмѣнъ веществъ, происходитъ правильно, постоянно равномерно, нигдѣ и ничѣмъ не нарушается, тогда

человѣкъ вовсе не чувствуетъ этого движенія,— не чувствуетъ, что у него есть тѣло. Присутствіе рукъ, ногъ, глазъ, ушей и прочихъ орудій дѣйствія онъ сознаетъ только во время дѣйствій, которыя исполняетъ ими. Внутреннихъ же частей совсѣмъ не чувствуетъ, исключая тѣхъ минутъ, когда ощущенія голода и жажды даютъ знать о необходимости подбавить питательнаго матеріала, когда позывы даютъ знать о необходимости выкинуть остатки или когда общая усталость и сонъ требуютъ отдыха для мышцъ и двигательныхъ снарядовъ.

Но когда правильность и равномерность внутреннего движенія нарушена въ какой-нибудь части тѣла,—хотя-бы даже въ малѣйшей группѣ (кучкѣ) ячеекъ, тогда мы, при содѣйствіи нервовъ, развѣтвленныхъ по всему тѣлу въ видѣ мельчайшей сѣти, тотчасъ начинаемъ чувствовать неловкость, полноту, тяжесть, онѣмѣніе, нытье или боль иногда въ той самой части, гдѣ порядокъ нарушенъ, иногда въ другой, даже очень далеко отстоящей. Такъ напримѣръ, случается, что желудокъ разстроенъ, а голова болитъ; ноги промочены, а въ ухо стрѣляетъ; испарина на кожѣ остужена, а грудь кашлемъ отбиваетъ и т. д. Это происходитъ оттого, что въ бо́льшей части случаевъ нарушеніе порядка отпавленій въ какой-нибудь одной области тѣла влечетъ за собою расстройство другой, находящейся съ нею въ связи. Если въ одномъ мѣстѣ внутреннее жизнен-

ное движеніе задерживается, затрудняется, то въ другомъ она обыкновенно ускоряется, усиливается. Въ одномъ мѣстѣ приключится застой, засореніе, препятствіе прохождению паровъ и жидкостей, въ другомъ отъ этого приливъ и переполненіе; въ одномъ уменьшеніе и даже прекращеніе движенія и питанія, въ другомъ непомѣрное усиленіе, ускореніе того и другаго. Значить, равновѣсіе теряется.

А какъ скоро равновѣсіе жизненнаго движенія нарушено въ какомъ-нибудь снарядѣ и отправленія его становятся неправильными, то и самый снарядъ постепенно измѣняется въ своемъ составѣ. Отъ недостатка питанія и движенія онъ тощаетъ, сохнетъ; отъ избытка и переполненія наскучитъ другимъ частямъ—распухаетъ, разрастается и становится мѣстомъ отложенія веществъ ненужныхъ и даже совершенно ему чуждыхъ.

Такое нарушеніе порядка въ отправленіяхъ различныхъ частей тѣла и измѣненіе въ ихъ вещественномъ составѣ называется *болѣзью*, которая захворавшему, кромѣ разныхъ видимыхъ признаковъ и припадковъ, обнаруживается неприятными ощущеніями, болью.

Казалось-бы, что сохранить здоровье гораздо легче, чѣмъ вылечить болѣзнь: для сохраненія здоровья стоитъ только вести естественный образъ жизни, не нарушать законовъ природы; удовлетворять дѣйствительныя потребности тѣла въ необходимой мѣрѣ, ни больше, ни меньше. Но на

дѣлѣ все это выходитъ очень не легко. Съ одной стороны общественное положеніе иногда ставитъ людей въ невозможность выполнить всѣ эти условія, принуждаетъ уклоняться отъ природы и окружаетъ вредоносными вліяніями; съ другой грѣхи отцовъ, наслѣдственные страданія, передаются изъ рода въ родъ; съ третьей невѣденіе, непониманіе настоящихъ своихъ потребностей, предразсудки и заблужденія; съ четвертой и главной собственная невоздержность и небрежность какъ нельзя болѣе затрудняютъ сохраненіе здоровья и дѣлаютъ необходимымъ *леченіе болѣзней*, которыхъ число, благодаря тѣмъ же причинамъ, не только не уменьшается, но часъ отъ часу множится.

Происхожденіе и свойства болѣзни.

Имѣя въ виду, что всякая болѣзнь есть не что иное, какъ нарушеніе порядка сперва въ отпращиваніяхъ (дѣйствіяхъ) снарядовъ и орудій или частей тѣла, а потомъ и измѣненіе ихъ вещественнаго состава, для излеченія нужно, разумѣется, прежде всего озаботиться о томъ, чтобы устранить причину нарушенія и возстановить надлежащій порядокъ. Для этого нужно узнать, какой порядокъ, въ какомъ мѣстѣ и чѣмъ именно нарушенъ. Прежде всего нужно устранить вредное вліяніе, которымъ порядокъ нарушенъ, или такъ называемую *ближайшую причину* болѣзни. Если причина эта будетъ продолжать дѣйствовать, то,

естественно, нѣтъ возможности достигнуть установленія надлежащаго порядка въ тѣлѣ. Если человѣкъ объѣлся, разстроилъ себѣ желудокъ какою-нибудь вредною или трудно-варимою пищею или же хотя и безвредною, но въ несоразмѣрномъ количествѣ, и, захворавъ, продолжаетъ дѣлать то же самое, то и разстройство, конечно, должно продолжаться и усиливаться. Если причиною болѣзни были холодъ и сырость, а больной продолжаетъ подвергаться тѣмъ же вліяніямъ, то болѣзнь также можетъ только ожесточаться. Въ первомъ случаѣ самая важная врачебная мѣра—лишеніе пищи и строгая воздержность до окончательнаго возстановленія порядка; во второмъ — сухое и достаточно теплое помѣщеніе. При соблюденіи этихъ условій нарушенный порядокъ очень часто возстановливается самъ собою, потому что всякое живое тѣло *противудѣйствуетъ* всякому чѣмъ-бы то ни было производимому на него впечатлѣнію. Всякій, такъ сказать, толчекъ, причиняющій движеніе въ одну сторону, вызываетъ движеніе обратное, какъ-бы отражающее, подобно тому, какъ мы это замѣчаемъ и въ безжизненныхъ, но сколько-нибудь упругихъ тѣлахъ. Напримѣръ, когда мы согнемъ трость и потомъ отпустимъ, то она, прежде чѣмъ выпрямится, согнется въ противоположную сторону. Когда сильно натягиваемая веревка обрывается, то концы ея отлетаютъ назадъ къ мѣстамъ прикрѣпленія. Когда мы бросимъ камень

или мячъ объ-земь или объ-стѣну, они отскакиваютъ каждый соразмѣрно степени своей упругости. Въ живомъ орудномъ тѣлѣ (въ животномъ организмѣ), при чрезвычайно сложномъ его устройствѣ изъ бесконечно малыхъ частицъ и при разнообразныхъ жизненныхъ отправленіяхъ каждой частицы и каждого снаряда, всякій внѣшній толчекъ или дѣйствіе также вызываетъ отражающее противодѣйствіе. Такое дѣйствіе и противодѣйствіе есть необходимое условіе жизни. Организмъ можетъ правильно жить только въ такой средѣ, которая дѣйствуетъ на него благопріятно, то есть доставляетъ ему все потребное для питанія, освѣженія и очищенія его состава,—для обмѣна веществъ,—и необходимыя раздраженія, возбужденія дѣятельности. Глаза безъ раздраженія свѣтомъ, въ постоянной темнотѣ, слѣпнутъ; рука и нога безъ движенія теряютъ силу и т. д. Вся внутренняя работа, вся жизнь тѣла состоитъ въ непрерывномъ обмѣнѣ дѣйствій и противодѣйствій цѣлаго организма съ окружающею природою и каждой самому организму принадлежащей части и частицы съ окружающими ее и связанными съ нею такими же частями и частицами. Это непрерывное дѣйствіе и противодѣйствіе, или совокупность всѣхъ органическихъ отправленій, совокупность всего внутренняго движенія въ тѣлѣ составляетъ *органическую самодѣятельность*, основное свойство животного тѣла, и вообще называется *жизненною силой*.

Собственно противодѣйствіе, замѣчаемое въ особенностяхъ при вредоносныхъ, болѣзней причиняющихъ вліяніяхъ, называется *органическою реакціей*. А такъ какъ было замѣчено, что живой организмъ, пострадавшій отъ какой-нибудь вредоносной причины, т. е. заболѣвшій, иногда самъ собою, силою своего противодѣйствія, можетъ опять поправиться, изцѣлиться, то эту органическую реакцію въ такихъ случаяхъ называютъ также *цѣлительною силою природы*.

Когда какое-нибудь внѣшнее вліяніе не только вредоносное, но даже безвредное и въ извѣстной мѣрѣ необходимое, бываетъ такъ сильно, что на нѣкоторое время преодолеваетъ силу обыкновеннаго противодѣйствія организма, то оно причиняетъ безпорядокъ въ отправленияхъ того органа, который подвергся вредоносному дѣйствию, и, смотря по силѣ вліянія, можетъ имѣть слѣдствіемъ даже постепенное измѣненіе самаго состава. Когда вреднаго вліянія бываетъ столько, что разстройство отравленій пораженнаго органа окажется не очень значительное, временное, то сначала подавленная органическая реакція можетъ постепенно оправиться и мало-по-малу, такъ сказать, оттолкнуть нанесенный вредъ, восстановить свой порядокъ. Такое возстановленіе порядка, самоизцѣленіе, да и вообще всякое изцѣленіе даже посредствомъ искусственнаго пособія, удобно совершается только тогда, когда въ тѣлѣ остается неповрежденныхъ, здоровыхъ частей

гораздо больше, чѣмъ больныхъ. Когда же здоровыхъ частей остается очень мало или вредное вліяніе такъ сильно, что совершенно подавляетъ органическую реакцію, то самоизцѣленіе становится уже невозможнымъ и требуется искусное врачебное пособіе, котораго успѣхъ, впрочемъ, также зависитъ отъ степени разстройства и важности пораженныхъ органовъ, т. е. отъ того же остатка здоровыхъ частей.

Такъ какъ сохраненіе цѣлости и порядка во всемъ тѣлостроѣ зависитъ отъ правильнаго совокупнаго дѣйствія всѣхъ орудій и взаимнаго вліянія (дѣйствія и противодѣйствія) одного на другое, то и всякое сколько-нибудь значительное внѣшнее вліяніе на одну какую-нибудь часть неминуемо переходитъ и на другую, находящуюся съ нею въ болѣе близкомъ соотношеніи. Напримѣръ, кожа и легкія находятся въ весьма близкомъ соотношеніи, потому что оба суть дыхательные снаряды, служащіе къ освѣженію и очищенію крови. Простуда кожи (задержаніе испарины) можетъ причинить боль, ломоту, на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ испарина задержана, но можетъ причинить также и воспаленіе въ горловыхъ вѣтвяхъ и въ легкихъ. Болѣзнь *переносится* съ одного органа на другой. Простуда въ слабой степени, перешедшая съ кожи на дыхательный снарядъ, произведетъ простое ослизеніе (катарръ) воздухоносныхъ путей и его послѣдствіе, кашель. Въ такомъ случаѣ органическая реакція сначала

подавленная, постепенно можетъ оправиться, взять верхъ и дойти до самоизцѣленія. Ослизненіе и кашель, какъ говорится, пройдутъ сами собою. При болѣе сильномъ вліяніи простуды, при болѣе значительномъ подавленіи органической реакціи, когда простуда кожи причинить дѣйствительное воспаленіе легкихъ и его послѣдствіе,—мѣстную непроницаемость легкихъ для воздуха, измѣненіе состава, уплотненіе нѣкоторой части легкаго или такъ называемое печененіе и далѣе разложеніе,—цѣлительная сила природы одна уже не можетъ справиться съ болѣзнью: ей нужно содѣйствіе окружающихъ обстоятельствъ, благопріятствующихъ разрѣшенію печененія, т. е. нужно искусное леченіе. Въ противномъ случаѣ уплотненіе будетъ распространяться; легкое сдѣлается до того непроницаемо для воздуха, что дыханіе прекратится и послѣдуетъ смерть отъ удушенія или же образуются бугорки, разовьется чахотка.

Переходъ разстройства отпавленій отъ одного органа на другой (переносъ болѣзни), смотря по силѣ и свойству разнообразныхъ вредныхъ вліяній, совершается болѣе или менѣе быстро и ведетъ къ болѣе или менѣе скорому измѣненію состава пораженныхъ органовъ. Быстрое и рѣшительное измѣненіе или прекращеніе отпавленій,—какъ при воспаленіи и печененіи легкихъ,—даетъ такъ называемую *острую* (скоротечную) болѣзнь, которая въ непродолжительное время оканчивается или выздоровленіемъ, или смертью,

или же переходить въ продолжительное страданіе. Медленное, постепенное вредное вліяніе производитъ постепенное измѣненіе отправления пораженныхъ органовъ и такое же постепенное измѣненіе ихъ состава, или такъ называемую *хроническую* (длительную) болѣзнь. Въ послѣднемъ случаѣ, при медленномъ развитіи болѣзни, вредоносное вліяніе, постепенно измѣняющее отправления и составъ органа, не прекращаютъ его дѣятельности, но даютъ ей другое направленіе и устанавливаютъ новый особенный порядокъ. Этотъ новый болѣзненный порядокъ одного страждущаго органа, хотя имѣетъ въ свою очередь вредное вліяніе на другіе органы и, слѣдовательно, на весь тѣлострой, однакожь до извѣстной степени можетъ быть выносимымъ. Тѣло измѣняетъ почти всѣ свои отправления, однакожь свыкается съ новымъ порядкомъ и продолжаетъ жить, дѣйствовать и противодѣйствовать по общимъ законамъ, только съ нѣкоторыми отклоненіями и по своимъ особеннымъ привычкамъ, по своему особенному направленію.

Безчисленное множество различныхъ вредоносныхъ вліяній, дѣйствующихъ или прямо на насъ, или черезъ передачу по наслѣдству, въ особенности же часто произвольное отклоненіе отъ природы, невѣденіе или забвеніе настоящихъ потребностей организма и всякаго рода излишества бываютъ причиною того, что людей безусловно здоровыхъ на свѣтѣ почти нѣтъ, у всякаго есте-

ственный порядок внутренняго тѣлостроя чѣмъ-нибудь да нарушенъ, всякій если не страдаетъ, такъ имѣеть *расположеніе* страдать какою-нибудь хроническою болѣзнью. Имѣющій же расположеніе къ какой-нибудь болѣзни, имѣеть значитъ, хоть одинъ какой-нибудь органъ или снарядъ слабосильный, остающійся невредимымъ только по отсутствію неблагопріятнаго обстоятельства. Совершеннаго равновѣсія силъ въ его тѣлѣ нѣтъ и совершенно здоровымъ онъ, стало-быть, почтаться не можетъ.

Излечимость и неизлечимость болѣзни. Самоисцѣленіе и искусственное леченіе. Мы уже сказали, что живой организмъ находится въ постоянномъ дѣйствіи и противо-дѣйствіи относительно окружающей природы и что отъ послѣдствій всѣхъ вредоносныхъ вліяній онъ силою этого противодѣйствія (реакціи) старается избавиться. Отъ легкихъ болѣзней и разстройствъ онъ избавляется самъ, потому что остатокъ здоровыхъ частей обладаетъ для этого достаточною силой; сама натура собственными средствами побѣждаетъ болѣзнь. Болѣе значительныя разстройства, трудныя болѣзни, требуютъ искусственнаго врачебнаго пособія, леченія лекарствами и другими вспомогательными средствами. Это можно выразить слѣдующимъ общимъ положеніемъ: все излечимое излечается самой натурой (органическою реакціей, жизнедѣятельностью организма, жиз-

ненною силой). Въ однихъ случаяхъ она управляется сама, въ другихъ требуетъ содѣйствія, пособія, возбужденія реакціи. Возможность же возбужденія потребной реакціи зависитъ отъ степени поврежденія организма и остатка въ немъ здоровыхъ частей. Поэтому есть болѣзни неизлечимыя по неизвѣстности дѣйствительныхъ средствъ противъ нихъ и есть такія, которыя неизлечимы, потому что разрушеніе превосходитъ мѣру остатка жизненныхъ силъ. Поэтому же и отъ медицины не слѣдуетъ требовать болѣе того, что она можетъ дать. Во многихъ случаяхъ позволительно требовать не излеченія, а только облегченія страданій. Это достигается частію удаленіемъ ближайшей причины или повода къ болѣзни (отдаленная, коренная причина зарожденія и развитія болѣзни, причина обыкновенно сложная, большею частію остается совершенно неизвѣстною); частію постановкою больного въ такія условія содержанія, которыя бы могли содѣйствовать возстановленію силъ и здоровья; частію же соотвѣтствующими лекарствами. Что касается до послѣднихъ, до леченія собственно, то само собою разумѣется, что лучшимъ способомъ леченія всегда будетъ тотъ, который не ломаетъ, не насилуетъ природу, а помогаетъ ей дѣйствовать, помогаетъ ея противодѣйствію (реакціи) въ томъ самомъ направленіи, въ какомъ она сама стремится побѣдить или выкинуть болѣзнь.

СТАРАЯ И НОВАЯ МЕДИЦИНА.

Старая медицина. Мысль о помощи природѣ, также какъ и мысль о необходимости устраненія причинъ со временъ Иппократа и Галена постоянно высказывалась въ медицинѣ, но къ сожалѣнію, такъ же постоянно затемнялась недоразумѣніями и ложными взглядами. Особенно отъискиваніе причинъ болѣзней порождало множество теорій и системъ, построенныхъ за неимѣніемъ точныхъ данныхъ на произвольныхъ предположеніяхъ и потому непрерывно смѣнявшихся. Воображаемыя причины болѣзней очень естественно вели и къ воображаемымъ, т. е. ложнымъ и вреднымъ попыткамъ помочь природѣ. Стоитъ только вспомнить объ океанѣ крови, напрасно пролитой ланцетомъ, рожками и пиявками на томъ, нынѣ уже всѣми отвергнутомъ основаніи, будто бы длинный рядъ недуговъ происходитъ отъ избытка и приливовъ крови. Рядомъ съ постройкою теорій происхожденія болѣзней (патологическихъ системъ) производились, разумѣется, и поиски за лекарствами. Въ какой мѣрѣ эти поиски были удачны втеченіи двухъ тысячъ лѣтъ, о томъ свидѣлствуютъ лучшіе люди и ученѣйшіе авторитеты старой аллопатической школы.

Въ концѣ прошлаго столѣтія неудовольствіе на безобразную грудю вольныхъ и невольныхъ заблужденій, засорявшихъ фармакологию; на отсутствіе всякаго руководящаго начала; на обманчи-

вое восхваленіе бесполезныхъ и вредныхъ средствъ; на сложныя микстуры и безсмысліе безконечныхъ рецептовъ дошло до крайней степени. Лучшіе умы стали требовать основательнаго изслѣдованія лекарствъ. Одни отвергали всякую надобность въ нихъ; другіе принялись за пересмотръ, очистку и выбрасываніе лишняго или бесполезнаго, выбрасываніе опять-таки произвольное, потому что основанное на умозрѣніяхъ и предположеніяхъ, только вооруженныхъ не легковѣріемъ, а крайнимъ сомнѣніемъ. Но общій способъ дознанія свойства лекарствъ остался прежній: свойства лекарствъ постоянно, какъ и въ древности, познавались изъ опыта надъ больными, изъ дѣйствія на болѣзни. Это познаніе оказалось неточнымъ.

Въ это время родилась гомеопатія.

Ганеманъ и его открытіе. Докторъ Самуиль Ганеманъ (род. 10 апр. 1755 г. въ Мейсенѣ, ум. 2 іюня 1843 г. въ Парижѣ), послѣ нѣсколькихъ лѣтъ практики, дошелъ до такого отчаянія отъ неблагонадежности лекарствъ и жалкаго состоянія медицины, что совершенно бросилъ практику и занялся учеными работами, особенно химіею, которой оказалъ столько услугъ, что этого одного уже достаточно было бы для упроченія извѣстности имени ученаго. Но ему предназначено было внести свѣтъ и во мракъ покинутаго врачебнаго искусства. Трудясь надъ переводомъ фармакологіи англичанина Куплена, онъ въ статьѣ о хинѣ на-

паль на такія сбивчивыя объясненія и противорѣчія, что не могъ ни передать, ни пропустить ихъ, не добившись болѣе удовлетворительнаго рѣшенія вопроса, какъ и почему хина уничтожаетъ лихорадку. И какъ Ньютону при видѣ паденія яблока съ дерева открылась тайна законовъ тяготѣнія, точно такъ же Ганеману пришла вдохновенная мысль, внезапное гениальное соображеніе. Чтобы дознать дѣйствіе хинной корки, онъ при полномъ здоровьѣ принялъ унцію ея внутрь. Лекарство отъ лихорадки произвело цѣлый рядъ симптомовъ, совершенно подобныхъ симптомамъ перемежающейся лихорадки. Тайна объяснилась, законъ подобія (*similia similibus curantur*) былъ открытъ: *болѣзни излечаются такими лекарствами, которыя сами въ здоровомъ тѣлѣ производятъ подобныя же болѣзни*. Эта мысль однакожъ еще требовала окончательнаго подтвержденія и Ганеманъ приступилъ къ изслѣдованію длиннаго ряда лекарствъ надъ самимъ собою и своими окружающими, а затѣмъ и къ повѣркѣ цѣлебнаго дѣйствія надъ больными. Такимъ образомъ втеченіи нѣсколькихъ лѣтъ постепенно выработались: новое "Чистое лекарствовѣденіе" (1-е изд. 1811—1822 г.) и новый "Органонъ врачебнаго искусства" (1-е изд. 1810 г.), заключающій въ себѣ теоретическія объясненія и правила изслѣдованія и примѣненія лекарствъ.

Впервые Ганеманъ свои взгляды и мнѣнія о реформѣ въ медицинѣ обнародовалъ въ Гүфелан-

довомъ журналѣ, въ 1796 г., но не нашелъ никакого сочувствія. Первые, напечатанные въ 1805 г. на латинскомъ языкѣ отрывки изъ Новаго Лекарствовѣденія встрѣчены язвительными насмѣшками. Затѣмъ поднялась постоянно возрастающая буря вражды и преслѣдованій. Съ одной стороны аптекаря озлоблялись на ущербъ, наносимый имъ Ганеманомъ приготовленіемъ и раздачею лекарствъ изъ своихъ. Это впрочемъ было тогда у врачей въ обычаѣ, который тогда же преобразовавшаяся медицинская администрація тоже старалась отмѣнить какъ злоупотребленіе. Съ другой стороны, Ганеманъ вольнопрактикующій врачъ и притомъ долгое время совершенно удалявшійся въ уединеніе кабинета, не принадлежалъ ни къ факультету, ни къ академіи и въ ученой корпораціи былъ, стало-быть, чужакомъ, не призваннымъ учителемъ, да еще и являлся съ ученіемъ ни съ чѣмъ несообразнымъ, опрокидывавшимъ почти всѣ священныя преданія, всю вѣками утвержденную рутину. Наконецъ, послѣ первой же попытки потолковать съ коллегами на установленномъ мертвомъ языкѣ науки, онъ вдругъ заговорилъ на общепонятномъ нѣмецкомъ, доступномъ профанамъ, — вынесъ соръ изъ избы. Такого преступленія уже рѣшительно невозможно было простить. Впослѣдствіи, конечно, на живыхъ языкахъ заговорили и другіе; наука повалила свою средневѣковую китайскую стѣну, вышла на житейскій базаръ и кое-что отъ этого выиграла. Но первымъ нововводителямъ такихъ порядковъ

нельзя же было спускать. Дерзкаго реформатора за всѣ эти преступленія и за упорное проповѣдываніе идеи, до него никѣмъ еще не обработанной и не усвоенной, необходимо было гнать. И гнали же его по всей Германіи изъ города въ городъ, однажды даже приготовились буквально побить камнями, пока онъ окончательно не скрылся въ Парижѣ, гдѣ нашелъ гостепріимство и спокойствіе подъ старость. Между-тѣмъ повсюду, гдѣ онъ проходилъ въ своемъ тревожномъ странствіи, къ нему и его идеѣ примыкали приверженцы, образовались общества врачей-изслѣдователей лекарствъ по Ганемановой методѣ и начали издаваться гомеопатическіе журналы. Идея была слишкомъ живуча, чтобы возможно было погасить ее и затоптать. Она пережила своего геніальнаго родителя и продолжаетъ расти, продолжаетъ распространяться по всему земному шару. Всего свободнѣе и безпрепятственнѣе она развивается въ Америкѣ. Если европейскіе факультеты до-сихъ-поръ еще не признаютъ ея, то въ этомъ виновата не она собственно, а просто преданія старой школы, старые цѣховые порядки факультетовъ и личныя отношенія, личные интересы. Наука тутъ ровно не причесть. Въ семьдесятъ лѣтъ было, конечно, много глумленья, много желчныхъ выходокъ и брани, но не было со стороны факультетской медицины *ни одного* серьезнаго и сколько-нибудь основательно научнымъ образомъ изложеннаго опроверженія гомеопатіи. Всѣ принимавшіеся за серьезное опровер-

женіе и для этого принужденные ознакомиться съ предметомъ оканчивали тѣмъ, что сами обращались въ гомеопатовъ. Это совершалось тѣмъ легче, что всякій дѣйствительно узнавшій, въ чемъ дѣло, находилъ въ новомъ ученіи полное удовлетвореніе. Оказывалось, что гомеопатія вовсе не думаетъ уничтожать всю существующую медицинскую науку и стать на ея мѣсто. Напротивъ, она вполне признаетъ всѣ многочисленныя отрасли и вспомогательныя знанія этой науки и сама пользуется ими. Она только пополняетъ пробѣлы, преобразовываетъ двѣ части: лекарствовѣденіе и способъ выбора и примѣненія лекарствъ, терапію.

Отношеніе гомеопатіи къ факультетской медицинѣ. Сила вещей, сила времени— великая сила. Недовольство старымъ лекарствовѣденіемъ началось задолго до Ганемана; одновременно съ нимъ заговорили и другіе о необходимости основательнаго изслѣдованія лекарствъ. Наука о развитіи и произведеніяхъ болѣзненныхъ процессовъ, (патологическая анатомія), наука о распознаваніи болѣзней (діагностика и ея орудія), а рядомъ также фізіологія, органическая химія, микроскопія и другія вспомогательныя науки постепенно достигали невиданнаго прежде развитія и окончательно подорвали безотчетную вѣру въ старыя лекарства. Новая факультетская медицина, такъ называемая фізіологическая школа, дошла до совершеннаго отрицанія всякой надобности въ лекарствахъ, по-

лагаю достигнуть излеченія болѣзней одною діэтой и соотвѣтствующимъ содержаніемъ больныхъ, да еще добавкою недостающаго и выведеніемъ излишковъ въ организмъ, напр. добавкою желѣза при малокровіи и искусственнымъ истощеніемъ при ожирѣніи. Однакожъ отрицаніе очень складно и убѣдительно только въ теоріи: на практикѣ оказывается невозможнымъ не давать лекарствъ, и его даютъ, даютъ часто даже слишкомъ много. Физиологическая школа занимается также изслѣдованіемъ лекарственныхъ веществъ, но изслѣдованія эти, по способу ихъ производства, служатъ на пользу только физиологій и токсикологій. Къ терапіи они въ рукахъ физиологовъ не примѣнны *). Прямую пользу изъ нихъ для практики отчасти извлекаютъ только гомеопаты.

Такимъ образомъ исторія показываетъ, что гомеопатія шла впереди физиологической школы: она въ лицѣ Ганемана первая принялась за истинно-физиологическое изслѣдованіе лекарствъ, за дѣло, на которое другіе только указывали, какъ на желанное; она установила діэту, какъ необходимое вспомогательное средство; она доказала вредныя, разрушительныя дѣйствія большихъ количествъ лекарства и достаточность малѣйшихъ дозъ. Физиологическая школа шла по слѣдамъ го-

*) См. «Гомеопатическая фармакологія» Дерикера, Введеніе, стр. XL—XLVII.

меопатіи даже въ упрощеніи лекарствъ и въ уменьшеніи дозъ, въ чемъ можно убѣдиться по рецептамъ въ любой аллопатической аптекѣ. Мало того, она ежедневно заимствуетъ у гомеопатіи средства, но только употребляетъ ихъ по своимъ соображеніямъ, не признавая закона подобія, по необходимости заняться его проверкою, и подобно своей предшественницѣ, старой аллопатіи, продолжаетъ издѣваться надъ малыми гомеопатическими дозами. Вотъ гдѣ противорѣчіе, которое всякому безпристрастному уму должно казаться въ высшей степени страннымъ. Гдѣ же логическое оправданіе насмѣшки надъ ничтожностью и бесполезностью очень малой дозы лекарства со стороны тѣхъ, которые, въ теоріи по-крайней-мѣрѣ, признають совершенную ненадобность и бесполезность лекарствъ вообще? Неужели совсѣмъ ничего болѣе дѣйствительно, нежели очень мало? Если же на практикѣ употребленіе энергически дѣйствующихъ средствъ, — хинина, іода, ртути, азотнокислаго серебра и т. д. и т. д., — необходимо, то гдѣ же логика отрицанія ихъ на каѳедрахъ?

Но сила вещей, совершенствованіе и новыя открытія микроскопін и физико-химическаго анализа, развитіе фізіологіи и целлюлярной патологіи, постепенное уменьшеніе дозъ и заимствованія средствъ изъ гомеопатической фармакологіи, вольныя и невольныя подражанія, — ведетъ фізіологическую школу незамѣтнымъ для нея образомъ къ сближенію съ гомеопатіей. Гомеопатія этого сближе-

нія давно ищетъ, безпрерывно повторяя своимъ противникамъ: изслѣдуйте и испытайте сами! Ганеманъ говорилъ: "въ наукѣ ничто не должно быть принимаемо на вѣру, ничто не должно строиться на предположеніяхъ; основаніемъ всякаго вывода долженъ быть опытъ". Этого не слышали или не хотятъ слышать тѣ, которые досихъ-поръ продолжаютъ обвинять гомеопатію въ неимѣніи будто бы научныхъ основаній. При этомъ, съ другой стороны, не мѣшаетъ замѣтить и приверженцамъ гомеопатіи, что гомеопатія только старой аллопатіи съ начала нынѣшняго столѣтія была противоположна. Физиологическая же школа уже не та аллопатія. Съ нею гомеопатія какъ мы видѣли, имѣетъ много точекъ сближенія и не мудрено будетъ совершенно поладить, когда эта физиологическая школа не только въ теоріи, но и на практикѣ окончательно отброситъ свою изношенную рутинную подкладку, — отравляющія количества лекарства.

Старый аллопатическій законъ: *contraria contrariis curantur*, признанный Иппократомъ, послужившій Галену основаніемъ классификаціи всѣхъ лекарствъ на стягивающія (вяжущія) и послабляющія и на горячія и холодныя, сухія и сырыя въ четырехъ степеняхъ *), законъ, пере-

*) Иппократъ видѣлъ во всей природѣ только четыре стихіи: огонь, воду, воздухъ и землю, и соотвѣтствующія имъ

жившій всѣ медицинскія системы до физиологической школы, всегда существовалъ только въ теоріи, на практикѣ же никогда не могъ быть примѣненъ безъ произвольнаго толкованія. Это происходитъ оттого что "противуположное" есть отвлеченное понятіе, которое, кромѣ полюсовъ, почти не имѣетъ дѣйствительныхъ представителей въ природѣ. Къ качествамъ предметовъ оно въ строгомъ смыслѣ даже вовсе не примѣнимо, точно также, какъ и столько же отвлеченное понятіе "равное", одинаковое, и понятіе "величина". Величины бываютъ различныя, но противуположныхъ нѣтъ. Большое и малое, крупное и мелкое, высокое и низкое и т. д.—понятія относительныя: что для муравья громадно крупно, то для его сосѣда крота уже мелко. Число геометрическихъ формъ: шаръ, кубъ, параллелограммъ, пирамида и т. д., подходящихъ подъ категорію "равное", чрезвычайно ограничено; противуположныхъ же формъ вовсе не существуетъ: что противуположно шару или кубу? Формы (очертанія) бываютъ только *различныя* и болѣе или менѣе *подобныя*. Равныя или одинаковыя формы, какъ сказано, ограниченныя числомъ, встрѣчаются только въ неорганической природѣ; въ органической же безусловно равныхъ вовсе нѣтъ. Напримѣръ, не только нѣтъ двухъ де-

качества: сухость, сырость, теплоту и холодъ. Галенъ только развилъ и распространилъ эту систему.

ревьевъ (двухъ березъ, двухъ дубовъ и т. д.) совершенно одинаковыхъ; но и на одномъ деревѣ нѣтъ двухъ листьевъ, вполне тождественныхъ: каждый имѣетъ свои, хотя бы и мельчайшіе оттѣнки особеннѣйшіе. Если уже равныхъ и противоположныхъ такъ мало по формѣ, то тѣмъ менѣе ихъ можетъ оказаться по свойству и качеству тѣлъ. Хотя мы и мѣримъ тепло и холодъ, сухость и сырость на опредѣленные градусы термометрическими и гигрометрическими инструментами, однакожь тѣмъ не менѣе эти понятія остаются относительными, даже въ общемъ смыслѣ, когда рѣчь идетъ просто о температурѣ тѣлъ и атмосферы. Что одному кажется теплымъ, то другому можетъ казаться холоднымъ; лѣтомъ $+8^{\circ}$ холодъ, зимою -2° тепло. То же самое оказывается и относительно сухости и сырости. Безусловная сухость, напримѣръ, въ природѣ вовсе не существуетъ: химія учитъ, что во всѣхъ минеральныхъ кристаллахъ заключается вода. Если же такія общія понятія примѣняются къ такимъ безконечно разнообразнымъ свойствамъ и качествамъ, каковы свойства и качества лекарственныхъ веществъ, то въ результатѣ естественно не можетъ оказаться ничего кромѣ совершенно произвольныхъ толкованій и, слѣдовательно, заблужденій.

Свойства лекарствъ, подводимыхъ подъ общія категоріи сперва горячительныхъ и прохлаждающихъ, сушащихъ и увлажняющихъ, потомъ укрѣпляющихъ и послабляющихъ, раздражающихъ и

успокоивающихъ и т. д. не даромъ во всѣ времена служили предметомъ спора. Одно и то же вещество,—напр. опиѣ,—одни находили раздражающимъ, производящимъ бессонницу; другіе успокоивающимъ, дающимъ усыпленіе, тогда какъ онъ подобно многимъ другимъ лекарственнымъ веществамъ въ дѣйствительности производитъ то и другое, смотря по обстоятельствамъ и по способу примѣненія, напримѣръ, къ здоровому и больному организму, въ относительно большихъ и относительно малыхъ количествахъ.

Обобщеніе понятій о свойствахъ и дѣйствіяхъ лекарствъ само по себѣ уже неизбежно должно было привести къ ошибочнымъ заключеніямъ и сдѣлать лекарствовѣденіе «грудою бесполезнаго хлама», какъ его издавна называли авторитеты науки. Но какъ скоро врачъ отыскиваетъ лекарства, *по свойствамъ противоположнаго* свойству болѣзни, то логика оказывается совершенно хромою. Это противоположное никогда не могло быть найдено, по той простой причинѣ, что оно въ природѣ вовсе не существуетъ. Если въ нѣкоторыхъ, весьма немногихъ впрочемъ, случаяхъ и представляется яснымъ, что можно напримѣръ, жару противопоставить холодъ,—положить льду на голову въ горячкѣ или на животъ при воспаленіи внутренностей,—ознобу согрѣвающее, запору проносное, поносу вяжущее, однакожь результаты подобныхъ дѣйствій всегда оказываются вредными, если не тотчасъ, то ужъ непременно впослѣд-

ствіи. Но когда нужно отыскать противоположное не одному какому-нибудь симптому,—жару, запору, разслабленію, поносу, а самой сути болѣзни какого-либо органа, то яснаго сознанія, руководящаго выборомъ средствъ, уже положительно не можетъ быть. Чтѣ противоположно различнымъ видамъ болѣзней печени, селезенки, почекъ, сердца? чтѣ противоположно воспаленію легкихъ, котораго конечно ужъ никто изъ самыхъ отважныхъ не рѣшится лечить льдомъ? Чтѣ противоположно гнилой жабѣ и карбункулу, антонову огню, ревматизму, ломотѣ, разнымъ худосочіямъ и т. д. и т. д.?

Вопросъ остается неразрѣшеннымъ и на практикѣ приходится прибѣгать къ болѣе или менѣе грубому и безотчетному эмпиризму.

Неясное сознаніе и неточное опредѣленіе первоначальныхъ понятій не только въ медицинѣ, но и во всѣхъ другихъ отрасляхъ человѣческаго вѣденія создаетъ теоріи, лишеныя логическаго основанія, и люди, страстно увлекающіеся такими теоріями, естественно могутъ производить только вредныя безпорядки и въ наукѣ, и въ жизни. Сколько причинено и до-сихъ-поръ причиняется вреда медициною, не логично примѣняющею лекарства, извѣстно всѣмъ больнымъ, побывшимъ въ рукахъ отважныхъ лечителей большими количествами лекарствъ. Не даромъ же многіе авторитеты науки возставали противъ старой полифармаціи, находя, что больше людей умираетъ отъ леченія, чѣмъ отъ болѣзней; не даромъ же новая

физиологическая школа въ терапіи перешла къ нигилизму.

Что же остается дѣлать, чтобы въ леченіи болѣзней поступать логически?

Это указаль Ганеманъ, начавъ съ отысканія и открытія общаго постояннаго закона дѣйствія всѣхъ лекарствъ на здороваго и больнаго. И такова сила всякаго дознаннаго закона природы, что вмѣстѣ съ уразумѣніемъ его само собою разрѣшаются и всѣ другія, относящіяся къ предмету, вопросы и сомнѣнія.

Новый законъ и намеки на него въ древности. Иппократъ и Парацельсъ. Ганеманъ открылъ и окончательно выяснилъ, что болѣзни излечаются не противоположнымъ, а *подобно дѣйствующимъ*.

Проявленія этого закона были уже замѣчаемы даже въ древности, самимъ Иппократомъ (460—377 годахъ до Р. Х.) и другими.

Иппократъ положительно говорилъ: «Болѣзнь причиняется подобнымъ и подобнымъ же изцѣляется. Такъ, чтò производитъ мочерѣзъ, котораго не было, то и уничтожаетъ мочерѣзъ существующій; кашель и мочерѣзъ причиняются и уничтожаются однимъ и тѣмъ же. Лихорадка то производится и уничтожается однимъ и тѣмъ же, то уничтожается противнымъ тому, чтò ее произвело. Большая часть болѣзней излечается тѣми же причинами, которыя ихъ произвели.»

Въ XVI столѣтіи Парацельсъ (1493—1541) и нѣкоторые его ученики, особенно Кроль, такъ близко подходили къ основному началу гомеопатіи, что ихъ можно считать предшественниками Ганемана. Но только Ганеманъ, работавшій въ такое время, когда почти невозможно было знать, что писано Парацельсомъ, потому что онъ и его сочиненія были въ полнѣйшемъ презрѣніи и забвеніи, дѣйствительно открылъ законъ подобія (*similia similibus curantur*), разъяснилъ его практическое приложеніе и приготовилъ средства къ этому приложенію изслѣдованіемъ длиннаго ряда лекарствъ на здоровомъ. Значеніе Парацельса какъ реформатора стало объясняться историкамъ медицины только съ тѣхъ поръ какъ Радемахеръ, вѣроятно, случайно наткнувшись на его сочиненія, прочиталъ ихъ, усвоилъ себѣ найденныя готовыя идеи специфизма и, въ 1841 году, напечаталъ книгу *Rechtfertigung der von den Gelehrten misskannten verstandesrechten Erfahrungsheillehre der alten scheidekünstigen Geheimärzte etc.* (Оправданіе ложно понятой учеными разумной опытной науки врачеванія старыхъ, въ химіи свѣдущихъ, тайну хранившихъ врачей и проч.), которою смылъ съ Парацельса наложенное торжествовавшими противниками трехсотлѣтнее клеймо шарлатанства, обмана и всѣхъ пороковъ. Въ судьбѣ этихъ двухъ людей очень много сходнаго. И Парацельсъ также, какъ Ганеманъ не принадлежалъ къ факультету. Не встрѣтивъ сочувствія въ ученой корпо-

раціи, онъ точно также вынесъ соръ изъ избы, заговорилъ на непозволительномъ тогда въ наукѣ живомъ (нѣмецкомъ) языкѣ и, стараясь отстоять свою правоту, убѣдить противниковъ, рѣзко обличалъ ихъ заблужденія. За это онъ былъ загнанъ и затоптанъ въ грязь такъ, что имя его впро-долженіи трехсотъ лѣтъ всѣмъ школьникамъ представлялось синонимомъ невѣжества, обмана и всякаго нравственнаго безобразія. И Ганемана гнали, и его старались затоптать, но возможное въ шестнадцатомъ вѣкѣ было уже невозможно въ девятнадцатомъ. Ганеманъ выдержалъ тяжелое испытаніе и завѣщалъ своимъ послѣдователямъ выдержать его до конца. Мало того, при Ганеманѣ оправданъ и Парацельсъ.

Специфизмъ. Парацельсъ и Радемахеръ. Парацельсъ былъ специфистъ. Онъ отыскивалъ и, сколько бы ни глумились надъ его «сигнатурами», дѣйствительно находилъ лечеб-ныя средства, имѣющія болѣе или менѣе специфическое отношеніе къ извѣстнымъ органамъ. Такимъ же специфистомъ естественно долженъ былъ явиться и изучившій его Радемахеръ, а затѣмъ и послѣдователи Радемахера. Идея специфизма, впрочемъ, никогда не умирала въ медицинѣ при всѣхъ измѣненіяхъ ея системъ и теорій. Всѣ до-сихъ-поръ продолжающіяся злоупотребленія извѣстныхъ средствъ,—напр. хины, желѣза, ртути и т. д.,—происходятъ не отъ чего иного,

какъ отъ убѣжденія въ ихъ специфичности противъ извѣстныхъ болѣзней.

Настоящее значеніе специфизма. Но отчего же оказываются злоупотребленія, отравленія и вредъ для больныхъ? отчего эти специфическія средства на практикѣ такъ рѣдко приносятъ дѣйствительную пользу, дѣйствительное излеченіе безъ дурныхъ послѣдствій? Очевидно, оттого, что тутъ должно быть какое-нибудь недоразумѣніе. Это недоразумѣніе разрѣшилъ Ганеманъ: онъ показалъ, что ошибка состоитъ въ обобщеніи болѣзней и въ обобщеніи свойствъ лекарствъ; онъ объяснилъ, что ни одинаковыхъ болѣзней, ни одинаково и во всякомъ случаѣ на эти болѣзни дѣйствующихъ средствъ вовсе не существуетъ; что подводитъ болѣзни подъ общія категоріи и на этомъ основаніи приписывать для нихъ средства, значить лечить не самыя болѣзни, а имена болѣзней; что всякій человѣкъ, какъ бы ни называлась его болѣзнь въ патологіи, какой бы органъ ни былъ у него поврежденъ, всегда страдаетъ своею особенною, личною, индивидуальною болѣзью, которая проявляется и познается въ симптомахъ, объективныхъ (видимыхъ и осязаемыхъ продуктахъ болѣзни) и субъективныхъ (боляхъ и ощущеніяхъ); что для познанія болѣзни данной особы, стало-быть, недостаточно знать только, какой органъ и въ какой степени поврежденъ, а необходимо собрать въ одну патологиче-

скую картину всѣ симптомы, всѣ проявленія болѣзни до послѣднихъ мелочей, не упуская изъ виду ни предшествовавшей исторіи организма, ни повода къ заболѣванію, ни сопровождающихъ обстоятельствъ; что къ этой-то картинѣ болѣзни, на основаніи закона подобія, нужно подобрать наиболѣе близко по болѣзнероднымъ свойствамъ подобное лекарство, т. е. такое, которое само производитъ у здороваго всѣ или почти всѣ подобныя болѣзненные явленія и поврежденія органовъ; что то средство, которое по своимъ свойствамъ соотвѣтствуетъ всѣмъ проявленіямъ данной болѣзни, и будетъ въ этомъ и ему подобныхъ случаяхъ настоящее специфическое; словомъ, что нужно не обобщать, а индивидуализировать, обособливать и болѣзни, и лекарства.

Логическая послѣдовательность гомеопатическихъ правилъ. Мы сказали, что съ открытіемъ основнаго закона дѣйствія лекарствъ должны были разрѣшиться и всѣ другіе, относящіеся къ предмету вопросы.

Слѣдовало дознать, какъ именно лекарства дѣйствуютъ, какія они могутъ причинить болѣзненные явленія у здороваго. Ганеманъ предпринялъ это изслѣдованіе и установилъ для него правила. Оказалось, что есть лекарства, по дѣйствіямъ болѣе или менѣе между собою подобныя, производящія болѣе или менѣе похожія болѣзненные явленія, но что каждое при этомъ имѣетъ свои осо-

бенности. Изъ этого для практики вытекають слѣдующія правила:

1) Лекарствомъ можетъ быть только такое вещество, котораго белѣзнеродныя (слѣдовательно и врачебныя) свойства въ точности извѣстны.

2) Лекарство въ каждомъ данномъ случаѣ можетъ быть употреблено только одно, простое, не смѣшанное, ибо смѣсь хотя бы веществъ очень хорошо въ отдѣльности извѣстныхъ, образуетъ вещество новое, совершенно неизвѣстное, не говоря уже о томъ, что въ смѣси одно вещество можетъ быть совершенно измѣнено и уничтожено другимъ.

3) Свойства лекарствъ познаются изъ ихъ отравляющихъ, болѣзнь производящихъ дѣйствій; изъ испытанія надъ здоровыми, которое конечно не можетъ быть доводимо до отравленія; изъ извѣстнаго по наблюденіямъ врачей всѣхъ школъ вреднаго дѣйствія на больныхъ и изъ дѣйствительныхъ отравленій (токсикологіи и результатовъ вскрытія труповъ).

Чѣмъ ядовитѣе вещество, тѣмъ могущественнѣе оно какъ лекарство. Понятно, что ядовитое вещество не могло быть употреблено въ такомъ количествѣ, которое способно причинить отравленіе: слѣдовало прибѣгнуть къ самой *малой дозѣ*. Тутъ изслѣдованіе и опытъ показали: а) что лекарственныя вещества, для полученія малѣйшихъ дозъ, подвергаемыя разрѣженію и взбалтыванію (тренью) не только не теряють своихъ свойствъ, но

что дѣйствительность ихъ усиливается и развивается, какъ на примѣрѣ: въ углѣ, графитѣ, извести, плаунѣ и т. д.; в) что дѣйствіе большихъ и малыхъ дозъ, низкихъ и высокихъ дѣленій, бовають различны и даже противоположны, и с) что есть субъекты и случаи (особенно хроническія болѣзни), въ которыхъ относительно крупныя дозы, низкія дѣленія, или вредятъ, производятъ ожесточеніе болѣзненныхъ припадковъ и напрасныя волненія, или вовсе не оказываютъ дѣйствія, тогда какъ самыя малѣйшія, 12 и 30 дѣленія, даютъ желанныя результаты, и наоборотъ, есть болѣзни (большая часть острыхъ и скоротечныхъ), которыя не премѣнно требуютъ низшихъ дѣленій *).

Изъ этихъ общихъ правилъ вытекають слѣдующія частныя, которыми необходимо руководствоваться при пользованіи больныхъ.

ДОЗНАНІЕ БОЛѢЗНИ.

Осмотръ. Нужно дознать всѣ видимыя и осязаемыя проявленія болѣзни и ея произведенія (продукты), т. е. всѣ объективныя симптомы. Ученый врачъ для такого дознанія прибѣгаетъ къ физическому изслѣдованію помощію инструмен-

*) О вопросѣ, почему именно малѣйшія дозы лекарства дѣйствуютъ, а также о значеніи симптомовъ см. «Фармакологію» Дерикера. Введеніе.

товъ, къ изслѣдованію, о которомъ въ домашнемъ лечебникѣ, конечно, не можетъ быть и рѣчи. Но и не-врачу удостовѣриться нужно, гдѣ именно болитъ и какимъ образомъ; чувствительно ли больное мѣсто къ прикосновенію; нѣтъ ли опухоли, отека или сыпи и какой формы сыпь; каково состояніе кожи и слизистыхъ оболочекъ; каковы пульсъ и дыханіе; каковы отправления; какого вида отдѣленія и изверженія и т. д.

Допросъ. Затѣмъ нужно сдѣлать подробный допросъ больному и окружающимъ о томъ, какъ именно онъ страдаетъ и что ощущаетъ, т. е. нужно знать всѣ субъективные симптомы (личныя ощущенія). При этомъ необходимо принять къ свѣденію: съ чего страданіе начинается, какъ протекаетъ, усиливается или ослабляется; въ какое время дня или ночи; при какихъ обстоятельствахъ, въ покоѣ, при движеніи, въ теплѣ или на холоду, на воздухѣ, отъ воды, пищи или питья; каковы лихорадочныя движенія, сонъ, нравственное состояніе и расположеніе духа, аппетитъ, вкусъ, позывы и привычки и т. д.

Исторія болѣзни. Затѣмъ для отысканія причины настоящаго болѣзненнаго состоянія необходимо знать съ возможною точностью ея происхожденіе, т. е. всю исторію больного организма, всѣ предшествовавшія болѣзни въ послѣдовательномъ порядкѣ и со всѣми причинами или пово-

дами заболѣванія, а также все то, что могло быть приобретено по наслѣдству. Нерѣдко, особенно въ хроническихъ болѣзняхъ, только точное знаніе прошедшаго, исторіи организма (anamnesis), можетъ дать ясное понятіе о настоящемъ состояніи и служить указаніемъ при выборѣ врачебнаго средства.

Всякое дознаніе слѣдуетъ обстоятельно записывать. При этомъ не слѣдуетъ пренебрегать никакими мелочными подробностями, какъ бы ничтожны они ни казались. Нерѣдко самое мелкое обстоятельство вноситъ больше свѣту, нежели самый крупный болѣзненный продуктъ или видимое поврежденіе органа.

Картина болѣзни. Изъ собранныхъ такимъ образомъ подробныхъ свѣдѣній, изъ совокупности всѣхъ симптомовъ, объективныхъ и субъективныхъ съ ихъ исторіею, составляется полная картина болѣзни совершенно *особенной*, лично больному принадлежащей и въ подробностяхъ никогда не похожей на болѣзни того же наименованія, встречаемыя у другихъ особей (субъектовъ). Что человѣкъ, то болѣзнъ, ему лично принадлежащая. Никакая болѣзнъ, носящая извѣстное наименованіе въ научной спеціальной терапіи и въ патологіи, не можетъ повториться у двухъ человѣкъ въ совершенно одинаковомъ видѣ, потому что у каждаго была своя исторія организма, свое расположеніе и наслѣдство, свои особенныя обстоятель-

ства и случайности. Болѣзнь можетъ носить опредѣленное наименованіе, напр.: тифъ, горячка, лихорадка, гипертрофія печени, катарръ желудка или легкихъ и т. д. только по самымъ общимъ чертамъ, по общему своему характеру. Для научной классификаціи такія опредѣленія совершенно необходимы, но руководствоваться ими одними при выборѣ врачебныхъ средствъ значитъ лечить не болѣзнь, а имена болѣзней. Самая рекомендація многихъ средствъ противъ одной и той же болѣзни, какъ въ аллопатіи, такъ и въ гомеопатіи, уже доказываетъ, что больные одною и тою же болѣзнію всегда бываютъ различно больны. Стало бытъ ихъ слѣдуетъ различать. Это различіе, обособленіе каждаго даннаго случая получается указаннымъ подробнымъ описаніемъ всѣхъ объективныхъ и субъективныхъ симптомовъ, составляющихъ картину болѣзни въ данномъ случаѣ.

ВЫБОРЪ ЛЕКАРСТВЪ.

Изъ изслѣдованій лекарствъ, въ видѣ списковъ симптомовъ, занесенныхъ въ гомеопатическую фармакологию, оказывается, что каждое лекарственное (или ядовитое) вещество имѣетъ свой особенный характеръ дѣйствія, производитъ на здоровый организмъ свои особенныя вліянія, расстройства и болѣзненные явленія, свои симптомы, совокупность которыхъ составляетъ въ

свою очередь картину болѣе или менѣе значительнаго отравленія. Сильно дѣйствующія лекарства, имѣющія обширный кругъ дѣйствія, производящія разстройства въ различныхъ частяхъ организма, обыкновенно представляютъ даже не одну, а нѣсколько группъ симптомовъ, соотвѣтствующихъ симптомамъ различныхъ болѣзней. Поэтому они могутъ и употребляться какъ врачебныя средства въ различныхъ и даже противоположныхъ случаяхъ.

Нѣкоторые лекарственныя вещества естественно должны быть между собою схожи, подобны по своимъ дѣйствіямъ и вліяніямъ на разные органы, но каждое непременно имѣетъ свои особенности. Напр. два или три лекарства, дѣйствующія болѣе или менѣе одинаково на голову, грудь и кровообращеніе, могутъ въ то же время дѣйствовать совершенно различно на пищевые и мочевые пути и т. д.

Чтобы съ полнымъ успѣхомъ избрать лекарство въ каждомъ данномъ случаѣ изъ числа указанныхъ практикою противъ болѣзни извѣстнаго наименованія, слѣдуетъ сколь возможно строго и точно сравнить по вышеописанному способу полученную картину болѣзни съ картинами болѣзнеродныхъ дѣйствій лекарствъ, указанныхъ опытомъ. Настоящее гомеопатически соотвѣтствующее средство есть именно то, котораго совокупность симптомовъ вполне соотвѣтствуетъ, вполне по-

добна совокупности симптомовъ болѣзни въ данномъ случаѣ.

Такъ какъ всякое хорошо изслѣдованное лекарство представляетъ обыкновенно не одну, а нѣсколько группъ симптомовъ, соотвѣтствующихъ различнымъ болѣзнямъ, то, само собою разумѣется, что нѣтъ надобности, чтобы при выборѣ въ данномъ случаѣ всѣ симптомы лекарства находились въ картинѣ болѣзни. Достаточно, чтобы всѣ или по крайней мѣрѣ большая часть симптомовъ болѣзни находились въ симптомахъ лекарства, т. е. чтобы изъ списка симптомовъ лекарства можно было составить такую группу, которая бы соотвѣтствовала картинѣ данной болѣзни.

Въ сущности выборъ лекарства во всякомъ случаѣ долженъ быть сдѣланъ по фармакологіи, основательное знаніе которой поэтому прежде всего и требуется отъ врача-гомеопата. Руководствующіеся лечебникомъ не могутъ выполнить этой задачи вполнѣ. Поэтому для нихъ при каждой болѣзни приводятся соотвѣтствующіе отрывки изъ фармакологіи, отрывки, характеризующіе особенность каждаго средства. Этихъ особенностей ни въ какомъ случаѣ не слѣдуетъ упускать изъ виду. Если же эти отрывки окажутся недостаточными, то остается одно средство—прибѣгнуть къ фармакологіи.

ДѢЛЕНИЕ ЛЕКАРСТВЪ И ФОРМЫ ПРЕПАРАТОВЪ.

Гомеопатическія лекарства приготовляются въ дѣленіяхъ или разведеніяхъ въ тридцати послѣдовательныхъ степеняхъ, по сотенной (центимальной) пропорціи и въ небольшомъ числѣ степеней по десятичной (децимальной) пропорціи. По сотенной пропорціи берется для перваго дѣленія (или разведенія) одинъ гранъ вещества или одна капля крѣпкой тинктуры (эссенціи) на 99 гранъ молочнаго сахару или 99 капель высоко-очищеннаго виннаго спирта. По десятичной пропорціи берется 1 гранъ или одна капля на 9 гранъ сахару или капель спирту.

Для втораго сотеннаго дѣленія берется одинъ гранъ или одна капля перваго дѣленія на 99 сахару или спирту; для третьяго дѣленія одинъ гранъ или капля втораго на 99 сахару или спирту, и т. д. до 30-го дѣленія.

Первыя дѣленія или разведенія, 1-е—3-е, а также первые децимальныя, называются *низшими*; 6-е—12-е *средними*, 18-е—30-е *высокими*.

Нѣкоторые гомеопаты доводятъ высокія дѣленія до 200-го и далѣе. Но большинствомъ врачей эти высочайшія дѣленія отвергаются, какъ излишнія и малонадежныя.

Настои (тинктуры) изъ растений и удоборастворимыхъ веществъ производятся на винномъ спир-

тѣ, нѣкоторыя первоначально на водѣ или разведенномъ спиртѣ. Нѣкоторыя кислоты, щелочи и соли также.

Металлы, земли и трудно-растворимыя вещества растираются съ молочнымъ сахаромъ болѣе или менѣе продолжительное время. Отъ продолжительности тренія зависитъ тончайшее дробленіе, увеличеніе площади соприкосновенія и вмѣстѣ съ тѣмъ такъ называемое развитіе силы лекарства. Съ этою же цѣлю тинктуры и растворы при разведеніяхъ подвергаются сильному взбалтыванію.

Вещества, въ первыхъ дѣленіяхъ приготовляемыя черезъ растираніе, имѣются до третьяго дѣленія включительно только въ видѣ порошковъ. Лекарства, приготовленные изъ тинктуръ и растворовъ, имѣются въ жидкомъ видѣ, въ капляхъ, свѣхъ дѣленій.

Жидкими лекарствами разныхъ дѣленій смачиваются крупинки или пилюльки молочнаго сахару (лекарства въ крупинкахъ).

Такимъ образомъ гомеопатическія лекарства имѣются въ трехъ видахъ: въ порошкахъ, капляхъ и крупинкахъ.

Пріемъ лекарствъ въ крупинкахъ всегда меньше пріема въ капляхъ. Для смоченія сотни мелкихъ крупинокъ достаточно одной капли жидкости; слѣдовательно 5 крупинокъ, напримѣръ, равняются $\frac{5}{100}$ одной капли даннаго разведенія.

Для удобства дачи лекарства (капля, или гранъ, или нѣсколько крупинокъ) кладутся въ порошокъ

(2 — 3 гранъ) чистаго молочнаго сахару, или же растворяють нѣсколько капель въ стаканѣ воды, всего лучше, конечно, перегнанной или по крайней мѣрѣ отварной.

СИЛА ЛЕКАРСТВЪ.

Понятіе о силѣ лекарствъ совершенно относительное. Понятно, что низшія, первыя дѣленія, какъ болѣе массивныя, должны представляться болѣе крѣпкими, болѣе сильными, но изъ этого не слѣдуетъ, чтобы высокія (18—30) были слабы, безсильны и неспособны дѣйствовать. Имѣя въ виду развитіе силы отъ расширенія, увеличенія площади соприкосновенія и отъ растиранія и взбалтыванія (движенія, въ которомъ несомнѣнно участвуетъ и вліяніе электричества) слѣдуетъ признать, что черезъ это сила развивается какъ въ низкихъ, такъ и въ высокихъ дѣленіяхъ. Высокія дѣленія сравнительно съ низкими, представляютъ меньше массы, но зато становятся болѣе тонкими, болѣе проникательными. Затѣмъ низкія и высокія дѣленія многихъ лекарствъ дѣйствуютъ различно. Весь вопросъ, стало-быть, приводится къ распознаванію, въ какомъ случаѣ можно или нужно употребить среднее или высокое дѣленіе и въ какомъ необходимо низкое. На это болѣе или менѣе опредѣленно указываетъ опытъ, практика. За общее правило принимается, что острия болѣзни требуютъ низ-

кихъ, а хроническія высокихъ дѣленій, что не исключаетъ употребленія низкихъ дѣленій и въ хроническихъ болѣзняхъ, по роду ихъ и по свойству лекарствъ.

ДАЧА ЛЕКАРСТВЪ И ПОВТОРЕНІЕ ПРИЕМОВЪ.

Величина приема. На приемъ полагается одна капля жидкости, одинъ гранъ порошка или 5 крупинокъ.

Вмѣсто крупинокъ приготавливаются также маленькія пилюли изъ того же молочнаго сахара, пропитанные лекарствомъ, и назначаемые по одной или по двѣ на приемъ.

Если порошки не развѣшаны въ аптекѣ, а отпускаются въ стеклянкѣ, то мѣркою, равною одному грану по вѣсу, служитъ маленькая костяная ложечка, которою порошокъ вынимается изъ стеклянки.

Низкія разведенія, первыя дѣленія лекарствъ въ жидкомъ видѣ, назначаются иногда по двѣ и по три капли на приемъ. Но среднія (6—12), а тѣмъ болѣе высокія разведенія (18—30) употребляются всегда по одной. Три капли 1-го дѣленія ($\frac{3}{100}$), конечно представляютъ ощутительную разницу сравнительно съ одною ($\frac{1}{100}$); $\frac{3}{10}$, и $\frac{1}{10}$ тоже видимо различныя величины. Но одна или двѣ капли 6-го дѣленія, (дробь въ 12 нулей), одна или двѣ биліонныя доли одной капли тинктуры, ощутительной разницы количества

вещества представить не могутъ. Еще менѣе ощутительна будетъ эта разница между одною и двумя каплями въ 30-мъ дѣленіи (дробь въ 60 нулей). Между-тѣмъ въ перелитыхъ лишнѣхъ нѣсколькихъ капляхъ помѣхою дѣйствию лекарства можетъ явиться излишекъ количества спирта, на которомъ оно разведено. Слѣдовательно, всего лучше держаться установленнаго Ганеманомъ правила и давать не болѣе одной капли на приемъ.

Повтореніе приемовъ. Высокія и среднія дѣленія даются рѣже, низкія (первыя) чаще. Высокія дѣленія, употребляемыя преимущественно въ хроническихъ болѣзняхъ, даются по два и по одному приему въ сутки; въ нѣкоторыхъ случаяхъ и рѣже, по одному приему на недѣлю или даже на нѣсколько недѣль.

Ганеманъ постановилъ общимъ, конечно, трудно, выполнимымъ правиломъ—выжидать окончанія дѣйствія каждаго приема, т. е. повторить его или дать такой же приемъ другаго лекарства только тогда, когда первый приемъ кончилъ свое дѣйствіе. Но, кромѣ чрезвычайныхъ трудностей, представляемыхъ этою методою, практика показала, что во многихъ, особенно острыхъ болѣзняхъ или при жестокихъ нервныхъ и воспалительныхъ боляхъ, учащенные приемы быстрѣе приводятъ къ желаннымъ результатамъ, нежели выжиданіе, часто мучительное. Затѣмъ тою же практикою выяснено, что въ острыхъ болѣзняхъ данный приемъ

вообще скорѣе истрачивается, окончиваетъ свое дѣйствіе, и состояніе организма требуетъ возобновленія содѣйствія, творенія приема. Поэтому и принято въ острыхъ болѣзняхъ, смотря по свойству каждой, повторять приемы черезъ 4—2 часа и черезъ часъ. Въ крайнихъ угрожающихъ случаяхъ дача лекарства повторяется даже черезъ 10 минутъ. Въ болѣзняхъ, сопровождающихся частыми изверженіями, рвотой или поносомъ, всего лучше повторять приемы послѣ cadaго изверженія. Замедленіе и прекращеніе изверженій всего лучше укажемъ мѣру потребности лекарства.

Для учащенныхъ приемовъ, когда вмѣстѣ съ тѣмъ нужно избѣжать дачи большого количества лекарства, какъ напр. при нервныхъ боляхъ, растворяютъ нѣсколько капель лекарства въ водѣ, 3—8 капель на стаканъ, и даютъ по чайной, десертной или столовой ложкѣ или по глотку, какъ питье.

Опытъ обращающихся съ простымъ народомъ, рѣдко способнымъ владѣть такою мелкою вещью, какъ стекляночка и капля гомеопатическаго лекарства, и еще рѣже умѣющимъ соблюсти необходимую чистоту, показалъ, что всего лучше давать ему лекарство или въ приготовленномъ порошокѣ или уже разведенное въ соотвѣтствующемъ потребности количествѣ воды, въ большій стеклянкѣ, и назначить принимать полурюмками.

При повтореніи приемовъ во всякомъ случаѣ слѣдуетъ внимательно наблюдать за мѣрою по-

требности лекарства. При улучшеніи состоянія больного никогда не слѣдуетъ продолжать давать въ томъ же количествѣ или такъ же часто, какъ въ началѣ, т. е. какъ скоро наступитъ видимое улучшеніе, нужно давать лекарство постепенно рѣже или даже совсѣмъ прекратить. Не надо забывать, что лекарство гомеопатическое служить только къ тому, чтобы возбудить реакцію въ организмѣ и тѣмъ помочь ему самому побѣдить болѣзнь, избавиться отъ нея. Излишекъ лекарства, или пройдетъ мимо безъ всякой пользы, или же можетъ только напрасно волновать и, вызывая собственно ему принадлежащіе симптомы, затемнять дѣло леченія.

Гомеопатическое ожесточеніе. Иногда случается, что лекарство, довольно близко подходящее, но не въ точности соотвѣтствующее, волнуется, вызываетъ новые симптомы и боли, но ожидаемаго дѣйствія не производитъ; или же лекарство, хотя и вѣрно, избранное, но данное въ слишкомъ крупной дозѣ, не соотвѣтствующей чувствительности организма, вмѣсто укрощенія страданій, усиливаетъ ихъ. То и другое явленіе называется гомеопатическимъ ожесточеніемъ. Иногда, будучи не очень несносно, оно можетъ дать полезный оборотъ дѣлу и требуетъ только выжиданія, времени для постепеннаго стиханія припадковъ. Если же оно очень сильно, продолжительно или явно вредитъ больному, отнимая напримѣръ

сонъ и спокойствіе, то требуетъ уничтоженія посредствомъ антидотовъ.

АНТИДОТЫ.

Антидотами (противоядіями) называются врачебныя средства, уничтожающія дѣйствіе ядовъ. Когда отравленіе причинено такимъ количествомъ ядовитого вещества, которое, оставаясь въ организмѣ, продолжаетъ свое разрушительное дѣйствіе, то прежде всего нужно озаботиться о выведеніи, удаленіи его, или же по крайней мѣрѣ о нейтрализаціи, т. е. о превращеніи яда въ вещество безвредное. Это достигается физико-химическими вспомогательными средствами (см. ниже статью Отравленія). Гомеопатическіе антидоты тутъ служить не могутъ. Но они служатъ къ уничтоженію послѣдствій отравы, къ излеченію болѣзни, которая остается по нейтрализаціи или выведеніи массы ядовитого вещества, а также и къ уничтоженію дѣйствія гомеопатическаго лекарства. Они избираются по тому же закону подобія, какъ и лекарство вообще. Чѣмъ ближе вещество по своимъ симптомамъ похоже на другое, тѣмъ болѣе вѣрнымъ антидотомъ оно будетъ служить.

СОХРАНЕНИЕ ЛЕКАРСТВЪ.

Гомеопатическія лекарства должно сохранять не иначе, какъ въ совершенно новыхъ стеклянкахъ,

заткнутых новыми и совершенно плотными пробками. Стлянка и пробка, служившія для иного употребленія или для другаго лекарства, уже не годятся для сохраненія гомеопатическаго лекарства, которое отъ малѣйшей примѣси можетъ испортиться. Кромѣ ярлычковъ на стлянкахъ, для предупрежденія ошибки и смѣшеній, надписи дѣлаются также и на пробкахъ. Ящикъ, ларчикъ или шкафъ съ лекарствами ставится въ чистомъ, сухомъ и не жаркомъ мѣстѣ, внѣ вліянія солнца и печи, такъ, чтобы никакой чадъ, дымъ или сильный запахъ не могли проникнуть до лекарства. Нѣкоторыя лекарства измѣняются уже отъ одного дневнаго свѣта, если долго ему подвергаются. Тинктуры и низкія разведенія крѣпко пахнущихъ или улетучивающихся веществъ, каковыя камфора, креозотъ и мускусъ, должны сохраняться отдѣльно, чтобы не сообщали своихъ испареній другимъ. Стлянки съ лекарствами вообще должны становиться стоймя, чтобы пробка не пропитывалась. Для этого въ доскахъ или днищахъ ящиковъ высверливаютъ соотвѣтствующія величинѣ стляночекъ отдѣленія или гнѣзда.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЯ СРЕДСТВА.

Вспомогательныя средства слѣдуетъ отличать отъ лекарствъ, какъ врачебныхъ собственно. Лекарство во всякомъ случаѣ должно быть избрано

по закону подобія: иначе оно дѣйствовать не можетъ. Если такъ называемыя аллопатическія лекарства иногда попадаютъ вѣрно, дѣйствуютъ хорошо, то они дѣйствуютъ именно по закону подобія. Въ этомъ всякій легко можетъ убѣдиться справкою въ гомеопатической фармакологіи. Вся разница тутъ только въ излишкахъ количества. Въ однихъ случаяхъ излишки эти проходятъ безслѣдно, какъ ненужныя; въ другихъ обременяютъ больной организмъ, замедляютъ выздоровленіе или же наконецъ требуютъ дополнительнаго леченія, выгона, выпариванія лекарствъ кровочистительными, декоктами, ваннами и т. д., при гомеопатическомъ леченіи вовсе ненужными, какъ не нужны часто вредныя илипо-крайней-мѣрѣ мучительныя отвлекающія средства: мушки, заволоки, прижиганія и т. д.

Вспомогательными средствами и при гомеопатическомъ леченіи могутъ и должны служить, начиная отъ устраненія вредящихъ вліяній и установленія соотвѣтствующей діеты, все физическіе дѣятели: свѣтъ, воздухъ, вода, движеніе (гимнастика), электричество,—все, что можетъ возбудить въ больномъ организмѣ потребную реакцію и поставить его въ такія условія, которыя бы содѣйствовали специфическимъ лекарствамъ или даже просто давали имъ возможность дѣйствовать. Этому содѣйствію гомеопатія отнюдь не отвергаетъ; напротивъ. Но, къ сожалѣнію, нерѣдко случается видѣть, какъ, въ силу увлеченія или невиннаго за-

блужденія, простое вспомогательное средство, на-
примѣръ холодная вода или гимнастика, при-
нимается за совершенно достаточное, радикальное
или же употребляется въ такомъ излишествѣ, что
причиняетъ явный вредъ. И этому увлеченію под-
даются не только больные, но даже и врачи.

Употребленіе вспомоgetельныхъ средствъ тре-
буетъ чрезвычайной осмотрительности и еще бѣль-
шаго знанія дѣла, нежели употребленіе самыхъ го-
меопатическихъ лекарствъ. Не въ попадъ данное
гомеопатическое лекарство, особенно среднихъ и
высокихъ дѣленій, пройдетъ безслѣдно и въ край-
немъ случаѣ причинитъ напрасную трату времени.
Но неосторожное приложеніе героическаго вспо-
моgetельнаго средства, напpимѣръ холодной воды,
можетъ причинитъ важное разстройство и даже
смерть. Ревматизмы, вызываемые особенно само-
дѣльнымъ водолеченіемъ, не только не рѣдкость, но
дѣло самое обыкновенное. Ледъ и холодныя при-
мочки по случаю ушиба, или воспаленія, напpимѣръ
у женщины во время регулъ, могутъ имѣть
неисчислимыя послѣдствія. Я зналъ одного дюжа-
го сорокалѣтняго мужчину, которому по предпо-
ложенію воспаленія въ мозгу былъ наложенъ ледъ,
на голову, а на другой день оказалось, что жаръ про-
исходилъ отъ оспы, которая, разумѣется большею
частью скрылась и послѣдовало совершенное раз-
рушеніе здороенаго организма, лишеніе возмж-
ности заниматься промысломъ и черезъ два года
смерть въ чахоткѣ. Въ прошломъ году женѣ од-

ного извѣстнаго художника, при послѣродовомъ воспаленіи матки, былъ наложенъ снѣгъ на животъ и въ полость, и она черезъ нѣсколько часовъ умерла. Въ другой извѣстной семьѣ ребенокъ въ скарлатинѣ, обернутый въ холодныя простыни, черезъ двадцать четыре часа умеръ именно потому, что совершенно уже выступившая сплошная сыпь скрылась, какъ и слѣдовало предвидѣть. Систематическое употребленіе холодной воды въ острыхъ сыпныхъ болѣзняхъ, лѣтъ двадцать пять тому назадъ предложенное и нынѣ много употребляемое (при гомеопатическомъ леченіи вовсе ненужное), имѣетъ смыслъ только тогда, когда применяется какъ могущественный возбудитель реакціи при трудномъ или совершенно задерживаемомъ высыпаніи. Когда же сыпь уже выступила, то обертываніе въ намоченные холодною водою простыни не можетъ не быть убійственнымъ.

Считаю долгомъ обратить особенное вниманіе на эти плачевныя заблужденія именно потому, что первое и важнѣйшее назначеніе домашняго лечебника — предостерегать и предупреждать опасности, не давать маленькимъ болѣзнямъ разростаться въ большія, неисправимыя.

Къ вспомогательнымъ средствамъ относятся также допускаемыя гомеопатіею *наружныя*, о которыхъ см. особую статью въ концѣ книги.

ДІЕТА.

Въ пищу и въ особенности въ видѣ приправъ

употребляется очень много такихъ веществъ, которыя имѣютъ лекарственныя свойства, слѣдовательно, будучи принимаемы въ одно время съ лекарствомъ, уничтожаютъ его дѣйствіе. Всѣ такія вещества и сверхъ того трудноваримыя, обременяющія желудокъ больному, естественно, запрещаются. Такъ запрещается: свинина, ветчина, колбасы, гусь, утка, лососина, семга, балыки, кильки, сельди, копченныя, соленныя и жирныя вещи вообще; салатъ, пикули, грибы, трюфели, капуста, лукъ, чеснокъ, рѣдька, хрѣнь, петрушка, тминъ, анисъ, инбирь, шафранъ, перецъ, корица, горчица, мускатный орѣхъ, ваниль, гвоздика, лавровый листъ, шалфей, мята, цикорія и всѣ вообще пряности; уксусъ, лимонъ, лимонады и квасы, и всѣ кислоты; вино, водка, ромъ, коньякъ, ликеры, вообще спиртные напитки; крѣпкое пиво, медъ, кофе, крѣпкій чай и шоколадъ съ пряностями, все горячительное; конфекты и сухія варенья, въ которыхъ могутъ быть пряности; всѣ минеральныя воды, за исключеніемъ такой, которая можетъ быть назначена какъ соотвѣтствующее лекарство; всѣ зубныя порошки и полосканья съ лекарственными примѣсями; всѣ духи, помады, курительныя порошки и т. п.

Само собою разумѣется, что каждый особенный случай при этомъ требуетъ особеннаго устройства діеты, смотря по роду болѣзни и по состоянію больного. Напримѣръ зрѣлыя, сладкія плоды, яблоки, сливы, виноградъ, большею частью позво-

ленные, были-бы вредны страждущему поносомъ; чистая холодная вода лучшее питье во всѣхъ, какъ острыхъ, такъ и хроническихъ болѣзняхъ, однакъ при чрезвычайномъ расслабленіи желудка и кишечнаго канала можетъ оказаться вредною.

Строгая дієта вообще необходима, въ особенности въ острыхъ болѣзняхъ. Въ хроническихъ же, за устраненіемъ тѣхъ вещей и вліяній, которыя прямо содѣйствуютъ къ поддержанію болѣзни, дієта не столько строга и употребленіе многихъ вещей даже сильно лекарственныхъ, какъ кофе и табакъ, и многія другія, можетъ быть допущено особенно, если они издавна вошли въ привычку и если отнятіе ихъ причиняетъ вредное измѣненіе состоянія больного. Въ такихъ случаяхъ достаточно бываетъ уменьшить количество или привычную порцію на половину, или же разбавить, разбавить. Такъ пожилымъ людямъ, привыкшимъ пить за обѣдомъ вино, можно разбавить его водою; кофе также можно разбавить водою и сверхъ того переваривать, то есть дать нѣсколько лишнихъ разъ вскипѣть, чтобы побольше выпаривался.

Къ тѣмъ же дієтетическимъ мѣрамъ, естественно, принадлежитъ и забота о чистотѣ тѣла и окружающаго воздуха, о соотвѣтствующей состоянію больного температурѣ, о достаточномъ и неизлишнемъ снѣ, о необходимости движенія для такихъ больныхъ, которые не принуждены лежать.

В. Дерикеръ.

ГЛАВА I.

§ 1.

БОЛѢЗНИ ГОЛОВЫ.

1. ГОЛОВНАЯ БОЛЬ.

Страданіе это встрѣчается чрезвычайно часто, въ особенности потому, что оно обыкновенно сопровождаетъ почти всѣ острые и очень многія хроническія болѣзни. Понятно, что мы здѣсь можемъ говорить только о тѣхъ головныхъ боляхъ, которыя являются или въ видѣ самостоятельныхъ болѣзней, или же въ видѣ главнаго припадка другой менѣе ясно опредѣленной болѣзни.

Выборъ соотвѣтствующаго каждому случаю средства затрудненъ съ одной стороны чрезвычайнымъ разнообразіемъ и непостоянствомъ появляющихся припадковъ, съ другой—трудностью отысканія причинъ головной боли, большею частью происходящей отъ разстройства другихъ органовъ. Между тѣмъ дознаніе этихъ причинъ совершенно необходимо для успѣха леченія.

Нужно замѣтить при этомъ, что опредѣленія ближайшей причины боли рѣдко бываетъ доста-

точно для выбора лекарства: главное во всякомъ случаѣ точное опредѣленіе характеристическаго симптома, признака и припадка *) и свойства боли.

Головная боль отъ **механическихъ причинъ**, каковы: ушибъ, паденіе, сотрясеніе мозга и т. д., появляется бѣльшею частью непосредственно вслѣдъ за поводомъ и сверхъ того легко отличается по своимъ характеристическимъ признакамъ, — стѣсненію, тяжести, круженію и въ трудныхъ случаяхъ рвотѣ, потемнѣнію зрѣнія, оглушенія и проч. Главное средство тутъ почти всегда *Arn.*, которая можетъ быть употреблена и наружно (20—30 капель тинктуры на чайную чашку холодной воды; при поврежденіи кожи растворъ дѣлають слабѣе). Въ трудныхъ случаяхъ иногда требуются *Acon.* и *Bell.*, въ хроническихъ когда уже много времени прошло по поврежденіи, могутъ быть полезными *Arg.-nitr.*, *Cicuta* и *Calcarea*.

Головная боль вслѣдствіе чрезмѣрнаго **умственного напряженія, сидячей жизни и ночнаго бдѣнія** почти всегда сопровождается разстройствомъ пищеваренія и страданіями печени и требуетъ преимущественно *Nux-vom.* и *Sulph.*

*) Въ иностранныхъ языкахъ слово *симптомъ* выражаетъ оба эти понятія. Русскій языкъ гораздо точнѣе разграничиваетъ ихъ.

Головная боль послѣ **пированія** и неумѣреннаго употребленія **крѣпкихъ напитковъ** требуетъ преимущественно *Carbo-veg.*, *Nux-vom.* и *Arsen.*

Головная боль отъ **прилива крови** часто происходитъ отъ хроническаго страданія легкихъ или сердца, или отъ иныхъ разстройствъ кровеобращенія, и отличается въ особенности жаромъ и краснотою лица, біеніемъ жилъ головы и шеи, головокруженіемъ, усиленіемъ боли отъ движенія и наклоненія, сердцебіеніемъ. Главныя средства противъ такой боли: *Aconit.*, *Bellad.*, *Bryon.*, *Arn.*, *Nux-vom.*, *Glonoin.* и *Gelseminium*, который на основаніи своего фізіологическаго дѣйствія оказывается вообще могущественнымъ средствомъ противъ прилива крови къ головѣ (см. ударъ). При хронической головной боли отъ приливовъ *Nitr.-ac.*

Головная боль отъ **малокровія** или **блѣдной немочи** часто сопровождается такими же принадлежками, какъ и предъидущая, но только сверхъ того обыкновенно замѣчается общая зябкость, остываніе конечностей и блѣдность лица. Лучшія средва здѣсь: *Puls.*, *Ferr.*, *Natr.-m.*, *Calc.*; также *Phosph.*, *Chin.*, *Plat.*, *Aur.*, *Caps.*, *Coff.*

Катарральная головная боль легко распознается по присутствію насморка и также потому, что страдаютъ преимущественно лобъ около переносья и глаза. Здѣсь приличны: *Aconit.*, *Merc.*, *Nux-vom.*, *Euphrasia*, *Merc.*, *Sil.*, *Dulc.*

Гастрическая головная боль вслѣдствіе обремененія желудка съ тошнотою, рвовой и неправильными испражненіями на низъ, требуетъ *Antim.*, *Ipec.*, *N.-vom.*, *Puls.*, *Veratr.*; также *Bry.*, *Sep.*, *Sulph.*

Нервная, большею частью односторонняя головная боль (мигрень) часто появляется періодически, съ правильными перемежками, съ сверлящею болью на ограниченномъ мѣстѣ, какъ отъ гвоздя, съ тошнотою, рвотою, остываніемъ и блѣдностью кожи, водянистою мочей и чрезвычайною чувствительностью ко всякому шуму, движенію и прикосновенію, въ особенности у женщинъ и дѣвушекъ. Главныя средства: *Argent.-nitr.*, *Bell.*, *Calc.*, *Coff.*, *Coloc.*, *Ferr.*, *Gelsem.*, *Ipec.*, *Merc. sol.*, *N.-vom.*, *Plat.*, *Sanguinaria*, *Sep.*, *Sil.*, *Spig.*, Изъ нихъ *Bellad.* особенно дѣйствительное средство, способное не только сократить и уменьшить припадки, но въ большей части случаевъ и уничтожить расположеніе къ обыкновенной мигрени. *Coffea* оказываетъ вообще только паллятивное дѣйствіе и то преимущественно только тогда, когда употребляется въ большихъ приемахъ или въ видѣ крѣпкаго отвара. *Paulinia* въ послѣднее время такъ восхваленная, тоже имѣетъ значеніе, не болѣе какъ поллятива. Вообще нужно замѣтить, что нервная головная боль, также какъ и лицевая, въ огромномъ большинствѣ случаевъ есть произведеніе или отраженіе страданія какого-

нибудь внутреннего органа,—печени, селезенки, матки и т. д.,—или худосочія, болѣе или явно отлагающаго свои продукты въ тканяхъ, очень отдаленныхъ отъ головы, а потому и излеченіе такой невралгій возможно только такимъ средствомъ, которое соотвѣтствуетъ общему состоянію больного. Единственнымъ руководствомъ, стало-быть, можетъ быть только законъ подобія; единственнымъ правиломъ, ведущимъ къ цѣли—обособленіе cadaго даннаго случая.

Въ близкомъ сродствѣ съ мигренью **истерическая** головная боль, которая часто мгновенно поражаетъ женщинъ и сопровождается несчетнымъ множествомъ дѣйствительныхъ, а иногда и воображаемыхъ страданій. Здѣсь, кромѣ указанныхъ противъ мигрени, пригодны бывають еще: *Aur.*, *Cocc.*, *Ignat.* и *Valer.*

Ревматическая головная боль является вслѣдствіе простуды, легко перемѣняетъ мѣсто, часто сопровождается терзающею, тянущею зубною болью и ночью обыкновенно не терпитъ теплоты постели. Здѣсь указаны въ особенности: *Acon.*, *Bry.*, *Cham.*, *Coloc.*, *Merc.*, *N.-vom.*, *Puls.*, *Rhus.*, *Spigel.* и *Silic.*

Ломотная головная боль, вообще рѣдкая и встрѣчающаяся только у дѣйствительно страждущихъ ломотою и артритическими отложеніями, требуетъ преимущественно *Acon.*, *Bry.*, *Calc.*, *Coloc.*, *Ignat.*, *Nitr.-ac.* и *Sep.*

Противъ сифилитической головной боли лучшія средства: *Jod.*, *Merc.*, *Mezer.*, *Nitr.-ac.*, *Aur.*, *Laches.*

При выборѣ по припадкамъ можно руководствоваться слѣдующими указаніями:

Aconitum при стѣсненіи, тяжести, полнотѣ въ головѣ, головокруженіи, вытѣсненіи изо лба, въ особенности при наклоненіи; при ощущеніи колебанія или движенія мозга на ходу, съ ознобомъ или лихорадочнымъ жаромъ, краснымъ, вздутымъ лицомъ, красными глазами; при крѣпкомъ, полномъ и скоромъ пульсѣ, сильномъ волненіи и безпокойствѣ; при усиленіи боли отъ движенія, разговора и шума.

Arnica при стѣсненіи въ головѣ, головокруженіи при вставаніи, жарѣ въ головѣ, при холодѣ прочихъ частей тѣла, давленіи во лбу или сжиманіи, колотьи и боли въ вискахъ, какъ отъ гвоздя, съ кровотеченіемъ изъ носу, отуманенными глазами и желчною рвотой.

Arsenicum при періодической головной боли въ одной половинѣ головы съ ожесточеніемъ въ комнатѣ и улучшеніемъ на воздухѣ; при стучащей боли и чувствительности кожи на головѣ.

* *Belladonna* при тяжести, полнотѣ, круженіи, давящей или распирающей боли; при колотѣ или зыбленіи и біеніи въ мозгу какъ въ нарывѣ; при ожесточеніи отъ всякаго движенія, разговора, шума, яркаго свѣта и также вечеромъ и ночью; при краснотѣ лица и глазъ, біеніи въ вискахъ,

жарѣ и приливѣ въ голову, чувствительности и боли подѣ ложечкой, позывѣ на рвоту и дѣйстви- тельной рвотѣ.

Calcarea при давящей, стучащей, тянущей боли въ одной сторонѣ головы, съ тошнотою, кислотою въ желудкѣ; при изжогѣ и ротѣ; при тяжести головы, съ давленіемъ на глаза; при ледяномъ холодѣ въ головѣ, внутри и снаружи, чувстви- тельности въ головной кожѣ и появленіи боли рано утромъ.

Chamomilla при терзающей, дергающей боли въ одной сторонѣ головы, до скулъ и зубовъ, въ осо- бенности отъ простуды и скрывшейся испарины съ краснотою одной щеки и блѣдностью другой, обильнымъ потомъ на головѣ и приливомъ въ го- лову, особенно у чувствительныхъ, нетерпѣливыхъ и строптивыхъ людей.

Coffea при ощущеніи какъ-будто мозгъ разо- рванъ или раздробленъ, или при боли въ одной сторонѣ головы, какъ отъ гвоздя; при чрезвычай- ной чувствительности къ шуму, сильномъ волне- ніи, плаксивости, тоскѣ или необыкновенной бод- рости и безсонницѣ, въ особенности также вслѣд- ствіе душевныхъ волненій и умственныхъ напря- женій.

Colocynthis при жестокихъ, терзающихъ боляхъ въ одной половинѣ головы, періодическихъ при- падкахъ съ тошнотою и рвотой, съ давленіемъ во лбу и ожесточеніемъ отъ наклоненія и лежанія

на спинѣ; при водянистой мочѣ и сильно пахнущей испаринѣ.

Ignatia при давящей боли въ переносѣ, съ тошнотою, уменьшающеюся отъ наклоненія; при распираніи въ головѣ, стучаніи или боли, какъ отъ гвоздя, съ тошнотою, потемнѣніемъ въ глазахъ, свѣтобоязнію, блѣдностію лица, обильною водянистою мочею, пугливостію, боязнію и уныніемъ, въ особенности послѣ испуга или досады.

Ipecacuanha при головной боли съ тошнотою и рвотою, при желудочномъ разстройствѣ; при колющей и терзающей боли въ особенности во лбу, ожесточающейся отъ движенія и прикосновенія, или при ощущеніи, какъ-будто мозгъ и всѣ головныя кости разбиты.

Nux-vomica при періодическихъ головныхъ боляхъ, въ одной сторонѣ головы, въ особенности рано утромъ и послѣ пищи, усиливающихся отъ движенія, умственного напряженія, вина и кофе; при давящей тяжести, приливѣ крови, ощущеніи, какъ-будто мозгъ разбитъ или какъ-будто гвоздь воткнуть въ черепъ; когда каждый шагъ отдается въ мозгу сотрясеніемъ; при ожесточеніи боли отъ напряженія мысли и движенія глазъ, съ тошнотою, рвотою и запоромъ.

Pulsatilla при дергающей или схватками терзающей и колющей боли съ приливомъ крови, тяжестью въ головѣ, стучаніемъ, шумомъ въ ушахъ, круженіемъ, блѣдностію, плаксивостію, тошнотою, отсутствіемъ жажды, біеніемъ сердца, зябкостію,

холодомъ конечностей, ожесточеніемъ по вечерамъ и ночью, и улучшеніемъ на воздухѣ.

Sepia при продолжительныхъ и частныхъ припадкахъ головной боли съ ощущеніемъ сверленія, распиранія и стучаня, въ одной половинѣ головы; съ тошнотою, рвотою, приливомъ крови, свѣтобоязнію и трудностью открыть глаза; при ожесточеніи отъ движенія и поворачиванія головы, по утрамъ когда проснется; при хроническихъ расстройствахъ пищеваренія, вздутости и чувствительности около печени, желтомъ цвѣтѣ кожи и желтыхъ пятнахъ на кожѣ.

Spigelia при періодическихъ припадкахъ, имѣющихъ правильный типъ; также при роющей и терзающей боли, которая чрезвычайно ожесточается при малѣйшемъ движеніи, отъ испраженія, разговора, шума и т. д., когда боль занимает преимущественно одну сторону и сопровождается болью въ глазу и блѣдностью лица.

Glonoin при давящей или стучащей головной боли съ головокруженіемъ, приливомъ, жаромъ, біеніемъ; съ ожесточеніемъ при движеніи, наклоненіи или потрясеніи головы, при ощущеніи какъ будто мозгъ растягивается и волнообразно движется; при полномъ, ускоренномъ и неправильномъ пульсѣ.

2. ГОЛОВОКРУЖЕНІЕ.

При этомъ страданіи также должно тщательно принимать въ соображеніе причины и сопровождающія обстоятельства, тѣмъ болѣе, что оно рѣдко является самостоятельнымъ болѣзненнымъ явленіемъ, а напротивъ, большею частію зависить отъ другихъ болѣзней.

Головокруженіе большею частію происходитъ отъ **прилива крови** къ головѣ или, лучше сказать, затрудненнаго и задержаннаго возвращенія крови изъ мозга и головныхъ жилъ,—обстоятельства, часто порождаемыя хроническими страданіями сердца или легкихъ, или брюшныхъ органовъ. Въ этихъ случаяхъ приличными средствами могутъ быть: *Acon.*, *Bell.*, *Bry.*, *N.-vom.*, *Phosph.*, *Ser.* **Примгновенныхъ приливахъ** *Gelsemin.*; въ хроническихъ случаяхъ *Sulph.* Головокруженіе можетъ также происходить и отъ **недостатка крови**; тогда помогаютъ: *Puls.*, *Ferr.*, *Chin.*, *Natr-m.*, *Baryt.*, *Graph.*, *Silic.* Когда оно происходитъ отъ **желудка** вслѣдствіе обремененія, то приличны бываютъ: *Acon.*, *Antim.*, *Nux-vom.*, *Puls.* и *Sulph.* Когда оно происходитъ отъ неумѣреннаго употребленія **вина** и крѣпкихъ напитковъ вообще: *N.-vom.*, *Op.*, *Coff.* Отъ сильныхъ **душевныхъ волненій**, испуга, страха, тоски, радости: *Acon.*, *Coff.*, *Cham.*, *Ign.*, *N.-vom.* Отъ

механическихъ причинъ, паденія, ушиба, потрясенія: *Arn.* Отъ **качанія** или ѣзды въ экипажѣ, или по водѣ: *Coss., Ner., Hyosc.* Отъ **нервнаго** головокруженія (или происходящаго вслѣдствіе органическихъ причинъ): *Phosph., Rhus.*

По припадкамъ выбрать можно:

Aconitum, когда головокруженіе обнаруживается въ особенности при вставаніи и наклоненіи, съ стѣсненіемъ въ головѣ, съ ощущеніемъ какъ будто что вертится въ головѣ, и когда припадки усиливаются въ теплѣ.

Belladonna, когда головокруженіе сопровождается мельканіемъ въ глазахъ, одурѣніемъ, тоскою и краснотою лица, особенно при движеніи и наклоненіи.

Nux-vomica при головокруженіи тотчасъ послѣ пищи или послѣ напряженія головы, или утромъ, при движеніи на воздухѣ, или въ постелѣ, лежа на спинѣ, съ шумомъ въ ушахъ, полнотою въ желудкѣ и внизу живота, пученіи и запорѣ.

Phosphorus, когда голова кружится, въ особенности утромъ и вечеромъ въ постелѣ, также послѣ пищи и сидя, съ приливомъ въ голову, тошнотою и давящею головою болью.

Opium при головокруженіи съ дурнотой, какъ отъ хмѣльнаго, съ сонливостію, красными, стекловидными глазами, расширенными зрачками, темненью передъ глазами и блѣдностью лица; сильнѣе, когда садится въ постелѣ.

Pulsatilla, когда головокруженіе дѣлается при поднятіи и наклоненіи головы, и вечеромъ въ постелѣ, съ отяжелѣніемъ, съ шумомъ въ ушахъ, блѣдностію лица, зябкостью, тошнотою и рвотой.

Rhus, когда голова кружится, въ особенності ложась спать и утромъ, при вставаніи, со страхомъ смерти, колебаніемъ и зябкостью въ головѣ на каждомъ шагѣ, какъ-будто мозгъ жидокъ.

Veratrum при головокруженіи съ тошнотою, рвотою, поносомъ, холоднымъ потомъ, осунувшимся лицомъ и тоскою.

Cocculus при головокруженіи, какъ-бы отъ опьяненія, особенно послѣ пищи и питья или отъ умственного напряженія, съ ощущеніемъ пустоты въ мозгу и тошнотою.

Вообще при склонности къ головокруженію должно избѣгать употребленія кофе, вина и чая, ночныхъ бдѣній, напряженій головы и душевныхъ волненій.

3. ВОСПАЛЕНІЕ МОЗГА.

Прежде всего нужно замѣтить, что воспаленіе мозга встрѣчается гораздо рѣже, чѣмъ обыкновенно принимаютъ, потому что часто смѣшиваютъ съ нимъ разныя другія болѣзненные явленія. Такъ, напримѣръ, эта болѣзнь у взрослыхъ происходитъ почти единственно вслѣдствіе меха-

нических поврежденій и сотрясеній мозга, или вслѣдствіе солнечнаго удара, а у дѣтей то, что обыкновенно называется этимъ именемъ, въ сущности вовсе не воспаленіе мозга; тутъ вслѣдствіе воспаленія легкихъ, нервной горячки, скарлатины, кори, оспы и т. п. обнаруживаются болѣзненные явленія, которыя хотя и имѣютъ кажущееся сходство съ воспаленіемъ мозга, за которое принимаются, однакоже по сущности и по происхожденію различны и бываютъ большею частью слѣдствіемъ задержаннаго кровообращенія или измѣненія и разложенія въ составѣ крови.

Кромѣ слѣдствій механическихъ поврежденій, потрясеній мозга, солнечнаго удара и тому подобныхъ воспаленій мозга, эта болѣзнь у дѣтей иногда встрѣчается въ самостоятельномъ видѣ, подъ именемъ **острой головной водянки**, которая состоитъ въ образованіи туберкулъ на мозговыхъ оболочкахъ и находится въ тѣсной связи съ общимъ туберкулезнымъ или золотушнымъ сложеніемъ.

Самые обыкновенные и рѣзкіе припадки этой болѣзни: сильная лихорадка, сухой жаръ и краснота лица, головокруженіе, безпамятство, сонливость, бредъ, скапываніе глазъ, судороги, рвота и запоръ. Однакожь этихъ припадковъ неврачу вовсе недостаточно, чтобы различить воспаленіе мозга; они пригодны только къ тому, чтобы обратить вниманіе на состояніе больного и во-время пригласить врача. На всякій случай

до дальнѣйшихъ распоряженій слѣдуетъ давать: 1 приемъ *Acon.* и потомъ каждый часъ по приему *Bell.* Если же это не окажетъ дѣйствія, то давать *Apis.* При спячкѣ пригоднѣе бываетъ *Op.*, при судорогахъ и чрезвычайномъ безпокойствѣ *Stramonium.*

Если вслѣдствіе паденія или ушиба головы, появятся нѣкоторые изъ означенныхъ припадковъ, головокруженіе, рвота или скашивание глазъ и т. д., то очень вѣроятно, что мозгъ потрясенъ и есть начало воспаленія. Тогда необходимо до прибытія врача давать *Arn.* внутрь и наложить компрессъ съ разведенною въ водѣ *tinct. Arn.* (1 часть тинктуры на 4 части воды).

Во всякомъ случаѣ, послѣ ушиба головы, особенно у дѣтей, оказываются ли означенные признаки сотрясенія или нѣтъ, благоразуміе требуетъ дать нѣсколько приемовъ *Arnicae*, которая можетъ предупредить послѣдствія сотрясенія. Это нужно въ особенности потому, что послѣдствія иногда, при всемъ видимомъ здоровьи, обнаруживаются внезапно черезъ два-три дня и могутъ быть опасны.

4. ГОЛОВНАЯ ВОДЯНКА.

Такъ называется дѣйствительно непомѣрное скопленіе воды въ полостяхъ черепа. Оно можетъ быть прирожденное, можетъ быть и приобрѣтеннымъ вслѣдствіе воспаленія или другихъ причинъ отложенія. Важнѣйшіе признаки этой

болѣзни суть: несоразмѣрная величина черепа сравнительно съ лицомъ, часто имѣющимъ старческій видъ; замедленное отвердѣніе темячка, которое часто бываетъ напряжено и выпукло, и при дыханіи не движется (не приподымается и не опускается); головная боль, головокруженіе или по-крайней-мѣрѣ чрезвычайный страхъ унасть и отвращеніе отъ всякаго движенія; сонливость попеременно съ безпокойнымъ сномъ и пугливымъ пробужденіемъ; сперва лишняя чувствительность, а потомъ притупленіе всѣхъ органовъ чувства, умственныя способности сперва довольно долго нормальныя, потомъ отупѣніе; неподвижныя глаза; опущеніе верхней вѣки, скашивание глазъ и ослизненіе; невѣрныя движенія, автоматическія схватыванія руками, жеваніе и глотаніе несознательное, судороги, параличъ; жару мало, пульсъ не скорый; животъ втянутый или плоскій; рвота, запоръ или произвольныя испраженія.

Эта болѣзнь можетъ длиться 2—3 недѣли, но можетъ и въ нѣсколько часовъ убить. Если она прирожденная, то виды на изцѣленіе очень сомнительны. Приобрѣтенная, обыкновенно имѣющая острое теченіе, представляетъ болѣе надежды на успѣхъ, но во всякомъ случаѣ принадлежитъ къ весьма труднымъ болѣзнямъ.

Въ началѣ большею частью бываетъ показана *Bellad.*, кромѣ тѣхъ случаевъ, когда болѣзнь произошла несомнѣнно отскаго потрясенія или ушиба: тогда болѣе прилична *Arnica*. При

дальнѣйшемъ развитіи болѣзни приличны бываютъ: *Bryon.*, *Apis*, *Op.*, *Sulph.*, *Hyosc.*, *Stramon.*, *Zinc.*, *Prosp.*, *Canthar.* Противъ прирожденной головной водянки рекомендуютъ *Helleborus* и *Jod.*

Противъ хронической головной водянки бываютъ пригодны: *Arsen.*, *Bry.*, *Helleb.*, *Merc.*, *Sulph.*

УДАРЪ. (См. общія болѣзни).

ПАРША и МОЛОЧНЫЙ СТРУПЪ. (См. болѣзни кожи).

5. ЛИЦЕВЫЯ БОЛИ.

Подъ этимъ именемъ разумѣютъ періодически появляющіяся одностороннія боли въ лицѣ, начинающіяся на ограниченныхъ мѣстахъ и оттуда распространяющіяся часто на всю половину лица и головы. Они появляются бѣльшею частью приступами и вдругъ; продолжаются нѣсколько минутъ, часовъ даже дней, и точно также быстро исчезаютъ, чтобы въ опредѣленное время опять явиться. Боль обыкновенно бываетъ чрезвычайно сильная, жгучая, рѣжущая, стрѣляющая и колющая. Главныя средства: *Acon.*, *Bell.*, *Chin.*, *Colocynth.*, *Merc.*, *Mezer.*, *N.-vom.*, *Phosph.*, *Plat.*, *Puls.*, *Rhus.*, *Spigel.*, *Stann.*, *Staphys.*, *Stramon.* и *Verbasc.*

Aconitum соотвѣтствуетъ въ особенности колющей и дергающей боли, съ ощущеніемъ опухоли и пробѣганія мурашей, при красномъ, горячемъ лицѣ, лихорадочномъ безпокойствѣ и волненіи.

Belladonna при боли въ особенности около

глазъ, когда глазъ красенъ и слезитъ, при усиленіи отъ давленія и движенія при краснотѣ и жарѣ въ лицѣ, подергиванія мускуловъ и искаженія лица.

China при покалывающей, дергающей и колющей или рѣжущей и жгучей боли съ блѣдностью лица; при ожесточеніи отъ нажиманія и ночью, въ постелѣ, и при облегченіи во время принятія пищи.

Colocynthis при терзаніи, натяженіи, жженіи, колотѣ въ лицѣ до глубины уха и головы, или при роющемъ жженіи въ скуловой кости, больше въ спокойномъ положеніи, чѣмъ во время движенія, съ опухолью и краснотой.

Mercurius при боли, распространяющейся до зубовъ и усиливающейся въ теплѣ, въ постелѣ и ночью, съ слюнотеченіемъ, опухолью и потомъ на головѣ.

Mezereum при сверлящей, судорожной боли, въ особенности въ скулѣ, какъ-бы въ самой кости, усиливающейся ночью и въ теплѣ.

Nux-vomica при терзающей и тянущей боли до глубины уха съ опухолью щеки, краснотой лица, подергиваніемъ мускуловъ и усиленіемъ отъ размышленія, вина и кофе.

Phosphor. Боль отъ прилива, ревматическая и въ особенности нервная. Рветъ, тянетъ, натягиваетъ въ кожѣ, съ зудомъ; колетъ какъ гвоздемъ; опухоль въ лицѣ и блѣдность; открываніе рта, движеніе личныхъ мускуловъ, прикосновеніе

и малѣйшее охлажденіе ожесточаютъ боль; особенно страдаютъ кости.

Platina. Судорожное перебирание съ ощущеніемъ холода и онѣмѣнія; давить и сверлить въ костяхъ; вечеромъ и въ спокойномъ положеніи хуже. Плаксивость. Боль у истерическихъ женщинъ.

Pulsatilla при дергающей боли до глаза и уха, усиливающейся отъ тепла и уменьшающейся отъ холода, съ блѣдностью лица, ознобомъ, біеніемъ сердца и тошнотою.

Rhus. Ревматическая и нервная боль. Тянетъ, рветъ; въ спокойномъ положеніи и ночью хуже; отъ теплоты лучше.

Spigelia при жженіи и натяженіи въ мускулахъ и надъ глазными впадинами, перемежающимися припадками, которые возбуждаются или усиливаются сопровождающимъ біеніемъ сердца.

Stannum. Давить, щемить, тянетъ; односторонняя нервная боль; ночью хуже; начинается слабо, постепенно ожесточается до высшей степени, потомъ опять постепенно стихаетъ. Иногда стихаетъ отъ движенія.

Staphysagria. Ревматическая боль и при пораженіи костей. Давить, стучить, колетъ, тянетъ въ твердыхъ частяхъ, или жжетъ, рѣжетъ, рветъ; хуже отъ прикосновенія.

Stramonium при сильной боли съ потемнѣніемъ въ глазахъ, оглушеніемъ въ головѣ, головокруженіемъ, дерганьемъ въ головѣ и личныхъ мускулахъ, искаженіемъ рта и затрудненіемъ глотанія.

Verbascum при перемежающемся оглушающемъ давленіи въ скулъ, усиливающимся отъ нажиманія и жеванія, или при щипанія какъ щипцами и колотѣ въ вискахъ, которое возбуждается всякимъ токомъ воздуха и отдается въ головѣ.

СЫПИ НА ЛИЦѢ (см. болѣзни кожи).

6. ФЛЮСЪ.

Простудная опухоль лица, извѣстная подъ названіемъ флюса, занимающая обыкновенно одну щеку и въ особенности внутреннюю ея поверхность съ деснами, есть воспаленное состояніе слизистой оболочки, подкожной кѣтчатки, железъ, словомъ всѣхъ мягкихъ частей пораженнаго мѣста. Встрѣчается въ особенности у лимфатическихъ особъ, вообще склонныхъ къ отечнымъ опухолямъ и воспаленіямъ вслѣдствіе не столько прилива, сколько мѣстнаго застоя крови. Флюсъ, конечно болѣзнь не важная и даже мало безпокойная когда не осложняется зубною болью; однако нерѣдко случается, что воспаленіе переходитъ въ мѣстное отвердѣніе, а иногда и въ нагноеніе. Соотвѣтствующими средствами, смотря, по обстоятельствамъ, могутъ быть: *Aconit.*, *Arnic.*, *Bell.* и *Merc.*, но лучше и быстрѣ всѣхъ дѣйствуютъ при отечной опухоли *Apis*, а при твердой ограниченной опухоли и стрѣляющей боли *Bell.*

БОЛѢЗНИ ГЛАЗЪ.

1. КАТАРРАЛЬНОЕ И РЕВМАТИЧЕСКОЕ ВОСПАЛЕНІЕ ГЛАЗЪ.

Мы включаемъ обѣ эти формы въ одну статью, частью потому, что они не легко различаются, частью же и потому, что при гомеопатическомъ леченіи это различіе названія болѣзней не можетъ служить никакимъ особенно важнымъ указаніемъ. Главныя средства: *Acon.*, *Apis.*, *Bell.*, *Euphr.*, *Hep.*, *Merc.*, *Nux-v.*, *Puls.*, *Rhus*, *Spigel.*; въ хроническихъ случаяхъ *Sulphur*.

Когда воспаленіе глазъ обнаруживается очень быстро, съ сильною болью или даже лихорадкою, то всегда полезно прежде всего дать *Acon.* Это средство и впослѣдствіи бываетъ очень хорошо, когда, какъ часто случается при ревматическихъ глазныхъ воспаленіяхъ, нестерпимая боль занимаетъ весь глазъ и появляется вечеромъ или усиливается ночью.

Apis часто отлично хорошо дѣйствуетъ въ застарѣлыхъ или часто возобновляющихся воспаленіяхъ глазъ съ мутию и воспаленіемъ роговины,

опухолью и нагноеніемъ краевъ вѣкъ, или съ тѣстовидною отечною опухолью вѣкъ.

Arsenicum соотвѣтствуетъ въ особенности хроническимъ упорнымъ воспаленіямъ, когда вѣки очень опухаютъ и внутренняя поверхность ихъ очень красна, съ сильною жгучею болью, пятнами на роговинѣ, общею худобой и хворостью.

Belladonna въ особенности показана, когда бѣлокъ глаза очень красенъ и подернуть красными жилками, при сильной свѣтобоязни, жгучихъ слезахъ или непріятной сухости вѣкъ; при ожесточеніи боли отъ движенія глазъ, при рожистой опухолѣ вѣкъ, сильной головной боли, головокруженіи, помраченіи зрѣнія, или когда представляются искры и летающія черныя мушки въ глазахъ.

Euphrasia главное средство тогда, когда воспаление произошло вслѣдствіе насморка или въ сопровожденіи его, съ обильнымъ отдѣленіемъ слизи или слезъ по ночамъ и тогда, когда на краяхъ роговины образуются маленькіе пузырьки.

При изъязвленіи и опухолѣ краевъ вѣкъ съ густою, гноевидною слизью и залипаніемъ по ночамъ; при нарывахъ и пятнахъ на бѣлкѣ и на роговой оболочкѣ, съ сыпью и струпьями вокругъ глазъ, и при выворотѣ вѣкъ приличны въ особенности *Hep.* и *Merc.*

Nux-vomica, когда воспалены въ особенности внутренніе углы глазъ, при давленіи, какъ отъ ѣдкихъ слезъ; при сильной свѣтобоязни, въ осо-

бенности утромъ; при насморкѣ съ головою болью; при чрезвычайной раздражительности и запорѣ.

Pulsatilla показана при блѣдной опухоли вѣкъ и вокругъ глазъ; при обильномъ теченіи слезъ и слизи, залипаніи глазъ, сильной боли въ глазахъ и ожесточеніи вечеромъ и ночью.

Spigelia прилична въ особенности при нестерпимой боли въ глубинѣ глаза, ожесточающейся отъ движенія, при ощущеніи какъ-будто глазныя яблоки слишкомъ велики; когда сверлитъ, колетъ, рѣжетъ, жжетъ въ глазахъ, какъ-будто тамъ есть инородное тѣло; при сильномъ слезотеченіи, утомленномъ, мутномъ видѣ глазъ, слабости зрѣнія, потемнѣніи въ глазахъ отъ напряженія; при свѣтобоязни и туманѣ въ глазахъ.

Когда воспаленіе происходитъ отъ попавшаго въ глазъ **инороднаго тѣла**, пыли, занозы, насѣкомаго и т. д., то послѣ устраненія причины, лучшее средство *Acon.* и *Arn.* Последняя вообще всегда прилична при **механическихъ** поврежденіяхъ глазъ ушибомъ, давленіемъ, операціями и т. д. при кровяныхъ подтекахъ на бѣлѣ и около глазъ.

Если воспаленіе причинено неумѣреннымъ **напряженіемъ** глазъ, работою при огнѣ и т. д., то приличны въ особенности *Bell.*, *N.-vom.*, *Cannabis*, *Euphrasia* и *Ruta*. Если предшествовали острые **накожные болѣзни**, корь, скарлатина или оспа, то полезны *Bell.*, *Merc.* или *Sulph.*

Хроническое, большею частью золотушное, воспаление глазъ требуетъ *Calc.*, *Hyos.*, *Sulph.* и *Ars.*, а также *Euphras.*, *Bell.* и *Apis.*

Если страданіе глазъ въ связи съ худосочиемъ, то, разумѣется, слѣдуетъ принять въ соображеніе это худосочіе.

Противъ частаго и неумѣреннаго слезотеченія приличны: *Euphr.*, *Croc.*, *Digit.*, *Graph.*, *Phos.*, *Spigel.* Когда глаза мокнутъ: *Euphr.*, *Merc.*, *Puls.*, *Rhus.* Противъ паралича вѣкъ *Bell.*, *Plumb.*, *Sep.*, *Veratr.* и *Zinc.* Противъ скашиванія глазъ: *Alum.*, *Bell.*, *Cina.*, *Hyosc.* и *Stramon.*

2. ЗОЛОТУШНОЕ ВОСПАЛЕНІЕ ГЛАЗЪ.

Это воспаленіе преимущественно случается у дѣтей, въ особенности отъ двухъ до двѣнадцати лѣтъ, и встрѣчается чаще всѣхъ другихъ болѣзней. Оно поражаетъ преимущественно тѣхъ дѣтей, у которыхъ замѣчаются и другіе признаки золотухи, опухоль и нагноеніе железъ, парша на головѣ, струнья на лицѣ, течъ изъ ушей и т. п., и отличается сильною свѣтобоязнью, опухолью и залипаніемъ вѣкъ, иногда нарывами и пятнами на роговой оболочкѣ. Ходъ этой болѣзни вообще очень медленный и возвраты случаются часто. Главное средство противъ обыкновенной формы *Нер.*, которое однакожъ нужно употреб-

лать довольно долго. Въ свѣжихъ случаяхъ, когда краснота, опухоль и боль очень значительны, полезно напередъ дать нѣсколько приемовъ *Acon.* или *Bell.*

Свѣтобоязнъ, которая въ особенности утромъ составляетъ очень мучительный припадокъ, требуетъ внимательнаго наблюденія, потому что иногда остается послѣ всѣхъ другихъ припадковъ, и сверхъ того, во время болѣзни препятствуетъ изслѣдованію состоянія глаза. Въ большей части случаевъ тутъ помогаетъ *Bell.*, въ другихъ-же, гдѣ этотъ припадокъ является безъ видимаго воспаления, *Con.* Нерѣдко бываетъ полезна также *Viola tricolor.*

Въ другой, болѣе рѣдкой формѣ, воспаления глазъ съ чрезвычайно сильною болью, опухолью и образованіемъ **нарывовъ**, и вообще съ болѣе острымъ характеромъ, лучше всѣхъ другихъ средствъ дѣйствуетъ *Merc.*, въ особенности *Merc.-corros.* Когда слезы такъ остры, что разъѣдаютъ кожу, и когда золотушные **струпья** появляются на лицѣ, на головѣ и около ушей, то лучшее средство *Rhus.*

Нерѣдко остающіеся **рубцы, пятна** и потемнѣніе роговой оболочки, въ свѣжихъ случаяхъ уничтожаютъ *Apis*, *Con.*, *Connab.* Въ застарѣлыхъ *Sulph.*, *Calc.*, *Silic.*, *Apis* и *Colch.* Противъ **ячменей** лучшее средство *Puls.* Когда же послѣ нихъ остаются **затвердѣнія** съ жженіемъ и отдѣленіемъ липкой слизи, то помогаютъ *Staphys.*, *Graph.*

или *Calc.* и *Thuja*. Для уничтоженія **расположенія** къ ячменямъ полезно давать *Sulph.* и *Thuja*.

Кромѣ различныхъ воспаленій **скашивание глазъ** составляетъ весьма частое явленіе у дѣтей. Оно можетъ быть приобрѣтено дурною привычкою или подражаніемъ, но можетъ происходить и отъ внутренней болѣзненной причины, отъ страданія мозга, отъ глистовъ. Будучи слѣдствіемъ страданія мозга оно, конечно, имѣетъ только значеніе симптома такой опасной болѣзни и само по себѣ не можетъ быть лечимо. Когда оно происходитъ отъ глистной болѣзни, то можетъ быть устранено лишь вмѣстѣ съ нею и соотвѣтствующими средствами бывають: *Bellad.*, *Hyosc.*, *Spigel.*, *Cina*, *Marum verum*.

Привычку, само собою разумѣется, нужно устранить приученіемъ къ нормальной привычкѣ напоминаніемъ и убѣжденіями. Когда оба глаза косятся врозь, то достаточно бываетъ налѣпить на кончикъ носа кусочекъ черной тафты.

3. ПРИЛИПЧИВОЕ ВОСПАЛЕНИЕ ГЛАЗЪ.

Хотя прилипчивое воспаленіе глазъ, называемое также военнымъ, египетскимъ, зернистымъ, требуетъ большаго навыка для распознаванія и составляетъ еще трудную задачу и для опытныхъ врачей, по-

тому что у насъ на нее не отыскано еще вѣрныхъ специфическихъ средствъ изъ множества предложенныхъ, однакожъ мы сочли не лишнимъ дать здѣсь нѣсколько указаній, могущихъ въ данномъ случаѣ быть полезными.

Прилипчивое воспаленіе глазъ отличается отъ обыкновеннаго катаррального, во-первыхъ, своею заразительностью. Зараза переносится преимущественно непосредственнымъ прикосновеніемъ,—утираніемъ однимъ и тѣмъ же полотенцемъ, до трогиваніемъ пальцемъ сперва къ больному, потомъ къ здоровому глазу и т. д.,—но дѣйствуетъ, кажется и испареніемъ гноя, носящимся въ окружающемъ больного воздухѣ. Во всякомъ случаѣ, для предупрежденія распространенія, необходимо отдѣлять больныхъ и по возможности держать ихъ не въ замкнутомъ помѣщеніи, а на чистомъ воздухѣ или въ хорошо провѣтриваемыхъ покояхъ, что облегчается тѣмъ обстоятельствомъ, что болѣзнь обыкновенно развивается лѣтомъ, въ жары. Воспаленіе начинается какъ обыкновенное катарральное, съ слезотеченіемъ, свѣтобоязнью, краснотой вѣкъ и соединительной оболочки, съ ощущеніемъ какъ-будто песокъ попалъ и съ накопленіемъ слизи въ углахъ и рѣсницахъ. Выворотивъ вѣку, можно разсмотрѣть на соединительной оболочкѣ мелкіе бѣлые пузырьки, начало грануляціи, зернистости,—главной отличительный признакъ прилипчиваго воспаленія. Съ развитіемъ болѣзни количество слизи и гноя увеличивается; свѣтобоязнь

усиливается до нестерпимаго; вѣки сильно опухаютъ; въ окружности глазъ бываетъ рожистое воспаление кожи; боль въ глазу становится жгучею, колющею, стрѣляющею, съ ожесточеніемъ по вечерамъ. Все глазное яблоко краснѣетъ. Соединительная оболочка разрыхляется и припухаетъ такъ, что вокругъ зеницы образуется валежъ, а края вѣкъ выворачиваются. Въ началѣ мелкіе пузырьки на ней, превращаются въ бородавчатые наросты, иногда похожіе на щетину, иногда на цвѣтную капусту, иногда мягкіе, иногда твердые, сухіе, часто кровоточивые при обильномъ накопленіи ѣдкаго гноя въ промежуткахъ. Послѣдствіями могутъ быть: мясной наростъ (*sarcoma*) приращеніе и заворотъ вѣкъ, плотная плева (*rappus*) на зеницѣ и потеря зрѣнія.

Въ этой, какъ и во многихъ другихъ опасныхъ болѣзняхъ, все зависитъ, разумѣется, отъ своевременныхъ врачебныхъ мѣръ. Докторъ Грауфогль совѣтуетъ при первыхъ признакахъ грануляціи давать *Natr.-sulph.* 2—3 ежечасно и *Thu.* 30, въ то же время, утромъ и вечеромъ. Изъ множества средствъ, предложенныхъ докторомъ Бертлемъ (Журн. Гом. леч. 1861 стр. 318), мы укажемъ только на *Sulph.* 3, въ началѣ, когда пузырьковъ еще не видно, но больной жалуется на ощущеніе песку подъ вѣками, сухость глазъ, жаръ и жженіе, при краснотѣ и опухоли вѣкъ съ слезотеченіемъ. При болѣе сильномъ воспаленіи *Acon.* 3 или *Apis* 3., или *Bell.* 3—6. При обильномъ слизетеченіи

и нагноенія *Merc.* или *Hep.* При очень злокачественномъ, разѣдающемъ гноѣ *Arsen.* Противъ остающихся по минованіи воспаленія и долгаго нагноенія пятенъ и потемнѣнія зеницы *Apis*, *Nitr.-ac.* или *Cannab.* Противъ нарывовъ на бѣлкѣ и зеницѣ *Calc.*, *Euphras.*, *Merc.*, *Nitr.-ac.* Противъ хронической грануляціи *Kali-jod.* и *Thuja.*

4. СЛАБОСТЬ ЗРѢНІЯ.

Здѣсь не могутъ быть подразумѣваемы ни близорукость, ни дальнорукость, потому что оба эти состоянія отнюдь не составляютъ слабости зрѣнія, и только въ весьма рѣдкихъ случаяхъ бываютъ слѣдствіемъ болѣзни собственно. Здѣсь говорится только о слабости зрѣнія, которая бываетъ слѣдствіемъ боли, сильнаго напряженія зрѣнія и другихъ общихъ болѣзней.

Главные средства противъ страданія глазъ отъ **утомленія** чтеніемъ, шитьемъ и т. д., съ болью, слезотеченіемъ и т. д.: *Ruta.*, *Euphr.* и *Cannab.* Эти средства полезны бываютъ, кромѣ внутренняго употребленія, давать также снаружи, въ видѣ примочекъ (5 или 6 капель тинктуры на рюмку воды) раза по два или по три въ день.

Кромѣ того при выборѣ можно руководствоваться слѣдующими указаніями:

Когда **черно** передъ глазами: *Bell.*, *Chin.*, *Con.*,
Hyosc., *Puls.*, *Stram.*

Когда при чтеніи **БУКВЫ** сливаются: *Bellad.*,
Graph., *Hyosc.*, *Stram.*

— **ИСЕРЫ** и **ОГНЕННЫЯ** явленія: *Assaf*, *Baryt.*, *Bell.*, *Calc.*, *Con.*, *Digit.*, *Jod.*, *N-vom.*,
Spigel.

— **ТЕМНЫЯ** явленія: *Chin.*, *Calc.*, *Kali.*, *Merc.*,
Phosph., *Thuja.*

— **МУШКИ** летаютъ: *Agaric.*, *Bell.*, *Merc.*,
Hyosc., *Lact-vir.*

— **МЕРЦАЕТЪ** передъ глазами: *Bell.*, *Carb-veg.*, *Caust.*, *Con.*, *Digit.*, *Нер.*, *Jod.*, *Led.*,
Petr., *Tart.*, *Thuj.*

— **ТУМАНЪ** или **ФЛЕРЪ** передъ глазами: *Am-mon.*, *Bar.*, *Calc.*, *Bell.*, *Chin.*, *Нер.*, *Merc.*,
Op., *Phosph.*, *Plumb.*, *Rut.*, *Sulph.*, *Tart.*,
Thuja.

— **ЦВѢТИСТЫЯ** явленія: *Euphorb.*, *Stramon.*,
Aur., *Bell.*, *Spigel.*, *Veratr.*

— **ДВОЕЗРѢНІЕ**: *Aur.*, *Bell.*, *Digit.*, *Hyosc.*,
Jod., *Petrol.*, *Secal.*, *Stram.*, *Veratr.*

— **ЗЕЛЕНЫЙ ЦВѢТЪ** въ глазахъ: *China*, *Di-git.*, *Merc.*

— **ЖЕЛТЫЙ**: *Alum.*, *Ars.*, *Canthar.*, *Cina*, *Di-git.*, *Sulph.*

— **КРАСНЫЙ**: *Con.*, *Digit.*, *Hyosc.*

— предметы кажутся **БОЛЬШЕ** дѣйствительности: *Euphorb.*, *Hyoscyam.*, *Laur.*, *Niccol.*,
Staphys.

— кажутся **МЕНЬШЕ**: *Hyosc.*, *Stram.*

Когда видна только **половина** предмета: *Aur.*,
Lobel., *Lyc.*, *Muriat-ac.*, *Natr.-mur.*, *Sep.*

— предметы кажутся **опрокинутыми**: *Bell.*,
Kali, *Stramon.*

— предметы кажутся **удаленными**: *Sulph.*,
Therid.

§ III.

БОЛЕЗНИ УХА.

1. ВОСПАЛЕНИЕ ОКОЛОУШНЫХЪ ЖЕЛЕЗЪ, СВИНКА.

Эта красная и болящая опухоль железы около уха нерѣдко случается у дѣтей. Боль иногда распространяется въ шею и въ ухо и сопровождается лихорадкою, головной болью и стѣсненіемъ въ головѣ. Опухоль почти всегда разрѣшается и воспаление рѣдко доходитъ до нагноенія. Но зато опухоль околоушной железы иногда вдругъ пропадаетъ и вмѣсто ея появляется подобная въ грудной железнѣ или въ шюлятахъ.

Почти во всѣхъ случаяхъ *Merc.* специфическое средство и оказывается достаточнымъ для исцѣленія въ нѣсколько дней. Только когда есть значительное страданіе мозга, головокруженіе, оглу-

шение, бредъ и угрожаетъ переносъ на оболочки мозга, нужно употребить *Bell.*

При переносѣ на шудята, главное средство: *Puls.*

Когда остается затвердѣніе въ околоушной железѣ, то приличны *Baryt.* и *Aurum* и въ весьма рѣдкихъ случаяхъ нагноенія: *Calc.*, *Her.* и *Sil.*

Твердую, но невоспаленную опухоль, при золотушномъ сложеніи, разрѣшаетъ *Brom.* 3., а въ болѣе упорныхъ случаяхъ *Jod.* 3. При осложненіи ревматизмомъ хорошо дѣйствуетъ *Rhus.*

2. ВОСПАЛЕНИЕ УХА.

Это воспаление почти исключительно поражаетъ слуховой проходъ и большею частью сопровождается чрезвычайно сильною болью, жаромъ, краснотой и совершеннымъ заложениемъ уха. Главное средство въ началѣ: *Puls.* Если же воспаление простирается очень глубоко внутрь и страждетъ мозгъ, то должно употреблять *Bell.* Когда воспаление доходитъ до нагноенія, то лучшее средство для разрѣшенія или же ускоренія назрѣванія: *Merc.*

Когда воспаление идетъ отъ кости или постепенно поражаетъ костяныя части уха и образуется востокда, то главныя средства: *Merc.* и *Silic.*

При опухоли окружающихъ частей бываетъ при-

годна *Bryon.*; при ревматическомъ характерѣ боли съ безпокойствомъ *Chamom.* или *Rhus.*; при золотушномъ сложеніи и совмѣстномъ страданіи костей *Silic.* или *Lycopod.*; при страданіи кожи, худосочіи, нарывѣ въ ухѣ, хроническомъ истеченіи слизи или гноя *Sulphur.*

3. УШНАЯ БОЛЬ.

Подъ этимъ названіемъ разумѣютъ вообще боли внутри слуховаго прохода, происходящія большею частью отъ простуды, подобно зубной боли, или и вслѣдствіе послѣдней. Главныя средства: *Bell., Cham., Merc., N-vom., Puls.*

Belladonna прилична въ особенности противъ боли, распространяющейся въ глотку и въ голову, усиливающейся отъ движенія, съ шумомъ въ ушахъ, чувствительностью къ малѣйшему шороху, краснотою и жаромъ въ лицѣ и приливомъ въ голову.

Chamomilla противъ нестерпимой боли, колющей какъ ножомъ, при сухости въ ухѣ и ощущеніи какъ-будто бы оно заткнуто.

Mercurius противъ терзающей и колющей боли до щеки и зубовъ, ожесточающейся ночью и въ постелѣ; при истеченіи влаги изъ ушей и потѣніи головы.

Nux vomica при терзающей, колющей боли, или боли толчками, сильнѣе утромъ и ночью, со звономъ въ ушахъ и когда собственные слова сильно отдаются въ ухѣ, или когда при жеваніи въ ухѣ хруститъ, особенно у горячихъ и нетерпѣливыхъ людей.

Pulsatilla при дергающей, терзающей боли или ощущеніи, какъ-будто что изъ уха вышираетъ, съ жаромъ и краснотою наружныхъ частей уха и поражениемъ всей половины головы; при ожесточеніи вечеромъ и ночью, въ особенности у женщинъ и малокровныхъ и зябкихъ людей.

Наружныхъ и въ особенности острыхъ средствъ ни въ какомъ случаѣ не должно употреблять, потому что слѣдствіемъ ихъ легко можетъ быть совершенная глухота. Единственное, позволительное наружное средство — при сухости слѣры или вообще сухости слуховаго прохода, можно впускать нѣсколько капель маковаго или миндальнаго масла, но и то слѣдуетъ скоро вытирать.

4. ТЕЧЬ ИЗЪ УШЕЙ.

Этотъ непріятный и часто очень упорный недугъ случается преимущественно у золотушныхъ дѣтей и вслѣдствіе воспаленія уха. Въ послѣднемъ случаѣ главное средство: *Merc.* Въ первомъ, при чемъ обыкновенно бываютъ и другія страданія, какъ напримѣръ: сыпь на лицѣ, опухоль железъ и т. п., чаще всего помогаютъ *Sulph.* и *Hepar.*

Если недугъ произошелъ вслѣдствіе скарлатины, кори или оспы, то прежде всего можно употребить *Bell.* или *Puls.*

Если истечение состоитъ изъ излишняго отдѣленія ушной сѣры, то приличенъ *Con.* Если оно кровянистое *Merc.* и *Puls.* При жидкомъ, вонючемъ, гноевидномъ истеченіи съ разрушеніемъ барабана и костобдою: *Merc.*, *Sil.* *Aur.* При этомъ ухо нужно ежедневно очищать теплою водою или молокомъ и, для защиты отъ внѣшнихъ вліяній, слегка затыкать хлопчатую бумагой или корпией.

Противъ слѣдствій неосторожно подавленного или вдругъ задержаннаго истечения и происходящихъ отъ того страданій мозга и глухоты приличны *Bell.* и *Dulc.*

Противъ болѣзненныхъ измѣненій ушной сѣры, часто помогаютъ *Con.*, *Kali.*, *Lachesis*, *Carbo-veg.* и *Petrol.*

5. ШУМЪ ВЪ УШАХЪ И ГЛУХОТА.

Оба эти страданія часто являются въ сопровожденіи воспаленія и течи изъ уха и въ такомъ случаѣ уничтожаются средствами, показанными противъ тѣхъ страданій. Еще чаще они бываютъ слѣдствіемъ механическаго засоренія слуховаго прохода, отвердѣвшею ушною сѣрою или какимъ-нибудь инороднымъ тѣломъ.

Поэтому всегда необходимо тщательно изслѣдовать ухо. Очищеніе слуховаго прохода лучше всего производится закругленною ушною ложечкой, а чего этимъ достигнуть нельзя, то должно быть предоставлено изслѣдованію знающаго врача. Если отвердѣнія слишкомъ крѣпки, то ихъ предварительно слѣдуетъ размягчить тепловатымъ миндальнымъ масломъ или молочнымъ паромъ.

Когда нѣтъ ни органическихъ, ни механическихъ видимыхъ причинъ страданій уха, то нужно обратить вниманіе на исторію болѣзни вообще и принять въ соображеніе поводы, отъ которыхъ она могла произойти. Такъ, если страданіе произошло отъ неосторожно остановленной течи изъ уха, то приличны *Нер.*, *Merc.*, *Laches.* Отъ кори *Puls.* Отъ скарлатины: *Bell.* Отъ оспы *Merc.* и *Sulph.* Отъ нервной горячки: *Phos.*, *Caust.*, *Coccul.* Отъ скрывшейся сыпи: *Sulph.* или *Merc.* Отъ прилива крови и въ особенности если въ то же время есть страданіе легкихъ или сердца: *Bell.*, *Bryon.*, *Phosph.*, *Puls.* и *Spigel.* При сухости слуховаго прохода или при совершенномъ отсутствіи ушной сѣры: *Carb-veg.*, *Laches.* и *Petrol.*

Belladonna прилична при сильномъ шумѣ въ обоихъ ушахъ, особенно отъ наклоненія и движенія, при головокруженіи, головной боли, мельканіи въ глазахъ, краснотѣ лица и глухотѣ, смѣняющейся возвышенной чувствительностью слуха.

Causticum при ощущеніи какъ-будто уши заткнуты, съ шумомъ и звономъ, сильнымъ отраже-

ніемъ звуковъ и словъ; при ощущеніи какъ-будто холодный вѣтеръ въ уши дуетъ или какъ-будто что выпираетъ изъ уха, и при течи.

Sonitum при излишнемъ накопленіи ушной сѣры, иногда кровянистой; при шумѣ въ ушахъ, въ особенности въ лежащемъ положеніи и ночью; когда при сморканіи и чиханіи ухо закладываетъ; при глухотѣ или чрезвычайной чувствительности слуха, съ испугомъ отъ cadaго шороха и съ отращеніемъ отъ шума.

Graphites когда въ ухѣ стукъ, звонъ, шумъ, перекачыванье, щелканье и тому подобные звуки; при сухости уха, струпьяхъ или обонрѣлости около уха; при ощущеніи какъ-будто вода переливается въ ухѣ и на каждомъ шагу хлопаетъ какъ клпанъ, или какъ-будто воздухъ проникаетъ изъ горла въ ухо, и при глухотѣ, которая отъ ѣзды улучшается.

Lachesis при бурчаньѣ, шишньѣ и щелканьѣ въ ушахъ съ заложениемъ и сухостью, недостаточной, твердой, сухой бѣловатой ушной сѣрѣ, обонрѣлости и струпьяхъ около уха.

Manganum при колотѣ въ глубинѣ уха отъ разговора, смѣха или скорой ходьбы; при заложении, глухотѣ, которая отъ сморканья иногда проходитъ или вмѣстѣ съ погодой иногда, то улучшается, то усиливается; при шумѣ отъ накопленія или клпаньѣ отъ сморканья и глотанья.

Mercurius при изъязвленіи слуховаго прохода, истеченія слизи, гноя или крови, сыпи около ушей

и на головѣ; опухоли железъ, шумѣ, въ особен-ности въ лежачемъ положеніи, біеніи, подобно пульсу, громкомъ отраженіи всѣхъ звуковъ, ощу-щеніи заложенія, которое отъ глотанія и сморка-нія временно проходить.

Petroleum при сыпи около ушей, изъязвленіи и обопрѣлостл за ухомъ; при шумѣ, хрустѣніи, щел-каніи, заложеніи и чрезвычайной сухости слухо-ваго прохода.

Phosphorus при хлопаньѣ, біеніи и шумѣ, ко-торые часто вдругъ появляются и отъ ходьбы, на-клоненія, жеванія и въ лежачемъ положеніи уси-ливаются, съ приливомъ крови, сильнымъ и про-должительнымъ отраженіемъ звуковъ и отвраще-ніемъ отъ шума.

Pulsatilla при истеченіи слизи, чувствительно-сти слуха, заложеніи съ шумомъ, звономъ или хрустѣніемъ или трещаніемъ при движеніи голо-вы, въ особенности у дѣвицъ, страдающихъ блѣд-ною немочью и неправильностью регуль.

Silicea при истеченіи гноя или жидкой ушной сѣры, опухоли уха внутри и снаружи, шумѣ и сту-чаніи, въ особенности въ лежачемъ положеніи; при заложеніи, которое иногда вдругъ щелкнетъ и отойдетъ; при глухотѣ или чрезвычайной чув-ствительности слуха.

Sulphur при сильномъ зудѣ, истеченіи гноя, сы-пи, шумѣ, звонѣ, глухотѣ, въ особенности послѣ острыхъ кожныхъ болѣзней, чесотки и остано-вленной течи изъ уха.

Veratrum одно изъ важнѣйшихъ средствъ противъ притупленія слуха, особенно, когда оно происходитъ отъ слабости или паралича слуховыхъ нервовъ и сопровождается попеременнымъ ощущеніемъ жара и холода въ ушахъ. Оно оказывалось дѣйствительнымъ во многихъ самыхъ застарѣлыхъ и упорныхъ случаяхъ. Можно также впускать его прямо въ ухо съ миндальнымъ масломъ, употребляя для этого смѣсь 3 — 5 капель тинктуры на чайную ложку масла.

§ IV.

БОЛЕЗНИ НОСА.

1. НАСМОРКЪ.

Простой насморкъ у человѣка вообще здороваго, въ особенности зимой и весной рѣдко требуетъ медицинскаго пособія и въ 6 или 9 дней проходитъ самъ собою. Если же очень силенъ или причиняетъ другіе непріятные припадки и въ особенности, когда появляется въ видѣ повѣтрія, то, главныя средства *Merc.* и *Acon.*

Когда насморкъ причиняетъ чиханіе, обильное, водянистое, ѣдкое отдѣленіе, опухоль носа и когда мокрота кажется дурно пахнущею, то въ особенности приличенъ *Merc.* Если же бываетъ частый ознобъ и жаръ съ склонностью къ поту

по ночамъ, скребленіе въ горлѣ и легкое покашливаніе или охриплость, сильная головная боль во лбу и общее нездоровье, то болѣе приличенъ *Aconit.*

При сухомъ насморкѣ съ сухостью во рту, жаромъ въ лицѣ, жгучею краснотою щекъ по вечерамъ, зудомъ въ носу или при заложеніи носа и текущемъ насморкѣ днемъ, съ жаромъ въ головѣ общаю разбитостью и непріятнымъ расположеніемъ духа, помогаетъ *Nux-vom.*

При острой ѣдкой мокротѣ, съ жженіемъ и садномъ въ ноздряхъ, съ большимъ безпокойствомъ и бессонницей и при облегченіи отъ тепла и движенія, помогаетъ *Arsenic.*

Отъ самаго сильнаго насморка при чрезвычайно обильномъ, водянистомъ истеченіи, которое объѣдаетъ носъ и губы, и причиняетъ опухоль, лучшее средство *Lachesis.*

Насморкъ у дѣтей съ болячками около ноздрей, трещинами и воспаленіемъ губъ одною блѣдною, другою красною щекой, зябкостью, жаждой, сонливостью и дурнотою въ головѣ, уничтожаетъ *Chamomilla.*

Противъ заложенія носа у грудныхъ дѣтей, препятствующаго сосать и принуждающаго во снѣ дышать черезъ ротъ—*Nux-vomica.*

Если же носъ наполненъ густою, вязкою мокротою и ребенокъ со сна вдругъ вскакиваетъ и какъ-будто задыхается—*Sambucus.*

Когда насморкъ менѣе поражаетъ носъ, но за-

то отбиваетъ обоняніе и аппетитъ, когда мокрота густа, зеленовата или желта и вонюча, и когда языкъ обложенъ—*Pulsatilla*.

При обильномъ истеченіи бѣлой мокроты, съ страданіемъ глазъ и слезотеченіемъ—*Euphrasia*.

Противъ послѣдствій скрывшагося насморка, въ особенности когда страждетъ голова—*Aconitum* и *Pulsatilla*. Если же случается затрудненіе дыханія, одышка или боль въ груди, то лучше дѣйствуютъ: *Arsenicum*, *Ipecacuanha* и *Bryonia*.

Главные средства противъ хроническаго насморка, который почти всегда бываетъ слѣдствіемъ золотушнаго или туберкулознаго расположенія: *Calc.*, *Нер.*, *Mer.*, *Silicea*, *Sulphur*, *Jod*, *Pulsatilla* и *Aurum*.

При размягченіи и опухоли слизистой оболочки носа съ отдѣленіемъ твердыхъ, трубчатыхъ, кровянистыхъ комковъ: *Silicea* или *Kali bichromicum*.

При вонючей мокротѣ съ потерей обонянія и вкуса: *Pulsatilla*.

При распространеніи воспаления на кость съ вонючимъ нагноеніемъ: *Aurum*, *Mercurius*, *Silicea*.

2. ОПУХОЛЬ НОСА И БОЛЯЧКИ.

У золотушныхъ дѣтей, при хроническомъ заложеніи носа, носъ вмѣстѣ съ губою нерѣдко имѣетъ распухшій видъ, безъ особенной красноты

и боли. Въ этомъ случаѣ большею частію показаны тѣ же средства, какъ и противъ хроническаго насморка вообще, т. е. *Calc.*, *Hep.*, *Merc.*, *Sil.* и *Sulph.* Если при этомъ въ ноздряхъ и около нихъ образуются болячки, то бываютъ приличны также *Antimon.*, *Aur.*, *Thuja*, *Borax* и *Kali bichrom.* При болячкахъ на кончикѣ носа: *Carb.-veg.*, *Nitric acid.* и *Silic.*

При опухоли носа вслѣдствіе паденія или удара, прежде всего: *Arn.* При красной болящей опухоли: *Bell.*, *Bry.*, *Merc.*

Противъ красноты и красныхъ пятенъ на носу въ особенности *Carb.-veg.*, *Phosph.-acid.* и *Rhus.*

Противъ багроваго носа съ прыщами, вслѣдствіе спиртныхъ напитковъ: *Ars.*, *Carb.-veg.*, *Bell.*, *Rhus.*

При нагноеніи въ носу въ связи съ сыпью бываютъ пригодны *Graphit.*, *Hep.-sulph.* и въ особенности *Sulphur.* При значительномъ размягченіи слизистой оболочки *Kali bichrom.* При кровоточивомъ изъязвленіи съ наростами, вонючемъ истеченіи, заложеніи носа съ притупленіемъ обонянія и при лишаяхъ *Alumen.* При рожевидной опухоли, слущиваніи кожи на лицѣ, болячкахъ и струпьяхъ, особенно же при костоѣдѣ и происходящаго оттого гноевиднаго и кровянистаго вонючаго истеченія *Aurum.* При хроническомъ нагноеніи съ костоѣдою у золотушныхъ и сифилитиковъ *Jod.* или *Kali-jod.* При лоснящейся красной опухоли и сухихъ коркахъ—*Phosphor.* При

вонючемъ, кровянисто-слизистомъ истеченіи и нарывѣ на головѣ *Rhus*.

3. ВНУТРЕННЯЯ ОПУХОЛЬ И ПОЛИПЪ ВЪ НОСУ.

При заложеніи носа вслѣдствіе опухоли слизистой оболочки, въ особенності у золотушныхъ дѣтей, лучшія средства: *Calc.*, *Puls.*, *Kali-bichrom.* и *Silic.*

Противъ полипа въ носу хорошія средства *Calc.* и *Ser.*, но только нужно употреблять ихъ довольно долго. Затѣмъ могутъ быть полезны также *Puls.*, *Hep.* и *Teucrium*.

Teucrium противъ губчатого полипа оказывается болѣе дѣйствительнымъ какъ наружное средство. Свѣжевысушенные листья толкутся въ порошокъ, который нюхаютъ какъ табакъ или вдуваютъ въ ноздри. Противъ губчато-мясистаго, легко кровоточиваго, помогаетъ *Phosphor*. Противъ красныхъ, круглыхъ какъ горошины *Sulphur*. Бываютъ полезны также *Silic.* и *Kali-bichrom*. Вообще средство противъ полипа нужно употреблять довольно долго, чтобы видѣть результатъ.

4. КРОВОТЕЧЕНІЕ НОСОМЪ.

Противъ умѣреннаго кровотечения носомъ, особенно въ острыхъ болѣзняхъ, обыкновенно нѣтъ надобности прибѣгать къ лекарствамъ. Лекарство

бываетъ нужно только при очень сильномъ кровотеченіи или когда оно часто повторяется.

Когда кровотеченіе носомъ происходитъ отъ механической причины, то лучшее средство *Arn.*

Когда оно возбуждено общимъ волненіемъ въ кровеносной системѣ или приливомъ, то главное средство *Bryon.*

Когда оно происходитъ отъ вина или кофе: *Bell.* и *Nux-vom.*

Отъ волненія или жару: *Acon.*

Вслѣдствіе насморка съ сильнымъ чиханіемъ: *Puls.* и *Con.*

У дѣтей, страдающихъ глистами: *Cina* и *Merc.*

У женщинъ при неправильныхъ регулахъ: *Puls.* и *Bell.*

При очень сильномъ кровотеченіи, угрожающемъ истощеніемъ: *Chin.*, *Ipec.*, *Sep.* и *Merc.*

Когда кровь очень черна: *Croc.* и *Kreos.*

У людей истощенныхъ: *Chin.* или *Sec.-corn.*

Когда кровотеченіе изъ носу очень часто и при малѣйшемъ поводѣ повторяется: *Carb.-v.*, *Kreos.*, *Phosph.* и *Sulph.*

БОЛѢЗНИ РТА.

1. МОЛОЧНИЦА, АФТЫ.

Молочницею страдают по преимуществу грудныя дѣти, вслѣдствіе образованія кислотъ, отъ дурнаго питанія, нечистыхъ рожковъ и сосокъ и нечистоты содержанія вообще. Она можетъ быть и прямымъ слѣдствіемъ худосочія. Бываетъ заразительна, потому что состоитъ въ образованіи плесени, грибовъ, которые легко переносятся. Плесень эта оказывается въ полости рта въ видѣ пузырьковъ, крупинокъ и болѣе или менѣе крупныхъ пятенъ и сплошныхъ массъ, отдѣляющихся подобно струпьямъ. Сначала она бываетъ молочнобѣлая, впослѣдствіи буроватая и даже черноватая. Часто простирается изъ рта внизъ, по всему пищевому пути, до задняго прохода. Сильно развитую молочницу не мудрено смѣшать съ дифтеритической гнилою жабой (см. это).

Лучшія средства противъ молочницы, въ легкой степени: *Borax* 2 и *Merc.* 6, особенно, когда она сопровождается лихорадкой, безпокойствомъ, желудочнымъ катарромъ, поносомъ съ зеленоватыми испражнениями и образованіемъ язвинъ по отпа-

денія творожистаго выпота. Когда есть признаки общей порчи соковъ, нужно бываетъ прибѣгнуть къ *Acid.-muriat.* или *Acid.-sulph.* Особеннаго вниманія требуютъ причина болѣзни и соблюденіе чистоты. Для предохраненія сосковъ кормилицъ отъ зараженія нужно послѣ каждого кормленія обмывать ихъ. Если же, несмотря на это, зараженіе послѣдуетъ, то нужно обмывать воднымъ растворомъ буры (1 ложку на 10 ложекъ теплой воды).

Молочница встрѣчается также иногда у роженицъ. Афты, пузырьки и язвинки во рту и на языкѣ встрѣчаются нерѣдко и у взрослыхъ. Когда они появляются какъ сопровождающій симптомъ, въ трудныхъ истощающихъ болѣзняхъ, то даютъ дурное предсказаніе. Иногда тутъ помогаетъ *Acid.-sulph.* (Можетъ быть также *Merc.-cyanat.*?).

2. ГНИЛОСТЬ И АНТОНОВЪ ОГОНЬ ВО РТУ.

Эта болѣзнь состоитъ въ образованіи на деснахъ и слизистой оболочкѣ рта мелкихъ, болящихъ нарывовъ, которыя издають запахъ гнили и причиняють слюнотеченіе, губчатую опухоль, кровоточивость и отпаденіе десенъ. При этомъ

большую часть случаевъ также желудочные припадки или опухоль слюнныхъ железъ и лихорадочныя явленія. Главное средство въ болѣе-й части случаевъ *Merc.* (*Merc.-cyanat.*?) въ частыхъ приемахъ. Тѣмъ же, которые уже употребляли ртуть въ большихъ приемахъ и отъ этого самаго можетъ быть получили болѣзнь, нужно давать *Nitri-acid.*

Въ легкихъ случаяхъ, гдѣ встрѣчаются не столько язвы, сколько пузырьки и пятнышки, и нѣтъ ни разстройства желудка, ни поноса, большую частью хорошо дѣйствуетъ *Borax.*

При блѣдныхъ, отпадающихъ и кровоточивыхъ деснахъ съ буграми или болящими наростами и при шатаніи и порчѣ зубовъ: *Staphys.* Когда при этомъ на языкѣ образуются язвы и нарывы и трудно языкомъ пошевелить: *Muriat.-acid.* При сильномъ запахѣ изо-рта и кровоточивости десенъ, въ особенности вслѣдствіе употребленія ртути, хорошо дѣйствуетъ также *Carbo-veg.*

При воспаленіяхъ бываетъ пригоденъ *Helleborus.* При наклонности къ антонову огню *Arsen.* Когда гнилость происходитъ отъ злоупотребленія поваренной соли, помогаетъ *Spirit-nitri-dulcis.* Въ хроническихъ случаяхъ также важное средство *Kali-bichrom.*

3. ВОСПАЛЕНІЕ ЯЗЫКА.

Лучшія средства противъ воспаленія языка, которое хотя рѣдко, однакожъ доходитъ иногда до нагноенія: *Acon.*, *Canth.* и *Merc.* Если же воспаление произошло отъ механической причины, отъ пораненія сломаннымъ зубомъ или ножомъ и т. д., то прежде всего *Arn.*

Когда воспаление начинается отъ **ГЛОТКИ** и **НѢБА**, то лучше *Bell.* и *Laches.* или *Apis.*

Противъ **ОПУХОЛИ** языка: *Ars.*, *Con.*, *Acon.*, *Apis.*, *Jod.*, *Mezer.*, *Sulph.*, *Thuja* и *Merc.*

При **ПАРАЛИЧНОМЪ** состояніи и трудномъ движеніи языка: *Muriat-acid.*, *Caust.*, *Anacard.*, *Ars.*, *Stramon.*, *Gelsemin.*

При **НАРЫВАХЪ** на языкѣ: *Merc.*, *Muriat-acid.*, *Nitri-ac.* или *Ars.*, *Con.*, *Sil.*

При **САДНѢ** и жженіи: *Aur.*, *Lach.*, *Puls.*

Въ **ХРОНИЧЕСКИХЪ** случаяхъ — *Sulph.* При остающихся **ЗАТВЕРДѢНІЯХЪ** — *Aurum* и *Jod.*

4. ДУРНОЙ ЗАПАХЪ ИЗО РТА.

Запахъ изорта часто происходитъ отъ нечистаго содержанія зубовъ, особенно пустыхъ, и тогда очень легко уничтожается обыкновеннымъ чищеніемъ и полосканіемъ водою съ примѣсью виннаго спирта или о-де-колоня.

Когда запахъ происходитъ не отъ зубовъ, а отъ страданія желудка и неправильности пищеваренія, то слѣдуетъ искать средствъ противъ этихъ причинъ. Часто въ этомъ случаѣ могутъ быть полезны: *Puls.*, *Nux-vom.*, особенно если запахъ бываетъ замѣтнѣе утромъ.

При застарѣломъ разстройствѣ пищеваренія очень хорошее средство *Carbo-veget.* 3.; также *Chin.*, *Hep.-s.*, *Sep.* и *Sulph.* При сифилитическихъ и золотушныхъ изъязвленіяхъ зѣва *Merc.* и *Aur.* Послѣ злоупотребленія ртути *Nitri-ac.*, *Aur.* и *Jod.* Когда изо рта пахнетъ землею, соотвѣтствуетъ *Mangan.*; сгарымъ сыромъ *Kali-carb.*; чеснокомъ *Petrol.*

Въ застарѣлыхъ случаяхъ полезны бываютъ также: *Aur.*, *Sep.*

Когда запахъ изо рта остается послѣ нарывовъ въ зѣвѣ или во рту, приличны бываютъ: *Aur.*, *Merc.* и *Silic.*

5. СЛЮНОТЕЧЕНІЕ.

Если слюнотеченіе происходитъ отъ страданія желудка, то, смотря по припадкамъ, могутъ быть полезны: *Ant.*, *Baryt.*, *Bell.*, *Brom.* или *Jod.*, *Colch.*, *Euphorb.*, *Kali-chlor.*, *Merc.*, *Natr.-mur.*, *Sulph-acid.*, *Nux-v.* При этомъ слѣдуетъ сообразить припадки, относящіеся къ страданіямъ желудка.

Когда слюнотечение зависитъ отъ болѣзни слизистой оболочки рта, десенъ или слюнныхъ железъ, то лучшія средства: *Merc.*, *Nitr.-ac.* и *Laches*.

Когда оно есть слѣдствіе злоупотребленія ртути, то болѣе приличны: *Hep.*, *Jod.*, *Nitr.-ac.*

6. ИЗМѢНЕНИЕ ВКУСА И ОБЛОЖЕНИЕ ЯЗЫКА.

Оба эти состоянія почти всегда бываютъ слѣдствіемъ страданія желудка и уничтожаются средствами, показанными противъ этихъ страданій. Однако, въ случаѣ несовершенной ясности желудочныхъ припадкавъ, можно отыскать соотвѣствующее средство по слѣдующимъ указаніямъ:

Горькій вкусъ во рту: *Bry.*, *Chin.*, *Chelid.*, *Silic.*, *Sulph.*

Горькій вкусъ пищи: *Bry.*, *Chin.*, *Puls.*, *Rhus.*

Гнилой: *Arn.*, *Cham.*, *Merc.*, *Puls.*, *Hep.*, *Sulph.*

Кислый вкусъ въ пищѣ: *Bell.*, *Calc.*, *N.-vom.*, *Puls.*

Кислый вкусъ во рту: *Baryt.*, *Calc.*, *Cocc.*, *N.-vom.*, *Phosph.-acid.*

Слизистый: *Bry.*, *Merc.*, *Puls.*, *Staphys.*, *Chin.*, *Ipec.*

Сладкій: *Bryon.*, *Cupr.*, *Merc.*, *Puls.*

Острый: *Laurocer.*, *Rhus.*, *Veratr.*

Соленый: *Arsen.*, *Carb.-veg.*, *Cuprum.*, *Merc.*, *Zinc.*

Металлическій: *Calc.*, *Cocc.*, *Merc.*, *Lach.*, *Senega*.

Землистый: *Hep.*, *Nux-mosch.*, *Puls.*

Кровяной: *Alum.*, *Ferr.*, *Ipec.*

Промзглый: *Asaf.*, *Euphorb.*, *Puls.*

Безвкусіе пищи: *Ars.*, *Merc.*, *N-vom.*, *Puls.*, *Staphys.*

Потеря вкуса: *Anacard.*, *Bellad.*, *Natr-mur.*, *Silic.*, *Veratr.*

Темное обложеніе языка: *Carb.-veg.*, *Nux.-v.*, *Taraxac.*, *Verbascum.*

Желтое: *Arn.*, *Bry.*, *Chin.*, *Colchic.*, *Nux.-vom.*, *Veratr.*

Зеленоватое: *Magn.-carb.*, *Rhodod.*

Бѣлое: *Ant.-crud.*, *Tart-emet.*, *Ars.*, *Calc.*, *Chin.*, *Merc.*, *Nux.-v.*, *Puls.*, *Spigel.*

Черноватое: *Ars.*, *Chin.*, *Op.*, *Phosph.*, *Rhus.*

Красный языкъ: *Tart.-emet.*, *Ars.*, *Bellad.*, *Rhus.*, *Veratr.*

Сухой: *Acon.*, *Ars.*, *Bell.*, *Bry.*, *Phosph.*, *Rhus.*

Синеватый: *Ars.*, *Colch.*, *Acid.-mur.*, *Sabadilla.*

Твердый, неподвижный: *Ars.*, *Merc.*, *Carb.-veg.*, *Colch.*, *Con.*, *Natr.-mur.*

Очень влажный: *Aethusa*, *Ant.*, *Bell.*, *Colch.*, *Cupr.*

Увеличеніе сосочковъ, языка: *Tartar.-emet.*, *Argent.*, *Belladonna*, *China*, *Crocus*, *Plumbum.*

7. ЗУБНАЯ БОЛЬ.

Зубная боль не всегда происходит отъ порчи и костоѣды зубовъ; но и въ такомъ случаѣ боль можетъ быть уничтожена безъ выдергиванья зубовъ. Зубы часто крошатся и выпадаютъ, не причиняя никакой боли, и на оборотъ, часто очень крѣпкіе и здоровые зубы жестоко болятъ. Поэтому никогда не должно торопиться дерганіемъ зубовъ, тѣмъ болѣе, что противъ этой боли въ гомеопатіи есть очень много хорошихъ средствъ. Вся трудность заключается въ выборѣ совершенно соотвѣтствующаго. Нужно обращать вниманіе на малѣйшіе оттѣнки припадковъ, и даже на такіа сопровождающія обстоятельства, которыя могутъ казаться совершенно ничтожными, но въ которыхъ часто заключаются важнѣйшія указанія. Здѣсь мы приведемъ сперва главные, или лучше сказать, наиболѣе употребительныя противъ зубной боли средства и соотвѣтствующіе имъ характеристическіе припадки, а потомъ тѣ припадки, по которымъ можно отыскать соотвѣтствующее средство.

Aconitum. Сильная боль, причиняющая раздраженіе и слезы; боль стучащая, дергающая, толчками; приливъ крови къ головѣ, жаръ въ лицѣ, лихорадка.

Coffea. При тѣхъ же обстоятельствахъ, какъ и *Acon.*, людямъ очень нервнымъ, чувствительнымъ.

Arnica. Боль и опухоль вслѣдствіе операциі надъ зубами; вообще при твердой, красной опухоли щекъ, по прекращеніи зубной боли. Отъ простудной зубной боли, очень хорошее, хотя впрочемъ большею частью только пальятивное средство—полосканье слабымъ растворомъ *tinct. Arnic.*

Belladonna. Колющая, терзающая, тянущая, стучащая боль въ зубахъ, съ красными, припухшими, легко кровоточивыми деснами; хуже отъ движенія, пищи, жеванія, вечеромъ и ночью, сухость во рту и въ горлѣ, съ сильною жаждой, горячимъ краснымъ лицомъ, стучаніемъ въ голову и краснотой глазъ.

Chamomilla. Несносная боль во всей сторонѣ лица, безъ опредѣленнаго сосредоточенія на одномъ зубѣ. Боль, простирающаяся въ ухо, съ жаромъ и краснотой одной щеки и блѣдностью другой; хуже ночью и въ теплѣ, отъ теплой пищи или питья; сильное раздраженіе, плаксивость, тоска, безпокойство и слабость.

Mercurius. Боль въ пустыхъ зубахъ, простирающаяся въ ухо и въ глазъ, съ болящими, опухшими, изъязвленными деснами и опухолью щеки; нарывы около зубовъ; шаткость зубовъ, слюноотеченіе; ощущеніе, какъ-будто зубы слишкомъ длинны; хуже ночью, особенно въ постелѣ, отъ теплой и холодной пищи или питья. При опухоли шейныхъ железъ и ночномъ потѣ.

Mezereum: при жестоко-жгучей, дергающей или сверлящей боли, особенно въ пустыхъ зубахъ,

простирающейся въ скулы и виски, особенно вечеромъ и ночью. При быстрой порчѣ и крошеніи зубовъ; при пузырькахъ на языкѣ и деснахъ.

Nux-vomica. Боль, какъ-будто зубы выдергиваются съ мѣста; по временамъ колотье, потрясающее все тѣло, въ особенности при втягиваніи воздуха, боль во всей сторонѣ лица и ощущеніе, какъ-будто зубы шатки или слишкомъ длинны; хуже утромъ, въ постелѣ, при жеваніи, при открываніи рта на воздухѣ, отъ холоднаго питья, отъ напряженія головы; лучше отъ тепла; въ особенности людямъ раздражительнаго темперамента, пьющимъ кофе и вино, или ведущимъ сидячую жизнь.

Phosphor. При ожесточеніи боли ночью, въ лежачемъ положеніи, и отъ холоднаго воздуха, отъ холоднаго и теплаго, отъ жеванія; при стучащей и сверлящей боли; при саднѣ и опухоли во рту; при воспаленіи надкостной плевы челюстей.

Pulsatilla. Терзающая, тянущая, стучащая и дергающая боль, ощущеніе какъ-будто нервъ натягивается и опускается, съ стрѣльбою въ ухо и болью въ одной сторонѣ головы; хуже вечеромъ и ночью, въ теплѣ, отъ теплаго питья и пищи; лучше отъ холодной воды и свѣжаго воздуха; при блѣдности лица и общей зябкости; въ особенности людямъ кроткимъ, спокойнымъ, малокровнымъ и бѣлокурнымъ.

Staphysagria. Боль въ деснахъ и въ корняхъ пустыхъ зубовъ; когда зубы чернѣютъ и кро-

шатаются; когда десны блѣдны, бѣлы, опухлы, болятъ, покрываются язвами, легко издають кровь, отпадаютъ отъ зубовъ, покрываются буграми, прыщами и наростами. При ожесточеніи боли отъ жеванья, холоднаго питья и пищи и холоднаго воздуха.

Spigelia. Дергающая, стучащая боль, особенно въ пустыхъ зубахъ, тотчасъ послѣ пищи и ночью, въ постелѣ; хуже отъ холодной воды и свѣжаго воздуха; при ознобѣ, безпокойствѣ, біеніи сердца, побужденіи на мочу, страданіи глазъ, вздутіи лица и желтыхъ пятнахъ около глазъ.

China: при боли, которая ночью или послѣ пищи, или отъ малѣйшаго прикосновенія обнаруживается, или на воздухѣ ожесточается и утихаетъ отъ сжиманія зубовъ и смыканія челюстей. Отъ зубной боли при кормленіи грудью; при приливахъ крови къ головѣ, съ налитіемъ венъ на рукахъ и на лбу.

Antimonium crudum. Боль въ особенности въ пустыхъ зубахъ, терзающая, роющая, дергающая въ голову, въ особенности вечеромъ, въ постелѣ; когда боль отъ пищи и отъ холодной воды усиливается, а на воздухѣ улучшается.

Magnesia carbonica: при ожесточеніи боли въ пустыхъ зубахъ ночью отъ холода и всякой пищи, съ опухолью десенъ и лица, особенно у беременныхъ.

Rhus. Боль дергающая, сильно тянущая; ощущеніе, какъ-будто зубъ выдергивается; стучаніе

и терзаніе въ обоихъ рядахъ зубовъ, простирающееся до скулъ и висковъ; ощущеніе какъ-будто зубы пусты и слишкомъ длинны и какъ-будто воздухъ въ нихъ втягивается. Опухоль десенъ. Хуже на воздухѣ и ночью; лучше отъ наружнаго тепла. Шатаніе зубовъ и дурной запахъ изъ пустыхъ зубовъ.

Silicea. Боль больше въ челюсти, нежели въ зубахъ; опухоль кости и надкостной плевы; хуже ночью.

При опухоли и боли въ деснахъ: *Bellad.*, *Hyosc.*, *Magnes.*, *Merc.*, *N.-vom.*, *Puls.*, *Rhus.*, *Staphys.*

— опухоли щеки: *Bellad.*, *Merc.*, *Puls.*, *Nux-v.*, *Cham.*, *Arn.*, *Staphys.*, *Bryon.*, *Ars.*

Когда зубы шатаются: *Merc.*, *Bryon.*, *Nux-v.*, *Ars.*, *Rhus.*, *Hyosc.*, *Staphys.*

— зубы кажутся длиннѣе: *Nitri-acidum.*, *Alum.*, *Arn.*, *Bellad.*, *Berb.*, *Bry.*, *Cham.*, *Hyosc.*, *Rhus.*, *Sep.*, *Sulph.*

— зубы кажутся тупыми: *Nitri-acidum.*, *Phosph-ac.*, *Berb.*, *Mercur.*, *Nux-v.*, *Puls.*, *Staph.*, *Sulph.*

— болятъ пустые зубы: *Ant.-crud.*, *Chin.*, *Merc.*, *Mezer.*, *Puls.*, *Staph.*, *Nux-x.*, *Cham.*, *Coff.*, *Sil.*, *Sulph.*, *Calc-carb.*

— цѣлый рядъ: *Cham.*, *Merc.*, *Rhus.*, *Staph.*, *Bell.*, *Puls.*, *N.-vom.*

— боль простирается въ глаза: *Cham.*, *Clem.*, *Puls.*, *Spig.*, *Calc-c.*

Когда во все лицо: *Merc.*, *Mezer.*, *Nux.-v.*,
Rhus., *Hyosc.*, *Sulph.*, *Bry.*, *Sil.*

— въ уши: *Merc.*, *Puls.*, *Cham.*, *Bry.*, *Rhus.*,
Sulph., *Ars.*

— въ голову: *Cham.*, *Merc.*, *Nux-vom.*, *Hyosc.*,
Staph., *Bell.*, *Rhus.*, *Ant.*

При зубной боли отъ промоченья: *Rhus.*,
Rhod., *Nux-mosch.*, *Borax.*, *Natr.-carb.*

— приливъ въ голову: *Acon.*, *Bell.*, *Chin.*,
Puls., *Hyosc.*, *Calc.*, *Bry.*, *Stram.*

— слюнотеченіи: *Merc.*, *Cham.*, *Bell.*, *Rhus.*,
Sep.

— ожесточеніи утромъ: *Bry.*, *Nux-vom.*,
Chin., *Hyosc.*, *Staphys.*, *Ignat.*

Боль вечеромъ: *Bell.*, *Merc.*, *Puls.*, *Ant.-crud.*,
Rhus., *Sulph.*

— ночью: *Bell.*, *Coff.*, *Magnes*, *Merc.*, *Mezer.*,
Puls., *Cham.*, *Bry.*, *Rhus.*, *Sil.*, *Sulph.*, *Staph.*

— въ теплой постелѣ: *Cham.*, *Merc.*, *Puls.*,
Spig., *Phosph*, *Magn.-c.*

— въ теплѣ вообще: *Chamom.*, *Hep.-s.*,
Puls., *Magn.-carb.*, *Rhod.*

При ожесточеніи на холодномъ возду-
хѣ: *Bell.*, *Calc.-c.*, *Chin.*, *Hyosc.*, *Merc.*, *Nitr.*,
Nux-vom., *Sep.*, *Sil.*, *Staph.*, *Sulph.*

— ожесточеніи на сквозномъ вѣтрѣ:
Ant., *Bell.*, *Bry.*, *Chin.*, *Hyosc.*, *Merc.*, *Nux.-*
v., *Puls.*, *Sep.*, *Sil.*, *Spig.*, *Staph.*, *Sulph.*

Боль отъ холоднаго питья: *Bry.*, *Cham.*,
Magnes., *Merc.*, *Nux-v.*, *Rhus.*, *Sil.*, *Spig.*

Боль отъ теплаго: *Bry.*, *Calc.-c.*, *Cham.*, *Merc.*,
Puls., *Rhod.*, *Sil.*, *Sulph.*

— отъ пищи вообще: *Bell.*, *Bry.*, *Caust.*,
Cham., *Magnes.*, *Merc.*, *Nux-v.*, *Puls.*, *Sep.*,
Sil., *Phosph.*

— отъ жеванія: *Cham.*, *Coff.*, *Bell.*, *Merc.*,
Bry., *Nux-v.*, *Puls.*, *Hyosc.*, *Rhus.*, *Hep.*,
Chin., *Sulph.*

— отъ умственныхъ занятій: *Bell.*,
Nux-v., *Ign.*

При ожесточеніи отъ кофе и вина: *Bell.*, *Cham.*,
Ign., *Merc.*, *Nux-vom.*

Боль отъ движенія: *Ars.*, *Bell.*, *Chin.*, *Nux-vom.*,
Phosph., *Spig.*

— отъ табаку: *Ars.*, *Chin.*, *Ign.*, *Spig.*, *Sab.*,
Clem.

— отъковырѣнія въ зубахъ: *Puls.*

— отъ прикосновенія: *Bell.*, *Bry.*, *Merc.*,
Arn., *Ign.*, *Staph.*, *Ars.*

— отъ присасыванія: *Ammon.*, *Bell.*, *Carb-v.*,
Kali-c., *Nitr-ac.*, *Nux-mosch.*, *Nux-vom.*, *Zinc.*

При облегченіи отъ холоднаго воздуха.
Puls., *Sep.*, *Bry.*, *Sabad.*

Боль отъ холоднаго питья: *Bry.*, *Clem.*, *Puls.*,
Bell.

— отъ тепла: *Nux-v.*, *Rhus.*, *Merc.*, *Ars.*,
Sulph., *Kali-c.*, *Nux-mosch.*

— отъ теплаго питья и пищи: *Lyc.*,
Nux-mosch., *Magn-m.*, *Rhus.*, *Phosph.*, *Nitr-*
ac., *Sil.*, *Sulph.*

Боль отъ пищи: *Rhod., Cham., Sil., Amb., Ammon-c.*

— отъ жеванья: *Coff., Chin., Ars., Seneg., Bry.*

— отъ давленія: *Bell., Chin., Puls., Rhus., Merc.*

— отъ ковырянья до крови: *Bell., Sassa., Ammon.*

— отъ лежанія: *Bry., Ign., Merc., Nux-v., Spig.*

— въ спокойствіи вообще: *Bry., Arn., Spig., Staph.*

— отъ ходьбы: *Puls., Rhus., Nux-v., Bov., Her., Stann.*

При облегченіи когда сядетъ въ постелѣ: *Merc.*

— отъ согрѣванія въ постелѣ: *Amn., Bry., Lyc., Nux-v.*

Боль отъ куренья табаку: *Borax., Merc., Natr., Spig.*

— въ комнатѣ: *Nux-vom., Phosph., Staph.*

— отъ чищенья зубовъ: *Phosph., Sep.*

— во время сна: *Nux-v., Puls.*

Противъ зубной боли во время регуль: *Cham., Calc.-c., Carb.-v., Phosph., Puls., Sep.*

Боль во время беременности: *Bell., Nux-v., Puls., Magn-c., Hyosc., Rhus., Staph.*

Противъ зубной боли во время кормленья грудью: *Chin., Calc., Merc., Nux-v., Sep., Sulph., Acon., Bell., Ars.*

Хотя зубы обыкновенно портятся отъ различныхъ худосочій и болѣзненнаго состоянія пищевыхъ путей, однакожъ для сохраненія ихъ чрезвычайно важно соблюденіе чистоты. Дѣтей нужно приучать непремѣнно ежедневно, всего лучше на ночь чистить зубы щеткою и послѣ каждого обѣда хорошенько выполаскивать тепловатою водою, чтобы на нихъ никогда не оставалось слизи и остатковъ пищи. Для чищенья щеткою дѣтямъ достаточно воды. Взрослымъ полезно прибавлять въ воду нѣсколько капель виннаго спирту или о-де-колоня. Отъ времени до времени можно чистить также порошкомъ, всего лучше мѣловымъ (изъ выщелоченнаго мѣлу) *). Для слабыхъ, кровоточивыхъ и болящихъ десенъ въ этотъ порошокъ прибавляется также *Staphysagria*. Угольный порошокъ очень хорошъ для очистки зубовъ, но представляетъ ту невыгоду, что осаживается за края десенъ, даже здоровыхъ, и, будучи нерастворимъ, постепенно проникаетъ глубже и глубже, до корня, гдѣ является постороннимъ тѣломъ, разъединяющимъ зубъ отъ стѣнокъ гнѣзда, и способствуетъ расшатыванью и выпаденію. Кромѣ очищенія весьма важно также защищать полые, дуплистые зубы отъ прониканія въ нихъ пищи и воздуха, потому что то и другое, не только раздражаетъ, но способствуетъ продолженію порчи.

*) Можно получить въ гомеопатической аптекѣ.

Поэтому полезно, по предварительномъ очищеніи до-суха, затыкать всякую выкрошившую часть. Для этого всего лучше мягкая гуттаперчевая пломба. Металлическая большею частью причиняетъ боль и неудобна тѣмъ, что, въ случаѣ продолженія порчи стѣнокъ зуба вокругъ ея, даетъ доступъ воздуху и остаткамъ пищи, стало-быть причиняетъ страданіе и требуетъ замѣны новою, а замѣна эта часто бываетъ совершенно невозможна или сопровождается изломомъ зуба. Гуттаперчевую пломбу, продающуюся въ видѣ тонкихъ палочекъ и для употребленія размягчаемую въ горячей водѣ, при нѣкоторой сноровкѣ, всякій можетъ самъ перемѣнять по мѣрѣ надобности. Кому удобно, тому безъ сомнѣнія и полезно по крайней мѣрѣ въ годъ разъ дать осмотрѣть ротъ зубному врачу, избравъ однакожъ такого, который не слишкомъ охочъ выказывать свое искусство дергать, пилить и стальными скребками сдирать винный камень вмѣстѣ съ эмалью. Повредить эмаль зуба значитъ непременно положить начало порчѣ самаго здороваго зуба. На этомъ основаніи и пропиливаніе тѣсно сидящихъ зубовъ одна изъ самыхъ вредныхъ операцій.

§ VI.

БОЛѢЗНИ ЗѢВА И ГОРЛА.

1. ВОСПАЛЕНІЕ ЗѢВА, ЖАБА.

Воспаленіе горла или, лучше сказать, зѣва, большею частію состоитъ въ краснотѣ и опухли мягкихъ частей въ глубинѣ полости рта и особенно миндалевидныхъ железъ и язычка, съ болью и затрудненнымъ глотаньемъ. Опухши бываетъ большею частью только одна сторона, однакожъ случается, что и обѣ миндалины напухаютъ. Когда эта опухоль незначительна и боль состоитъ больше въ непріятномъ ощущеніи, какъ-будто что засѣло въ горлѣ, и побуждаетъ отхаркнуть, съ сухостью во рту и припухlostью подчелюстныхъ железъ, то для устраненія всей болѣзни достаточно *Cham.*

Когда краснота, опухоль и боль очень сильны и глотаніе очень затруднительно, какъ-будто затягиваетъ горло при питьѣ, шея снаружи напухла, жаръ, сухость во рту, постоянное побужденіе глотать, то слѣдуетъ употребить *Bell.* въ частыхъ приѣмахъ. Когда много слюны, трудно глотать и сильная боль простирается въ ухо, гадкій вкусъ во рту, значительная опухоль миндалинъ прости-

рается до корня языка и до десенъ: *Merc.* Вообще это средство показано, когда начинается нагноеніе, опухоль становится неровною, бугроватою, свѣтло-краснаго или желтоватаго цвѣта, или когда гной уже выступилъ и образовались язвы и мокнуція мѣста.

При быстро развивающейся отечной опухоли, въ особенности, когда опухоль далеко распространяется на сосѣднія части, особенно у лимфатическихъ субъектовъ, быстрѣе и лучше белладонны дѣйствуетъ *Apis*.

Lachesis иногда очень скоро облегчаетъ въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ повидимому показанъ *Merc.*, въ особенности когда небо и язычекъ распухли, побужденіе къ глотанію очень сильно, много слюны во рту и мокроты въ горлѣ; при глотаніи жидкостей судорожное сжатіе глотки; хуже послѣ сна и отъ малѣйшаго прикосновенія къ горлу; затрудненное дыханіе и опасность задохнуться.

Nux-vomica прилична въ воспаленіяхъ меньшей степени, когда опухоль не очень значительна и есть скребленіе, осадно при глотаніи и вдыханіи воздуха; опущеніе язычка, опухоли, какъ-будто глотка сжужена или засѣлъ комокъ; при побужденіи на кашель и при запорѣ.

Когда есть очень сильный лихорадочный жаръ и общее раздраженіе, то полезно бываетъ предварительно дать нѣсколько приѣмовъ *Aconit*.

Расположеніе къ частымъ возвратамъ этой болѣзни вслѣдствіе простуды, всего лучше уничто-

жаютъ *Hepar.*, *Baryta* и *Kali-jodat.*, въ особенно-
сти если въ распухлыхъ железахъ осталось отвер-
дѣніе.

2. ДИФТЕРИТЬ, ГНИЛАЯ ЖАБА.

Эта чрезвычайно опасная и скоротечная бо-
лѣзнь довольно часто поражаетъ и взрослыхъ,
особенно при эпидеміи, и потому, не исключитель-
но дѣтская, однакожь всѣхъ чаще и въ особен-
ности губить дѣтей. Она отличается воспаленіемъ
слизистой оболочки всего зѣва съ особеннымъ
бѣлымъ, плесени подобнымъ выпотомъ, имѣю-
щимъ наклонность къ антонову огню, и сопро-
вождается общимъ разложеніемъ соковъ. Начи-
нается она какъ обыкновенное воспаленіе горла,
съ затрудненіемъ глотанія и болью; но скоро на
темно-красной слизистой оболочкѣ показываются
клячья бѣлаго выпота, сидяція съ виду очень по-
верхностно и похожіе на приставшіе кусочки тво-
рогу. Лихорадка незначительна, но тѣмъ значи-
тельнѣе общая слабость. При дальнѣйшемъ рас-
пространеніи выпота, особенно книзу, онъ по-
лучаетъ грязноватый цвѣтъ; боль и затрудненіе
глотанія и рѣчи увеличиваются; хриплое дыханіе
становится вонючимъ; больной умираетъ или отъ
паралича глоточныхъ и гортанныхъ частей, или-же
отъ разрушенія ихъ антоновымъ огнемъ и отъ
общаго тифознаго истощенія. Въ счастливомъ слу-
чаѣ выздоровленіе совершается очень медленно

и обыкновенно сопровождается довольно продолжительнымъ параличемъ нѣкоторыхъ или даже всѣхъ конечностей. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, особенно у маленькихъ дѣтей, болѣзнь исходитъ такъ быстро, что вмѣстѣ съ обнаруженіемъ слабости и нитеобразнаго пульса оказывается уже выступившій въ потъ и наступаетъ смерть.

Въ началѣ этой страшной болѣзни всѣ припадки указываютъ преимущественно на *Bellad.* и *Apis.*, но какъ скоро уже нѣтъ сомнѣнія, что мы имѣемъ дѣло съ дифтеритомъ, то слѣдуетъ давать въ частыхъ пріемахъ, черезъ 2 — 3 часа и чаще. *Merc.-cyanat.* 3, (въ порошокъ) или 6 въ капляхъ. Средство это, открытое въ Петербургѣ д-ромъ Бекомъ, въ 1863 г., и, подтвержденное наблюденіями д-ра фонъ-Виллерса, оказалось специфическимъ въ дифтеритѣ. Не слѣдуетъ только медлить дачею его при первыхъ признакахъ выпота. При признакахъ гангрены показаны также *Nitri-acid.*, *Carbo-veg.* и *Arsen.*, къ которымъ однакожъ не приходится прибѣгать, если во-время былъ употребленъ *Merc.-cyanat.*

Мѣстныя притравы адскимъ камнемъ и ѣдкими щелочами пока еще не дали ни одного хорошаго результата. Они повторяются только потому, что такъ научаешь рутинна, не разбирающая вопроса — можетъ-ли прижиганіе мѣстнаго продукта болѣзни уничтожить общую болѣзнь соковъ. Если есть возможность доставить больному временное облегченіе отдѣленіемъ этого продукта (выпота), то

этого безвреднѣе можно достигнуть полосканьемъ или обмываньемъ теплою водою.

3. КРУПЪ, ПЛЕВИСТАЯ ЖАБА ГОРТАНИ.

Эта опасная болѣзнь поражаетъ почти исключительно дѣтей отъ 1 до 8 лѣтъ. Особенное расположеніе къ ней, повидимому, имѣютъ золотушные дѣти. Сырая, холодная погода много содѣйствуетъ ея развитію.

Послѣ простыхъ катарральныхъ явленій, а иногда и безъ нихъ, вдругъ ночью обнаруживается сухой хриплый кашель, похожій на лай собаки, съ большимъ безпокойствомъ, метаніемъ, хрипlostью и болѣе или менѣе значительною болью въ гортани. Послѣ перваго припадка кашля больной обыкновенно засыпаетъ и потомъ опять пробуждается отъ новаго, еще сильнѣйшаго припадка. Кашель становится еще глуше, звуки его похожи на карканье и за каждымъ порывомъ кашля слѣдуетъ свистящее дыханіе. Голосъ совершенно пропадаетъ; припадки кашля сопровождаются чрезвычайнымъ усиленіемъ откашлянуть: больной давится до рвоты, но ничего не можетъ выплюнуть. Впослѣдствіи уже появляется слизистое изверженіе и болѣе или менѣе значительные клочки плотной плевы или кожицы, иногда въ видѣ трубочекъ. Затрудненіе дыханія все болѣе и болѣе усили-

вается; больной съ ужасомъ вскакиваетъ, цѣпляется за все окружающее, хватается себя за горло и откидываетъ голову назадъ. Лицо надувается, багровѣетъ, выступаетъ холодный потъ, конечности холодѣютъ, пульсъ исчезаетъ и ребенокъ умираетъ въ ужаснѣйшихъ мукахъ. Часто болѣзнь послѣ первыхъ припадковъ, къ утру повидимому проходитъ, оставляя только небольшой кашель и охриплость, а на слѣдующую ночь снова возвращается еще сильнѣе. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ смерть наступаетъ медленнѣе и менѣе бурно вслѣдствіе постепеннаго развитія воспаленія легкихъ, сердца и мозга.

Какъ ни опасна эта болѣзнь, однако при надлежащемъ гомеопатическомъ леченіи она уничтожается скоро, лишь-бы мѣры были приняты вовремя, пока образованіе плевы еще не достигло значительной степени. При быстромъ ходѣ этой болѣзни, возможность спасенія нерѣдко зависитъ отъ одного часа; поэтому никогда не должно оставлять безъ вниманія у дѣтей катарръ съ охриплостью и необыкновеннымъ звукомъ кашля.

Spongia, какъ уже доказано множествомъ опытовъ, совершенно вѣрное и быстро дѣйствующее средство противъ этой болѣзни. Нужно давать отъ 1 до 2 капель перваго или втораго разведенія, смотря по возрасту больного, и повторять каждый часъ или даже каждую четверть часа, смотря по силѣ и развитію болѣзни. Когда припадки крупа сопровождаются сильнымъ жаромъ,

краснотою лица и лихорадкой, или когда крупъ является во время кори, красухи, скарлатины, то прежде *Spong.* нужно дать *Acon.*, или же давать *Acon.* и *Spong.*

Въ случаяхъ очень опасныхъ, при чрезвычайно быстромъ развитіи болѣзни и большой наклонности къ образованію плотныхъ пленокъ къ гортани и дыхательномъ горлѣ, а равно и въ тѣхъ случаяхъ, когда болѣзнь уже затянулась, можно съ успѣхомъ употребить *Jod.* втораго или третьяго разведенія.

Когда этими средствами опасность удушенія устранена, кашель и хрипота уменьшены и больной становится спокойнѣе, то всетаки ни въ какомъ случаѣ не должно спускать его съ постели ранѣе 24 часовъ и должно продолжать давать *Spong.* черезъ 3 или 4 часа по приему, покуда кашель не уничтожится или по-крайней-мѣрѣ до тѣхъ-поръ, пока не обратится въ обыкновенный катарръ.

Если на слѣдующую ночь припадки снова усилятся, то снова давать тѣ-же лекарства въ учащенныхъ приемахъ.

Когда во время припадковъ больной давится, есть расположеніе къ рвотѣ и слышно, какъ-будто въ горлѣ много мокроты, то хорошо давать почаще по глотку горячей воды, что способствуетъ отдѣленію мокроты кашлемъ.

Когда кашель достаточно облегчится и затрудненіе дыханія будетъ происходить только отъ на-

копленія мокроты, то можно употребить *Нераг.* второго дѣленія. Это средство предпочитается даже самой *Spong.*, когда въ самомъ началѣ болѣзни очень много мокроты и когда раздраженіе кровеносной системы не очень сильно.

Если-бы, несмотря на всѣ эти средства, опасность продолжала возрастать, то можно еще употребить *Brom.* или *Phosph.* третьяго или шестаго разведенія въ учащенныхъ приемахъ.

4. КАШЕЛЬ, ОСТРЫЙ И ХРОНИЧЕСКІЙ КАТАРРЪ.

Кашель можетъ быть явленіемъ, сопрягающимъ разныя острыя и хроническія болѣзни. Здѣсь идетъ рѣчь только о томъ, который въ видѣ простаго катарра дыхательныхъ путей обыкновенно вмѣстѣ съ насморкомъ, является самостоятельною болѣзнію вслѣдствіе простуды.

Когда катарръ сопровождается ознобомъ и лихорадочными явленіями, болью въ горлѣ и въ головѣ, въ особенности у дѣтей, то всегда полезно бываетъ дать нѣсколько приемовъ *Aconit.*

Когда лихорадочныя явленія не такъ сильны, кашель сухой, въ горлѣ сухое скребленіе, и когда кашель такъ силенъ, что какъ-будто угрожаетъ разрывомъ головы и живота и усиливается въ особенности утромъ, то приличнѣе *Nux-vomica.*

Chamomilla соотвѣтствуетъ сухому кашлю, ко-

торый усиливается отъ разговора, и ночью пробуждаетъ отъ сна щекотаніемъ въ горлѣ.

Belladonna при судорожномъ кашлѣ, потрясающемъ все тѣло, съ постояннымъ щекотаніемъ въ горлѣ, болью при глотаніи, ощущеніи распиранія въ головѣ, краснотѣ лица, жадѣ и стѣсненіи дыханія.

Bryonia при сухомъ кашлѣ съ щекотаніемъ въ горлѣ, съ позывомъ на рвоту, въ особенности послѣ ѣды и при входѣ въ теплый покой, съ колющемъ въ боку, или также при сыромъ кашлѣ съ желтоватою мокротою, и когда кашель болѣзненно отдается въ головѣ, горлѣ и груди.

Ipecacuanha въ особенности дѣтямъ, когда они задыхаются отъ кашля, краснѣютъ и багровѣютъ въ лицѣ, давятся до рвоты слизью; также при совершенно сухомъ кашлѣ съ щекотаніемъ въ горлѣ, съ стучаніемъ въ головѣ, біеніемъ подъ ложечкой и частыми побужденіями на мочу.

Tartarus-emeticus при кашлѣ съ обильною мокротой и хрипотою въ груди, садномъ въ горлѣ и груди, стѣсненіемъ дыханія передъ кашлемъ и облегченіемъ по изверженіи мокроты.

Hyoscyamus при сухомъ кашлѣ съ щекотаніемъ въ горлѣ, ожесточеніемъ ночью, въ лежачемъ положеніи и облегченіемъ, когда привстанешь или сядешь.

Mercurius при потрясающемъ кашлѣ, въ особенносн ночью и вечеромъ, иногда съ кровотеченіемъ изъ носу, водянистымъ насморскомъ, охрип-

лостью, головною болью, поносомъ и изнурительнымъ потомъ.

Pulsatilla при кашлѣ съ обильною, бѣловато-желтою мокротою, горькаго, гадкаго вкуса съ ощущеніемъ, какъ - будто что подымается, давить и скребетъ въ горлѣ.

Euphrasia при кашлѣ съ сильнымъ насморкомъ и страданіемъ глазъ; при ожесточеніи днемъ и утромъ, со облегченіемъ или совершеннымъ прекращеніемъ ночью.

Всякій **хроническій** катарръ, зависящій отъ органическаго страданія легкихъ или другихъ какихъ-нибудь внутреннихъ органовъ, можетъ быть уничтоженъ только посредствомъ излеченія главной болѣзни, если это излеченіе вообще возможно; но и въ случаѣ невозможности такого излеченія, паллятивными облегчающими средствами могутъ служить:

Sulphur при охриплости, нечистомъ, слабомъ голосѣ, накопленіи мокроты въ воздухоносныхъ путяхъ, саднящей боли въ груди, ожесточеніи отъ сыраго холоднаго воздуха; при сильномъ кашлѣ съ густою бѣловатою или желтоватою мокротою днемъ и сухимъ кашлемъ и затрудненнымъ дыханіемъ ночью, въ особенности при золотушномъ и туберкулезномъ расположеніи или въ чахоточномъ состояніи.

Phosphorus при такомъ же расположеніи, какому соотвѣствуетъ *Sulphur*, при сухомъ кашлѣ, чувствительности, и покалываніи въ гортани, охри-

лости, короткомъ дыханіи, приливахъ крови къ груди и въ голову, возбужденіи кашля отъ разговора, смѣха и движенія на воздухѣ.

Kali carbonicum при осиплости и садненіи въ горлѣ; при ощущеніи какъ-будто что засѣло тамъ, при сухомъ удушающемъ кашлѣ, особенно ночью и утромъ, съ трудно отходящею мокротой и утомленьемъ послѣ приступа; также при обильномъ отдѣленіи гноевидной мокроты, одышкѣ и боли въ груди.

Calcarea при сухомъ, сильномъ щекочущемъ кашлѣ, какъ-будто отъ пыли въ горлѣ, особенно вечеромъ въ постели или ночью во время сна; при густой, желтоватой вонючей мокротѣ, съ хрипѣніемъ въ груди, слабостью, худѣніемъ и поносистыхъ испражненіяхъ.

Stannum при обильной зеленоватой или желтоватой мокротѣ, сладковатаго или соленого вкуса, въ особенности утромъ и вечеромъ въ постелѣ.

Phosphori acidum при кашлѣ поутру съ желтоватою или гноевидною мокротой, гадкаго, кровавнистаго вкуса и запаха, а вечеромъ большею частію сухомъ, и при расположеніи къ поту и поносу.

Carbo vegetabilis при упорной осиплости, въ особенности утромъ и вечеромъ; при судорожномъ кашлѣ, который усиливается отъ разговора и дурной погоды; при зеленоватой мокротѣ съ щекотаніемъ и жженіемъ въ гортани.

Arsenicum при сухомъ, удушающемъ кашлѣ въ особенности вечеромъ и ночью; при кашлѣ

возбуждаемомъ питьемъ и холоднымъ воздухомъ; при стѣсненіи въ груди, припадкахъ удушья въ лежачемъ положеніи, принуждающемъ садиться; при утомленіи и слабости.

Кромѣ того могутъ быть пригодны также средства, соотвѣтствующія простому острому катарру, каковы: *Ars.*, *Merc.* и *Tart.-emet.*

Вообще различнымъ катарральнымъ припадкамъ соотвѣтствуютъ:

Сухому кашлю: *Acon.*, *Bell.*, *Hyosc.*, *Ipec.*, *Kali.*,
Nux-v., *Phosph.*, *Spong.*

Судорожному: *Bell.*, *Cupr.*, *Dros.*, *Hyosc.*,
Ipec.

Со рвотою: *Acon.*, *Ferr.*, *Ipec.*, *Puls.*, *Tart.-emet.*, *Veratr.*

Съ легкимъ отдѣленіемъ мокроты: *Ars.*, *Bry.*,
Calc., *Phos.*, *Puls.*, *Stann.*, *Tart.-emet.*, *Ac-phosph.*

— **слизистой мокротой**: *Ars.*, *Bry.*, *Calc.*,
Phos., *Puls.*, *Stann.*, *Tart.-emet.*

— **кровянистою**: *Acon.*, *Arn.*, *Bry.*, *Ferr.*,
Nitr.-ac., *Phos.*, *Sulph.*

— **гнойною**: *Calc.*, *Carb.-veg.*, *Chin.*, *Kali-c.*,
Phos., *Sulph.*, *Ars.*, *Phos-ac.*

— **дурно пахнущею**: *Calc.*, *Carb.-veg.*, *Phos.-ac.*,
Stann., *Ars.*

— **водянистою**: *Cham.*, *Chin.*, *Ferr.*, *Merc.*,
Stann., *Sulph.*

— **вязкою**: *Ars.*, *Bell.*, *Carb.-veg.*, *Jod.*, *Merc.*,
Senega.

Съ зеленоватою: *Ars.*, *Carb.-veg.*, *Lyc.*, *Puls.*,
Stann.

— сѣрою: *Ars.*, *Lyc.*, *Nux-vom.*, *Sep.*

— соленою: *Ars.*, *Lyc.*, *Natr.-c.*, *Phos.*, *Puls.*,
Sep., *Stann.*

— горькою: *Ars.*, *Nux-vom.*, *Puls.*

— сладковатою: *Calc.*, *Phos.*

— гнилостною: *Ars.*, *Carbo-veget.*, *Merc.*,
Phos., *Puls.*, *Stann.*, *Sulph.*

— кислою: *Calc.*, *Nux-vom.*, *Puls.*

При кашлѣ вечеромъ: *Ars.*, *Calcar.*, *Dros.*, *Hep.*,
Merc., *Puls.*, *Stann.*

— кашлѣ ночью: *Acon.*, *Ars.*, *Bell.*, *Calc.*,
Cham., *Hyosc.*, *Kali.*, *Merc.*, *Nux-vom.*, *Puls.*,
Spong.

— кашлѣ утромъ: *Ars.*, *Bry.*, *Chin.*, *Jod.*,
N.-vom., *Puls.*, *Stann.*, *Sulph.*

— усиленіи отъ движенія: *Ars.*, *Bry.*,
Dros., *Ferr.*, *Nux-vom.*, *Phos.*, *Stann.*

— отъ разговора: *Chin.*, *Nux-vom.*, *Phos.*,
Stann.

— на воздухѣ: *Ars.*, *Phos.*, *Sulph.*, *Sulph-ac.*

— отъ пищи: *Ars.*, *Bry.*, *Calc.*, *Chin.*, *Hep.*,
Nux-vom., *Phos.*, *Puls.*, *Sulph.*

— лежа: *Ars.*, *Hyosc.*, *Puls.*, *Sulph.*

— громкомъ отрывистомъ кашлѣ: *Bell.*,
Dros., *Hep.*, *Jod.*, *Spong.*

— кашлѣ съ удушьемъ: *Ars.*, *Cuprum.*,
Ipec., *Opium*, *Tart.-emet.*, *Veratr.*

- съ щекотаніемъ: *Acon.*, *Ars.*, *Calc.*,
Cham., *Jod.*, *Ipec.*, *Nux-vom.*, *Phosph.*
- съ охрипlostію: *Acon.*, *Carb.-veg.*, *Hep.*,
Merc., *Spong.*
- со свистомъ: *Cina.*, *Dros.*, *Hep.*, *Spong.*
- съ кряхтеніемъ: *Acon.*, *Ars.*, *Merc.*,
Nux-v., *Sulph.*

5. КОКЛЮШЪ.

Этой болѣзни подвергаются большею частью только дѣти, но и взрослые не совершенно исключены, въ особенности когда эта болѣзнь является эпидемически и становится отчасти заразительною. Коклюшъ начинается какъ обыкновенный кашель съ насморкомъ, но скоро переходитъ въ особенную характеристическую форму, является припадками, состоящими изъ частыхъ короткихъ толчковъ кашля, или выдыханій съ недостаточными вдыханіями, за которыми вдругъ слѣдуетъ продолжительное, глубокое, громкое, свистящее вдыханіе. Такой припадокъ продолжается двѣ, три минуты и болѣе, и повторяется, смотря по силѣ болѣзни, черезъ промежутки времени отъ 1 до 4 и 8 часовъ. Въ самыхъ промежуткахъ большею частью незамѣтно никакихъ слѣдовъ болѣзни. Когда припадки очень сильны, то имъ предшествуетъ безпокойство и страхъ, больной упирается руками, старается прислонить голову или вы-

тягиваетъ ее впередъ, лицо багровѣетъ и замѣтно страданіе отъ удушья. Припадокъ обыкновенно оканчивается изверженіемъ мокроты, иногда и рвотой, слезью и даже пищей. Ходъ болѣзни болѣею частью медленный, отъ 3 до 12 недѣль; при неосторожности можетъ окончиться воспаленіемъ легкихъ или дыхательнаго горла.

Въ началѣ, когда припадки кашля еще не имѣютъ судорожнаго характера, но когда уже можно узнать коклюшъ, то показанныя средства могутъ предупредить развитіе и скоро уничтожить болѣзнь. Когда-же она уже развилась вполне, то скорого исцѣленія ожидать нельзя, однако во всякомъ случаѣ соотвѣтствующія средства могутъ значительно сократить болѣзнь и самые припадки ослабить и сдѣлать менѣе опасными.

Главные средства: *Bell.*, *Veratr.*, *Ipec.*, *Cuprum*, *Cina*, *Drosera*, *Samб.*

Belladonna соотвѣтствуетъ большей части случаевъ, когда есть сильный, лающий, сухой кашель; мало или вовсе нѣтъ мокроты; полость рта и зѣва красна, кровь приливаетъ въ голову, голова тяжела и клонитъ сонъ.

Ipecacuanha, когда кашель очень сильно душитъ, лицо багровѣетъ и есть кровотеченіе носомъ или рвота пищею.

Veratrum, при частой рвотѣ, блѣдномъ осунувшемся лицѣ, холодномъ потѣ, безпокойствѣ и страхѣ передъ припадкомъ кашля; при жаждѣ и

зѣбкости и при отдѣленіи мочи во время припадковъ кашля.

Cina, когда ребенокъ во время кашля судорожно вытягивается и потомъ слышится булькающій звукъ отъ горла внизъ къ желудку; когда послѣ рвоты является сильный голодъ; когда ребенокъ очень блѣденъ, имѣетъ синеву подъ глазами, часто третъ носъ и вообще есть признаки глистовъ.

Drosera соотвѣтствуетъ болѣе легкимъ припадкамъ съ обильнымъ отдѣленіемъ мокроты, охрипlostью и свистающимъ, хриплымъ дыханіемъ.

Cuprum соотвѣтствуетъ очень сильнымъ степенямъ болѣзни, когда дыханіе во время припадковъ кашля совершенно прерывается, случается оцѣненіе или подергиваніе въ тѣлѣ; больной послѣ припадка медленно и трудно приходитъ въ себя, и когда кромѣ кашля въ груди слышится хрипѣніе отъ множества мокротъ.

Когда припадки коклюша въ особенности сильны и часты по ночамъ, то съ успѣхомъ дѣйствуютъ также *Mezereum* и *Conium*.

Во все продолженіе болѣзни очень строго нужно наблюдать, чтобы больной оставался сколько возможно въ ровной температурѣ, для предотвращенія опаснаго воспаленія легкихъ. Больного должно держать въ комнатѣ и только въ теплую погоду выпускать на воздухъ. Пищу должно давать питательную, но легкую и удобоваримую и притомъ

лучше чаще и понемногу, чтобы обремененіемъ желудка не поддерживать наклонности къ рвотѣ.

6. ГРИППЪ.

Гриппомъ называется катарральная лихорадка или эпидемическій острый катарръ дыхательныхъ путей, появляющійся обыкновенно зимою и весною и сопровождающійся общею слабостью и раздраженіемъ нервовъ. Будучи запущенъ или неудовлетворительно вылеченъ, гриппъ можетъ сдѣлаться чрезвычайно опаснымъ и нерѣдко оставляетъ по себѣ расположеніе къ туберкуламъ и легочной чахоткѣ.

Главныя средства противъ этой болѣзни: *Merc.*, *Caust.*, *Jod.*, *Acon.*, *Bell.*, *Bryon.*, *Brom.*, *Spong.*, *Hyosc.*, *Op.*, *Ipecac.*, *Hep.*, *Seneg.*, *Nux-vom.*, *Phosph.*, Соображаясь съ припадками, можно употребить и другія средства, показанныя противъ различныхъ видовъ кашля.

7. ОХРИПЛОСТЬ И ПОТЕРЯ ГОЛОСА.

Охриплость вслѣдствіе обыкновеннаго насморка или кашля скорѣе всего уничтожается посредствомъ *Merc.*, *Cham.*, *Puls.* или *Nux-v.*

Mercurius соотвѣтствуетъ въ особенности охрип-

лости и нечистому голосу съ жженіемъ и щекотаніемъ въ гортани, съ наклонностью къ необлегчающему поту и къ ожесточеніямъ отъ холоднаго воздуха.

Chamomilla: охриплости съ насморкомъ, вязкою мокротой въ горлѣ, сухостью, жженіемъ и жаждою, съ щекотаніемъ, побуждающимъ каплять, ознобомъ по вечерамъ и пасмурнымъ расположеніемъ духа.

Nux-vomica: сухому, глухому кашлю съ сухостью, натяженіемъ и болью въ горлѣ, ознобомъ и жаромъ и при угрюмомъ, сварливомъ расположеніи духа.

Pulsatilla: колотью и ощущенію садна въ горлѣ, боли при глотаніи, насморку и кашлю съ обильною зеленоватою мокротой и при зябкости, безъ жажды.

Когда лихорадочное состояніе очень сильно и сопровождается значительною чувствительностью къ боли, то полезно бываетъ дать нѣсколько приемовъ *Aconit*.

Важнѣе и труднѣе леченіе хронической охриплости и потери голоса, потому что онѣ почти всегда происходятъ отъ болѣе глубокаго болѣзненнаго состоянія легкихъ или дыхательныхъ вѣтвей. Главныя средства здѣсь: *Jod.*, *Mang.*, *Merc.*, *Нер.*, *Phos.*, *Carb-v*, *Caust.* и *Brom*. Если при этомъ еще есть явные признаки воспаленія слизистой оболочки гортани, то его слѣдуетъ предварительно уничтожить посредствомъ *Acon.*, *Bell.*,

Phos. или *Нер.* Если послѣ того боль остается умѣренная, но много мокроты и голосъ глухъ, то лучшее средство *Mangan.*, а при сильной боли *Jod.* При воспаленіи гортани съ болью и щеко-таніемъ *Spongia.*

Jod уничтожаетъ также продолжительную охрип-лость послѣ гриппа.

Bry. и *N-vom.* соотвѣтствуютъ охрипlosti, си-дащей глубже въ груди.

Противъ охрипlosti, послѣ кори или крупа, въ особенности у слабыхъ субъектовъ или нерв-ныхъ женщинъ, всего лучше дѣйствуетъ *Phos- phorus.*

Противъ продолжительной охрипlosti при на-клонности къ поту и слюнотеченію, въ особенно-сти у золотушныхъ или страдавшихъ сифилити-ческой болѣзнію, самое лучшее средство *Mercur.*

Нерар показанъ при большой чувствительности къ холодному воздуху, обильномъ отдѣленіи и хрипѣніи мокроты, когда мокрота душитъ и при-рвотѣ мокротой; при затрудненномъ, свистящемъ дыханіи, въ особенности послѣ злоупотребленія ртути.

Causticum: при постоянномъ расположеніи къ охрипlosti до совершеннаго безгласія, при ощу-щеніи посторонняго тѣла въ горлѣ; при сухомъ кашлѣ, скребленіи и саднѣ въ горлѣ и въ груди и при большомъ расположеніи къ простудѣ.

Carbo vegetabilis: при продолжительной охрип-losti, которая усиливается въ особенности по-

утру и вечеромъ и отъ разговора, съ сухимъ, хриплымъ кашлемъ, царапаньемъ, скребленьемъ и жженьемъ въ горлѣ и въ груди или съ бѣловатою гнойвидною мокротой.

Bromium: при постоянной охриплости съ жжениемъ, садненьемъ въ горлѣ; при ощущеніи стягиванья или холода въ горлѣ и большой чувствительности къ холодному воздуху.

8. КРОВОХАРКАНІЕ.

Кровохарканіе или отдѣленіе крови или кровянистой мокроты при кашлѣ и отхаркиваніи составляетъ только симптомъ или слѣдствіе другой болѣзни, а въ особенности органическаго страданія легкихъ или чахотки. Поэтому для радикальнаго исцѣленія его совершенно необходимо обратить вниманіе на главное страданіе.

При отплевываніи крови прежде всего нужно убѣдиться, точно-ли кровь происходитъ изъ горла. Она можетъ происходить также изъ желудка или изъ носу (задними отверстіями) или просто изъ десенъ. Кровь, происходящую изъ желудка, можно отличить отъ горловой (изъ легкихъ), потому что она всегда бываетъ темная, черная, и съ примѣсью слизи. (См. рвота кровью). Кровь изъ легкихъ идетъ ярко-красная и притомъ сопровождается откашливаніемъ, чего при желудочной крови нѣтъ.

Насчетъ кровавистаго изверженія, которое встрѣчается при воспаленіи легкихъ, нужно обратиться къ средствамъ, показаннымъ противъ этого воспаления.

Кровохарканіе большею частію случается у людей долго страждущихъ кашлемъ. Обыкновенныя средства противъ этого: *Arnica*, *Bellad.*, *Ferr.*, *Nitr-ac.*, *Chin.*, *Phosph.* и *Puls.*

Arnica показана, когда легко извергается чистая кровь, въ особенности вслѣдствіе тѣлеснаго напряженія или механическаго поврежденія, при одышкѣ, колотѣ и боли въ ребрахъ, какъ-будто разбиты, въ особенности во время кашля и движенія; при упадкѣ силъ и расположеніи къ обмороку.

Belladonna при сильномъ щекочущемъ и судорожномъ кашлѣ, сильномъ приливѣ крови къ груди и къ головѣ, біеніи сердца, головной боли, краснотѣ лица, жадѣ и сухости въ горлѣ; въ особенности также вслѣдствіе остановки регулъ и геморроидальныхъ истеченій.

China, когда кровь извергается сильнымъ кашлемъ съ дрожью и летучимъ жаромъ попеременно; при чрезвычайной слабости, сильной испаринѣ, дрожаніи въ тѣлѣ и потемнѣніи въ глазахъ, въ особенности послѣ значительной потери крови, при обморокахъ, блѣдности, холоднѣніи и подергиваніяхъ въ рукахъ и въ лицѣ.

Ferrum, когда чистая, ярко-красная кровь извергается при незначительномъ кашлѣ, болитъ

между лопатками, трудно дышать, въ особенности ночью и въ спокойномъ положеніи; при значительной слабости, особенно у людей сухощавыхъ, имѣющихъ блѣдную, желтоватую кожу и послѣ значительныхъ потерь крови и соковъ вообще.

Nitri-acidum: при изверженіи черной крови сгустками, при сухомъ, потрясающемъ кашлѣ, въ особенности ночью; при стѣсненіи груди, приливахъ крови къ груди и біеніи сердца.

Phosphor: при застарѣломъ, сухомъ кашлѣ съ колотьемъ въ горлѣ и садномъ въ груди; при тяжести и полнотѣ въ груди, приливахъ крови съ ощущеніемъ жара въ горлѣ и біеніемъ сердца; также при вязкой гноевидной, зеленоватой мокротѣ съ кровью и сильнымъ колотьѣмъ въ бокахъ отъ движенія и кашля.

Pulsatilla, — при обильномъ изверженіи черной, сгустившейся крови, со страхомъ, дрожью и чрезвычайной слабостью, въ особенности флегматическимъ и кроткимъ людямъ и при задержаніи регуль.

При очень значительной потерѣ крови, когда угрожаетъ опасность изойти кровью, необходимо дать сперва *Acon.*, а потомъ *Ires.* въ учащенныхъ приѣмахъ.

Когда кровотеченіе обнаруживается вслѣдствіе паденія или наружнаго поврежденія, то *Arn.* предпочитается всѣмъ другимъ средствамъ, въ особенности когда нѣтъ никакой другой болѣзни.

§ VII.

БОЛѢЗНИ ГРУДИ.

1. ВОСПАЛЕНІЕ ЛЕГКИХЪ.

Воспаленіе легкихъ часто начинается сильнымъ ознобомъ, за которымъ вскорѣ слѣдуетъ жаръ, давящая или колющая боль при дыханіи и кашлѣ, во всей груди или только на одной сторонѣ; затрудненное, учащенное дыханіе; кашель, вначалѣ сухой, потомъ съ слизистымъ, ржаваго цвѣта или кровянистымъ изверженіемъ; ускоренный, полный пульсъ, головокруженіе или головная боль, жажда, красная моча, чрезвычайная слабость и потребность лежать на спинѣ. Впрочемъ, не всѣ эти припадки необходимо обнаруживаются при воспаленіи легкихъ: нѣкоторые изъ нихъ могутъ быть очень слабы, нѣкоторыхъ можетъ и совсѣмъ не быть, такъ что только физическое изслѣдованіе, посредствомъ выслушиванія груди, можетъ повести къ точному опредѣленію болѣзни. Признаками начинающагося воспаленія легкихъ служатъ: затрудненное движеніе грудной клѣтки надъ воспаленнымъ мѣстомъ; короткій, глухой, тимпаническій звукъ при постукиваніи; скрипучее, свистящее и шумное дыханіе при выслушиваніи.

Въ большей части случаевъ для начала самое приличное средство *Aconit.*, котораго иногда достаточно и для уничтоженія всей болѣзни. *Aconit.* всегда показанъ, если есть сильный жаръ послѣ озноба, съ сухою, жгучею кожею, скорымъ, твердымъ пульсомъ и багровымъ цвѣтомъ лица; ускоренное, затрудненное, неполное дыханіе съ безпокойствомъ, страхомъ и біеніемъ сердца; колющее въ груди при глубокомъ вдыханіи и движеніи или глухое давленіе и тяжесть на груди; сухой, рѣзкій кашель съ вязкимъ, слизистымъ или кровянистымъ или ржавымъ изверженіемъ; потребность лежать на спинѣ; тяжесть и боль въ головѣ, жажда, красная моча въ небольшомъ количествѣ и ожесточеніе всѣхъ припадковъ подъ-вечеръ. Приемы слѣдуетъ повторять черезъ 3—4 часа.

Когда воспаленіе не слишкомъ значительно, но поражена въ особенности подреберная плева, то хорошо дѣйствуетъ *Bry.*, на которую указываетъ сильная, колючая боль въ груди, ожесточающаяся отъ всякаго движенія; раздраженіе мозга нервныя припадки, головная боль, безпокойство, легкій бредъ и спячка. *Bryonia* большею частію бываетъ прилична тогда, когда *Aconit.* уже укротилъ первую бурю; впрочемъ, она можетъ быть дана и съ самаго начала, если раздраженіе кровеносной системы не очень сильно и въ особенности, когда боль въ груди колющая, усиливаемая движеніемъ и когда есть безпокойство, легкій бредъ и дремота.

Когда признаки раздраженія мозга очень сильны и сопровождаются бѣшеннымъ бѣдромъ или совершенною спячкою съ краснымъ, вздутымъ лицомъ, налитыми и неподвижными глазами, жгучимъ сухимъ жаромъ и сильною жаждой, то приличнѣе бываетъ *Bell.*, въ особенности если эти припадки обнаруживаются въ самомъ началѣ болѣзни.

Tartarus emeticus соотвѣтствуетъ тѣмъ воспаленіямъ легкихъ, въ которыхъ мало или вовсе нѣтъ колючей боли, но зато тѣмъ сильнѣе стѣсненіе груди и затрудненіе дыханія; при мокротной хрипотѣ и кашлѣ съ значительнымъ изверженіемъ и когда эта мокрота мало или вовсе не содержитъ въ себѣ крови, а состоитъ болѣе изъ слизи и пѣны; когда ощущается сильное жженіе и садно въ верхней части груди и горла, вздутіе и чувствительность въ верхней части живота и темнокоричневая мутная моча. Въ особенности *Tart-emet.* превосходное средство въ тѣхъ случаяхъ, когда къ воспаленію легкихъ присоединяется отекъ свободныхъ отъ воспаленія частей легкаго или когда угрожаетъ параличъ легкихъ. Это чрезвычайно опасное состояніе узнается по накопленію множества мокроты въ дыхательныхъ вѣтвяхъ, по чрезвычайному затрудненію дыханія, страху задохнуться; громкой хрипотѣ въ груди и багровому цвѣту лица.

Когда во второй и третьей степени воспаленія появляются такъ называемые нервные припадки,

хватаніе руками (*caprologia*), бредъ, невольное испражненіе, быстрый упадокъ силъ, холодный, липкій потъ, слабый, скорый пульсъ, осунувшееся лицо, губы и языкъ сухіе, безъ жажды и т. д., то нужно употребить *Phosph.* Это средство въ особенности прилично во всѣхъ тифозныхъ, туберкулезныхъ и разслабленіемъ сопровождающихся воспаленіяхъ легкихъ и старикамъ. Особенная ржавого цвѣта мокрота также служитъ указаніемъ на *Phosph.*

Главныя средства для устраненія произведеннаго воспаленіемъ выпота или для предупрежденія оплотнѣнія его *Sulph.* Поэтому, когда по устраненіи первыхъ бурныхъ припадковъ болѣзни, лихорадка снова усиливается и физическое изслѣдованіе открываетъ опечененіе или экссудатъ, то отъ *Sulph.* можно ожидать очень много хорошаго, въ особенности у людей золотушныхъ и туберкулезныхъ.

Противъ воспаленія легкихъ вслѣдствіе механическихъ поврежденій или ранъ, первое средство *Arn.*, въ особенности, когда много отхаркивается крови.

Въ послѣднее время при сильномъ воспаленіи въ трудныхъ случаяхъ, при крупозномъ воспаленіи, было рекомендовано употреблять тотчасъ-же *Jod* или *Kali-jod.* или *Brom.*, въ 1-мъ развед. *Jod.* также для уничтоженія выпота и опечененія. Кромѣ того, однако рѣже, можетъ потребоваться *Arsen.* въ воспаленіи легкихъ при тифѣ, съ упадкомъ силъ, пролежнями и угрожающемъ антоно-

вомъ огнѣ въ легкихъ. Въ послѣднемъ случаѣ рекомендуются также *China*, *Kreos.*, *Camph.* и *Carbo-veg.* Въ видѣ вспомогательнаго средства, при жгуче-колючей боли и обильномъ потѣ бываетъ показанъ *Merc.* При общей слабости, въ тифѣ, съ разложеніемъ крови и выпотомъ—*Rhus.*

2. ВОСПАЛЕНИЕ ПОДРЕБЕРНОЙ ПЛЕВЫ.

При всякомъ воспаленіи легкихъ страдаетъ также и ближайшая часть подреберной плевры или плевры, отчего и происходитъ колючая боль. Иногда, однакожъ бываетъ воспалена только плевра, а мякоть легкаго очень мало или вовсе не принимаетъ участія въ страданіи. Здѣсь идетъ рѣчь о послѣдней болѣзни. Воспаленіе плевры отличается отъ воспаленія легкихъ тѣмъ, что колючія и давящія боли бываютъ гораздо сильнѣе, и чрезвычайно затрудняютъ дыханіе и всякое движеніе; кашля часто вовсе не бываетъ или бываетъ незначительный, сухой; не бываетъ также ни ржавой мокроты, ни крови.

Въ первой степени воспаленія плевры, т. е. тогда, когда нѣтъ еще экссудата, лучшія средства: *Acon.* и *Bry.*, которыя нерѣдко совершенно уничтожаютъ болѣзнь и предупреждаютъ экссудатъ. *Acon.* слѣдуетъ употребить, когда лихорадочный жаръ, затрудненіе дыханія и страхъ очень сильны.

Bry., когда *Acon.* эти припадки отчасти уничтожилъ, но остается еще значительная колючая боль. Когда лихорадочныя явленія съ самаго начала незначительны, то лучше тотчасъ же употребить *Bry.*

Въ очень трудныхъ случаяхъ, когда *Bry.* не дѣйствуетъ, слѣдуетъ обратиться къ *Tart-emet.* или къ *Kali-hydrjod.*

Когда экссудатъ уже образовался, то послѣ *Bry.* лучшее средство *Sulph.* или *Нер-с.* Боль и лихорадка въ это время обыкновенно исчезаютъ, но дыханіе чрезвычайно затруднено, сухой кашель очень силенъ, невозможно лежать на здоровой сторонѣ, сердце бьется, ноги пухнуть и нерѣдко являются даже такъ называемые нервные припадки. *Sulph.* противъ всего этого прекрасное средство: ускоряетъ всасываніе экссудата и предупреждаетъ сращеніе, отвердѣніе легкаго, искривленіе груди и прочія опасныя послѣдствія.

Когда воспаленіе есть слѣдствіе механическаго поврежденія, то лучшее средство *Arn.*; она же прилична и въ тѣхъ случаяхъ, когда болѣзнь заключается въ грудныхъ и реберныхъ мускулахъ, при такъ называемомъ ложномъ колотьѣ въ боку, которое узнается частію по быстрому перемѣщенію боли и незначительности лихорадки, а въ особенности по усиленію боли отъ прикосновенія.

3. ВОСПАЛЕНІЕ СЕРДЦА.

Воспаленіе сердца рѣдко является какъ самостоятельная болѣзнь, а происходитъ большею частію вслѣдствіе воспаленія легкихъ или подреберной плевры и въ этомъ случаѣ большею частію въ видѣ воспаленія околосердечной сумки (pericarditis), или же въ особенности вслѣдствіе остраго ревматизма. Въ точности опредѣлить эту болѣзнь возможно только съ помощью стетоскопа и плессиметра. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ она, однако жъ обнаруживается усиленнымъ лихорадочнымъ бѣніемъ сердца, страхомъ и болью отъ прикосновенія къ груди около сердца. Въ началѣ почти всегда нуженъ *Acon.*; потомъ полезны бываютъ: *Spig.*, *Colchic.*, *Bell.*, *Veratr.*, *Puls.* и пр. (ср. ст. *Одышка*).

4. СЕРДЦЕБІЕНІЕ.

Большая часть случаевъ сердцебіенія есть только симптомъ другой болѣзни и въ особенности органическихъ болѣзней сердца, потому и вылечить его отдѣльно невозможно, по крайней мѣрѣ при леченіи нельзя ограничиваться однимъ этимъ указаніемъ, а должно обратить вниманіе на главную болѣзнь. Тѣмъ не менѣе однакожъ удастся въ хроническихъ болѣзняхъ или еще лучше въ

тѣхъ, которыя произошли отъ неважныхъ случайныхъ причинъ, найти соотвѣтствующее средство, уничтожающее припадки или по-крайней-мѣрѣ доставляющее значительное облегченіе.

Когда сердцебіеніе происходитъ отъ досады, то лучшія средства: *Acon.* и потомъ *Cham.*

Отъ испуга: *Op.* или *Coff.*

— страху: *Veratr.*

— огорченія: *Ign.*

— неожиданной радости: *Acon.* или *Coff.*

— кофе или другихъ горячительныхъ напитковъ: *Nux-vom.*

— полнокровія у молодыхъ людей: *Acon.* и потомъ *Nux-vom.*

— слабости у женщинъ, страждущихъ блѣдною немочью, заблѣвшихъ: *Ferr.* и *Puls.*

У нервныхъ и истерическихъ женщинъ: *Asa-foot.*, *Cham.*, *Nux-vomica* или *Platina.*

Вслѣдствіе изнурительной болѣзни, потери крови или соковъ, кормленія грудью и т. д. *Chin.*, *Ferr.* или *Phosph.-ac.*

Belladonna прилична, когда біеніе сердца отдается въ головѣ, ощущается біеніе въ шеѣ и въ головѣ, лицо красно, голова кружится, въ глазахъ темнѣетъ; отъ движенія хуже.

Arsenicum, когда припадки являются ночью, сопровождаются несноснымъ безпокойствомъ, затрудненіемъ дыханія и принуждаютъ подниматься или наклоняться.

Natrum muriaticum: при неправильномъ прерывистомъ біеніи пульса, трепещущемъ біеніи сердца, которое отъ малѣйшаго движенія усиливается, въ особенности послѣ обѣда, а отъ нажиманія улучшается.

Digitalis: при сильномъ біеніи сердца, со страхомъ и судорожною болью въ срединѣ груди и иногда очень медленномъ лѣнивомъ біеніи пульса.

Veratrum: при ночныхъ припадкахъ, со страхомъ смерти, холоднымъ потомъ и холодомъ конечностей и когда лежа лучше, чѣмъ во время движенія.

Spigelia: особенно при органическихъ страданіяхъ сердца и при ревматизмѣ суставовъ; при волнообразномъ, дрожащемъ, дурномъ сердцебіеніи; при колотѣхъ, ощущеніи тяжести и шуршеніи въ области сердца.

Cactus grandiflorus въ послѣднее время также рекомендованъ многими практиками противъ сердцебіенія вслѣдствіе органическихъ страданій и ревматизма.

5. ОДЫШКА И СПАЗМЫ ВЪ ГРУДИ.

Эти припадки, имѣющіе большею частію перемежающійся характеръ, составляютъ также принадлежность другихъ болѣзней и, слѣдовательно, радикальное уничтоженіе ихъ возможно только подъ условіемъ уничтоженія главной болѣзни.

Лучшія палъятивныя средства противъ нихъ: *Ars.*, *Ipec.*, *Bell.*, *Veratr.*, *Coff.*, *Nux-v.* и *Puls.*

Arsenicum очень важное средство въ большей части случаевъ хронической одышки, особенно противъ припадковъ удушья, со страхомъ смерти по ночамъ, стягиванія груди и горла, сильнаго біенія сердца, потребности сѣсть въ постели или наклониться впередъ, при улучшеніи послѣ отхаркиванья мокроты, при опухоли ногъ и большой слабости.

Ipecacuana соотвѣтствуетъ преимущественно мгновеннымъ ночнымъ припадкамъ судорогъ въ груди съ затягиваніемъ гортани, хрипѣніемъ мокроты въ груди, судорожнымъ кашлемъ, багровою краснотой и жаромъ, попеременно съ блѣдностью и холодомъ въ лицѣ, ускореннымъ, стономъ дыханія и окоченѣніи всего тѣла.

Belladonna при стѣсненіи груди и недостаткѣ воздуха, при усиленіи страданія отъ движенія, при постоянномъ безпокойствѣ, затягиваніи и боли въ гортани, біеніи въ груди, короткомъ и скоромъ или то короткомъ, то медленномъ вдыханіи и сухомъ судорожномъ кашлѣ.

Veratrum при опасности задохнуться, тошнотѣ, рвотѣ, страхѣ смерти, холодномъ потѣ, общемъ холодѣніи тѣла, глухомъ кашлѣ и улучшеніи въ спокойномъ положеніи.

Coffea людямъ очень раздражительнымъ, послѣ душевныхъ волненій, при короткомъ, затруднительномъ дыханіи, страхѣ, безпокойствѣ, жарѣ,

сильной испаринѣ и плаксивости (часто бываетъ полезно давать попеременно съ *Aconit*).

Nux-vomica при безпокойномъ, судорожномъ стѣсненіи груди, въ особенности ночью, рано утромъ или послѣ обѣда, съ несноснымъ пученьемъ или полнотою въ желудкѣ, отрыжкою, біеніемъ сердца, отрывистымъ кашлемъ и облегченіемъ отъ лежанія на спинѣ.

Pulsatilla при задержаніи дыханія, какъ-бы отъ сѣрныхъ паровъ; страхѣ задохнуться, въ особенности ночью и вечеромъ, въ лежащемъ положеніи съ біеніемъ сердца, головокруженіемъ и обильнымъ изверженіемъ мокроты.

Противъ одышечы съ приливомъ крови въ особенности полезны: *Acon.*, *Bellad.*, *Nux-vom.*, *Phos.*, *Sulph.*

При разстройствѣ или задержаніи регуль: *Bell.*, *Coccul.*, *Pulsat.*

— спираіи вѣтровъ: *Cham.*, *Chin.*, *Nux-v.*, *Phosph.*, *Veratr.*

— накопленіи мокроты въ груди: *Ars.*, *Bryon.*, *Cupr.*, *Ferr.*, *Phos.*, *Puls.*, *Tart.-emet.*

Противъ одышки вслѣдствіе попавшей въ горло пыли: *Ars.*, *Нер.-sulph.*, *Ipec.*

Вслѣдствіе душевныхъ волненій: *Acon.*, *Cham.*, *Coff.*, *Ign.*, *Nux-vom.*, *Veratrum.*

6. СУДОРОГИ ВЪ ГРУДИ У ДѢТЕЙ, МИЛЛАРОВА ОДЫШКА.

Эта болѣзнь встрѣчается у дѣтей и часто бываетъ очень похожа на крупъ; отличается же отъ него преимущественно тѣмъ, что не имѣетъ признаковъ воспаленія, ибо состоитъ въ судорожномъ сжатіи гортанной щели. Въ промежуткахъ между припадками она не оставляетъ никакихъ признаковъ болѣзни и самые припадки появляются безъ всякихъ предвѣстниковъ. Ребенокъ болѣею частію пробуждается отъ совершенно спокойнаго сна съ полною удушающею судорогою и съ ощущеніемъ затягиванія въ верхней части груди, безъ всякаго кашля, безъ хрипоты и безъ боли въ горлѣ, а на утро не остается никакого признака болѣзни; на слѣдующую-же ночь повторяется совершенно такой же припадокъ и еще сильнѣе. Припадки эти бываютъ такъ сильны, что могутъ причинить смерть, если не будутъ устранены приличнымъ леченіемъ.

Средства противъ этой болѣзни: *Sambucus*, *Ipecacuanha* и *Moschus*.

Ipecacuanha показана, когда одышка сопровождается давленіемъ и напираніемъ воздуха изъ груди къ гортани, какъ будто-бы выталкивая засѣвшее въ ней инородное тѣло или какъ-будто гортань затянута; когда выдыханіе сопровождается кряхтящими звуками, а вдыханіе свободно;

когда выступает холодный потъ, лицо осунулось, выражаетъ страхъ и когда есть частое побужденіе на мочу съ испущеніемъ малаго количества блѣдной мочи.

Sambucus показанъ, когда судорога пробуждаетъ ночью, когда очень мало или вовсе нѣтъ кашля, есть общій сухой жаръ безъ жажды, багровое, вздутое лицо, посинѣлыя руки, метанье руками, мелкій перемежающійся пульсъ и очень ускоренное свистящее дыханіе.

Moschus, когда въ гортани есть ощущение, какъ-будто туда проникъ сѣрный паръ и затягиваетъ горло; когда въ рукахъ и ногахъ есть судорожныя движенія и подергиванья или во всемъ тѣлѣ судорожное окочененіе.

7. ВОСПАЛЕНІЕ ГРУДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ЖЕНЩИНЪ, ГРУДНИЦА.

Когда это воспаленіе происходитъ вслѣдствіе помятія или инаго механическаго поврежденія, то лучшія средства: *Acon.* и *Con.*, а при сильной рожистой краснотѣ: *Belladonna*.

Когда воспаленіе груди обнаруживается тотчасъ послѣ родовъ или послѣ отнятія отъ груди ребенка, вслѣдствіе сильнаго притока молока, то въ началѣ лучшее средство *Bryon.*, въ особенности когда груди очень крѣпки, налиты и болятъ. Когда

есть уже рожевидная краснота и колючая стрѣляющая боль, простирающаяся подѣ мышкы и въ плечи, то помогаетъ *Bellad.* Когда на покраснѣвшихъ, твердыхъ грудяхъ образовались мягкія, зыбкія мѣста, угрожающія нарывами, то иногда *Phosph.* разрѣшаетъ нагноеніе или ускоряетъ вскрытіе. Когда нарывы уже вскрылись и образуютъ фистулы съ твердыми завороченными краями, то хорошо дѣйствуютъ *Hep.* и *Merc.*, а въ упорныхъ случаяхъ *Silic.* Когда во время нагноенія является ознобъ, обильный потъ, чрезвычайное ослабленіе всего тѣла и нервное раздраженіе, то нужно употребить *Chin.*

Когда послѣ кормленія или послѣ воспаленія въ грудяхъ остаются твердыя болящія мѣста, то можно употребить: *Con.*, *Carb.-anim.* или *Silic.*, также *Lycor.*, *Graphit* и *Sulph.* Отъ небольшихъ опухолей въ грудяхъ, часто встрѣчающихся у дѣвицъ, хорошо помогаетъ *Clematis.*

8. БОЛЯЩІЕ СОСКИ.

Это чрезвычайно непріятное и часто препятствующее кормленію страданіе часто можно предупредить, начавъ за нѣсколько времени до родовъ обмывать соски холодною водою съ *tinct. Arn.* Это же средство можно употреблять и во время самаго кормленія, наблюдая, чтобы передъ каждою подачею груди ребенку соски каждый

разъ были предварительно обмыты холодною водою. Сверхъ того полезно принимать *Arn.* внутрь. Въ упорныхъ случаяхъ могутъ быть полезны *Sulph.* и *Rhus.*

Отъ всякихъ вяжущихъ примочекъ и металлическихъ мазей, благоразумная мать должна воздержаться, потому что подобныя средства могутъ только причинить вредъ ребенку. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ полезно бываетъ болящія мѣста покрывать *коллодіемъ* съ надлежащею осторожностію разумѣется, чтобы не заклеить млечныхъ протоковъ, то есть всего соска за-разъ замазывать не слѣдуетъ.

9. ВОСПАЛЕНІЕ ГРУДОБРЮШНОЙ ПРЕГРАДЫ.

Воспаленіе грудобрюшной преграды большею частію бываетъ послѣдовательнымъ, переходящимъ отъ воспаленія подреберной плевы, легкихъ, желудка, печени, селезенки и т. д., а также можетъ произойти отъ ревматизма, паденія, ушиба или пораненія. Оно выражается обыкновенно болью при вдыханіи, чиханіи и кашлѣ въ области нижнихъ реберъ, надъ желудкомъ или въ среднихъ спинныхъ позвонкахъ. Отъ этого короткое, только сидя возможное дыханіе, ощущеніе обруча вокругъ груди, икота, дерганье въ лицевыхъ мускулахъ и симптомы воспаленія легкихъ, желудка (рвота) и

печени (желтуха). Въ началѣ, при сильномъ жарѣ, одышкѣ, кашлѣ и боли подъ ложечкой *Aconit.* Главное средство *Bryon.*, въ особенности при связи съ воспаленіемъ сосѣднихъ органовъ, подреберной плевы, печени и т. д. При преобладаніи судорожныхъ явленій, дерганья, икоты, рвоты и безпокойствъ *Chamom.* Въ ревматическихъ и болѣе хроническихъ формахъ, послѣ простуды; при давящей, напрягающей боли, періодически усиливающейся *Colchicum.* Въ высшихъ степеняхъ развитія болѣзни *Merc.* и *Ars.*

§ VIII.

БОЛѢЗНИ ЖЕЛУДКА.

1. СЛАБОСТЬ ЖЕЛУДКА, НЕСВАРЕНІЕ, КАТАРРЪ ЖЕЛУДКА.

Вслѣдствіе продолжительныхъ погрѣшеній противъ діеты, обремененія желудка трудноваримою пищею или большими количествами вредныхъ лекарственныхъ веществъ, а иногда и отъ органическихъ страданій сердца, печени и легкихъ, въ слизистой оболочкѣ желудка образуется хроническій катарръ, отъ котораго происходитъ несвареніе, недостатокъ аппетита, отрыжка, пученье, тош-

нота, изжога, рвота, боль въ желудкѣ и т. д. Въ этихъ страданіяхъ прежде всего, разумѣется, необходима соотвѣтствующая діета и устраненіе вредящихъ причинъ. Важнѣйшія же средства: *Nux-vom.*, *Phosph.*, *Puls.*, *Bry.*, *Hep.*, *Calc.*, *Tart.-emet.*, *Chin.*, *Ipec.*, *Cham.*

Nux-vomica: пьющимъ вино или кофе, ведущимъ сидячую жизнь, геморроидалистамъ; при полнотѣ и вздутіи желудка послѣ ѣды, отрыжкѣ, изжогѣ, обложеніи языка, кисломъ или горькомъ вкусѣ во рту, недостаточныхъ или слишкомъ твердыхъ испражненіяхъ, боли въ желудкѣ, тяжести въ головѣ и головной боли, головокруженіи, страданіи отъ умственныхъ занятій и угрюмомъ, сварливомъ расположеніи духа.

Phosphor при страданіи послѣ пищи, пученіи, жарѣ, приливѣ въ голову, біеніи сердца, пустой и прерывающейся отрыжкѣ, отрыжкѣ жидкостью, изжогѣ, тошнотѣ, боли въ желудкѣ.

Pulsatilla въ особенности послѣ разстройства желудка жирною, пучащею пищею, при густомъ обложеніи языка, слизистомъ или горькомъ вкусѣ во рту, отрыжкѣ желчью или кислотой изъ желудка, отвращеніи отъ пищи, особенно теплой, поносистыхъ испражненіяхъ, зябкости и отсутствіи жажды.

Bryonia при давленіи и чувствительности подъ ложечкой, ознобѣ, жаждѣ, сухости во рту и въ горлѣ, желтомъ обложеніи языка или пузырькахъ на языкѣ и при запорѣ.

Hepar при частыхъ разстройствахъ желудка, несмотря на правильную діету; гадкой или гнилой отрыжкѣ, тошнотѣ по утрамъ, рвотѣ слизью, желчью или кислотой, накопленіи слюны во рту и мокроты въ горлѣ и при позывѣ на кислыя и острыя вещи.

Calcareae, когда много кислоты во рту и въ желудкѣ, изжога, водянистое слюнотеченіе, отвращеніе отъ мяса и вареной пищи, жадный голодъ, пученье и чувствительность желудка.

Tartarus emeticus при промозглой отрыжкѣ, при отрыжкѣ кислой или острой жидкостью, накопленіи слизи, тошнотѣ, слизистой рвотѣ, спираіи вѣтровъ, рѣзи и поносѣ.

China при постоянномъ ощущеніи сытости, давленіи отъ всякой пищи въ желудкѣ, отрыжкѣ или рвотѣ несвареною пищею, сильномъ пученіи отъ вѣтровъ, позывѣ на кислое и острое; при общемъ ощущеніи нездоровья, тяжести, сонливости, мрачности, потребности лежать послѣ обѣда, безпокойномъ снѣ ночью, когда моча темная, мутная, цвѣтъ лица желтый, сѣроватый.

Chamomilla при постоянно горькомъ вкусѣ во рту, отрыжкѣ желчью, рвотѣ зеленую, горькою мокротой, жарѣ и боли въ головѣ, красномъ лицѣ, жженіи въ глазахъ, безпокойномъ снѣ и большой раздражительности.

Tricasianha при отвращеніи отъ пищи и табаку, тошнотѣ, рвотѣ и поносѣ съ рѣзью.

2. РАЗСТРОЙСТВО ЖЕЛУДКА.

Когда при существующей уже слабости желудка и худомъ пищевареніи страданіе усиливается отъ ошибки въ діетѣ, отъ трудносваримой или несоотвѣтствующей пищи, то обыкновенно достаточно бываетъ въ предъидущей статьѣ указанныхъ средствъ. Когда же разстройство произошло безъ предварительныхъ признаковъ слабости или болѣзни, и когда до того пищевареніе было правильное, то нужно обратить вниманіе на слѣдующія обстоятельства.

Если желудокъ просто **обремененъ** большимъ количествомъ пищи, впрочемъ не вредной, то достаточно бываетъ выпить нѣсколько глотковъ *чернаго кофе* и, если потомъ еще остается какое-нибудь страданіе, можно принять *Ipec.* При судорожной боли въ желудкѣ *Antim.*

Если страданіе происходитъ отъ неумѣреннаго употребленія **вина** или спиртныхъ напитковъ, то дать *Nux-vom.* и потомъ *Carbo-veg.*

Обремененіе желудка **пирожнымъ**, пряниками и тому подобнымъ у дѣтей скорѣе всего уничтожается посредствомъ *Ipec.* и *Acon.*

Отъ разстройства желудка **жирною** пищею, свининой, саломъ, масломъ, слоенымъ печеньемъ и т. д., главные средства *Puls.* и потомъ чрезъ нѣсколько часовъ *Arsen.*

Отъ разстройства желудка сахаромъ и сластями: *Acon.*

- солью: *Carbo-veg.*, а въ трудныхъ, надолго затянувшихся случаяхъ: *Spirit. nitr. dulc.*
- кислотами: *Acon.* или *Ars.*
- пучащими вещами, капустой: *Bryon.*
- плодами: *Puls.*, *Arsen.*
- гнилыми веществами или подверженными броженію: *China.*
- холоднымъ и льдомъ: *Ars.* и *Puls.*
- водою: *Cocc.*, *Chin.*, *Ferr.*
- молокомъ: *Nux-vom.*, *Bry.*, *Calc.*
- пивомъ: *Bell.*, *Ars.*, *Ferr.*
- водкой: *Nux-vom.*, *Bell.*, *Op.*
- виномъ: *Nux-vom.*, *Carb-veg.*, *Arsen.*
- кофеемъ: *Nux-vom.*, *Chamom.*
- чаемъ: *Coff.*, *Chin.*
- табакомъ: *Nux-vom.*, *Cocc.*

Когда разстройство желудка выражается преимущественно отрыжкой, то бываютъ различны: *Bry.*, *Hep.*, *Nux-vom.*, *Phos.*, *Puls.*, *Tartarus-em.*, *Veratr.*

- отрыжка горькая: *Bry.*, *Nux-v.*, *Puls.*
- гнилая: *Hep.*, *Tart.-emet.*
- кислая: *Phos.*, *Calc.*, *Sulph.-acid.*
- неполная, только побужденіе въ отрыжкѣ: *Cocc.*, *Phosph.*
- съ изверженіемъ пищи: *Bry.*, *Ferr.*, *Ign.*, *Phos.*, *Sulph.* или *Thuja.*

При **изжогахъ**: *Calc.*, *Capsic.*, *Chin.*, *N.-vom.*, *Phosph.*,
Sulph.-ac.

— **изжога у беременныхъ**: *Bell.* или
N.-vom.

Противъ **икоты** главные средства: *Ignat.*, *Cocc.*,
Nux-vomica и *Hyoscyamus*. Маленькимъ дѣ-
тямъ въ особенности *Ignat.*

3. ТОШНОТА И РВОТА.

И тошнота и рвота очень часто бываютъ толь-
ко сопровождающими припадками другихъ болѣз-
ней и потому здѣсь могутъ быть разсматриваемы
только въ той мѣрѣ, въ какой обнаруживаются
какъ преобладающія или самостоятельныя страда-
нія, такъ что обращаютъ на себя вниманіе пре-
имущественно передъ всѣми прочими. Чаше всего
соотвѣтствующія тошнотѣ и рвотѣ средства: *Ipec.*,
N.-vom., *Puls.*, *Antim.*, *Ars.*, *Phos.*, *Bry.*, *Cham.*,
Veratr., *Bell.*, *Acon.*

Тошнотѣ или рвотѣ вслѣдствіе **обремененія**
желудка соотвѣтствуютъ *Ipecacuanha*, *Pulsatilla*
или *Antimon.*

Вслѣдствіе **спиртныхъ напитковъ**: *N.-vom.*

— **досады**: *Cham.*, *Bry.*, *Nux-v.*

— **испуга**: *Acon.* или *Ignat.*

— **паденія или удара по головѣ**:
Arn.

— **ѣзды или качанья**: *Cocc.* или *Kreos.*

— **кашля**: *Antim.*, *Ferr.*, *Ipec.*, *Veratr.*

При рвотѣ съ мигренью или головной болью въ одной сторонѣ: *Bellad.*, *Nux-vom.*

— глистахъ: *Acon.* или *China.*

Во время беременности: *Nux-vomica*, *Bellad.*, *Ipec.*, *Kreosot.*

У грудныхъ дѣтей: *Ipec.*, *Kreos.*, *Aethus-cynap.*

У пьющихъ: *Carbo-veg.*, *Ars.* или *Lachesis.*

Отъ куренья табаку: *Nux-vomica* или *Veratr.*

При рвотѣ пищею: *Ipec.*, *Antim.*, *Puls.*, *Bry.*, *Ars.*, *Veratr.*

— желчью или горькой зеленой жидкостью: *Bry.*, *Cham.*, *Ipec.*, *Phosph.*, *Veratr.*

— рвотѣ слизью: *Acon.*, *Bell.*, *Ipec.*, *Puls.*, *Tart.-emet.*

— водою: *Ars.*, *Bellad.*, *Caust.*, *Ipec.*, *Sulph.-acid.*

— кислыми веществами: *Calcar.*, *Caust.*, *Phosph.*, *Sulph.-ac.*

— кровью: *Arn.*, *Ars.*, *Acon.*, *Bell.*, *Bryon.*, *Millefol.*, *Nux-vom.*, *Veratr.*, *Ipec.*, *Tart.-emet.*

— темными, черноватыми веществами: *Arsen.*, *Plumb.*, *Veratrum.*

Когда рвота возбуждается или усиливается пищею: *Ars.*, *Ferr.*, *Nux-vom.*, *Puls.*, *Veratr.*

— питьемъ: *Arn.*, *Ars.*, *Phosph.*

- При рвотѣ съ поносомъ: *Ars.*, *Ipec.*, *Veratr.*
 — утромъ на тощакъ: *Kreos.*, *Nux-vom.*
 — ночью: *Ferr.*, *Phosph.*, *Puls.*
-

4. СПАЗМЫ, СУДОРОЖНЫЯ СХВАТКИ И БОЛЬ ЖЕЛУДКА.

Спазмами въ желудкѣ обозначаются часто очень различныя болѣзненныя состоянія, неимѣющія ничего общаго между собою, кромѣ того что причиняютъ боль въ желудкѣ и болѣе или менѣе сопровождаются затрудненнымъ пищевареніемъ. Спазмы въ желудкѣ могутъ происходить отъ нарыва, отвердѣнія, рака, и т. д., то есть отъ болѣзней, которыхъ точное опредѣленіе и ученому врачу представляетъ много трудностей, и которыя, стало-быть, не могутъ быть разсмотрѣны въ домашнемъ лечебникѣ. Что касается до спазмовъ болѣе легкаго свойства, то они часто очень легко поддаются соотвѣтственно припадкамъ выбраннымъ средствамъ и безъ точнаго опредѣленія болѣзни, отъ которой происходятъ.

Одно изъ лучшихъ средствъ противъ подобныхъ страданій *Nux-vom.*, особенно противъ спазмовъ, которые обнаруживаются чрезъ нѣсколько времени послѣ принятія пищи и состоятъ въ стягивающей, какъ-бы когтями схватывающей боли, со вздутіемъ живота, стѣсненіемъ въ подреберьяхъ, какъ отъ

перевязки или пояса, съ отрыжкой, голодомъ, накопленіемъ слюны, изжогой, пученьемъ отъ вѣтровъ, запоромъ; при угрюмомъ и сварливомъ расположеніи духа, тяжести въ головѣ и общемъ раздраженіи чувствительности. Особенно прилично это средство пьющимъ кофе и вино, курящимъ много табаку, ведущимъ сидячую жизнь, занятымъ усиленно умственною работою и страждущимъ геморроемъ, у которыхъ всего чаще и случаются спазмы въ желудкѣ. Близко сродственны этому главному средству: *Bry.*, *Cham.*, *Coccul.*

Bryonia предпочитается, когда въ желудкѣ давить какъ камень тотчасъ послѣ пищи; отъ движенія хуже, отъ лежанья и отрыжки легче и когда есть горькій вкусъ во рту, позывъ на рвоту и запоръ.

Chamomilla—когда боль отъ скорчиванія облегчается, ночью усиливается и сопровождается тоской, безпокойствомъ, затрудненіемъ дыханія и когда больше есть расположенія къ поносу чѣмъ къ запору.

Cocculus — при схватывающей, ущемляющей боли въ желудкѣ и въ нижней части живота; при припадкахъ тошноты съ слабостью, дурнотою и головокруженіемъ и при чрезвычайномъ уныніи и тихой хандрѣ.

Phosphor также весьма важное средство при давящей или жгучей боли въ желудкѣ, въ особенности послѣ пищи, съ пученіемъ живота, отрыжкой, тошнотою; съ жженіемъ и жаромъ въ же-

лудкѣ, восходящими до рта, или попеременно съ ощущеніемъ холода и боли при глотаніи.

Bismuthum соотвѣтствуетъ въ особенности судорожной боли, вонючей отрыжкѣ, давящимъ позывамъ на рвоту, бурчанію и коликѣ въ животѣ.

Carbo-vegetabilis — когда боль больше жгучая или стягивающая; при изжогѣ, отвращеніи отъ пищи; когда боль является послѣ пучащей пищи и когда по временамъ случается рвота кровью.

Belladonna — когда желудокъ очень чувствителенъ къ прикосновенію, боль проходитъ насквозь въ спину, но пищевареніе не очень неисправно, и когда у женщинъ въ то же время разстроены регулы.

Pulsatilla — дѣвушкамъ, страдающимъ блѣдною немочью, и вообще людямъ сыраго и вялаго сложенія, особенно когда боль желудка сопровождается ознобомъ, холодомъ конечностей, отсутствіемъ жажды, расположеніемъ къ поносу, побужденіемъ на рвоту и рвотою пищей.

China — людямъ ослабѣвшимъ, истощеннымъ рвотою, поносомъ, потомъ или кровопусканіемъ, или когда боль въ желудкѣ обнаруживается послѣ продолжительнаго кормленія грудью и сопровождается слабымъ пищевареніемъ, давленіемъ послѣ пищи, пученьемъ, накопленіемъ вѣтровъ, желтымъ или сѣрымъ землистымъ цвѣтомъ кожи и при улучшеніи отъ движенія.

Arsenicum также весьма хорошее средство противъ судорожныхъ болей въ желудкѣ, когда все

тѣло ослабѣваетъ, упадокъ силъ очень значителенъ; боль несносно жгучая сопровождается невыразимою тоскою, безпокойствомъ, чрезвычайною сухостью во рту, жаждой, изжогой, расположеніемъ ко рвотѣ, рвотою пищей или слизистыми, желчными и темными или кровянистыми веществами и при поносѣ.

Когда при проглатываніи пищи ощущается боль въ пищепріемномъ горлѣ, глубоко внизу, что случается при страданіяхъ верхняго устья желудка (*cardia*), то въ особенности бываютъ приличны: *Baryta*, *Ignatia* или *Phosphor*. Когда же тотчасъ послѣ принятія пищи боли уменьшаются или и совсѣмъ на время проходятъ то нерѣдко помогаетъ *Chelidonium*.

При чисто нервныхъ боляхъ желудка соотвѣтствуютъ въ особенности: *Bismuth.*, *Cham.*, *Coccul.*, *Ignat.*, *Staphysagr*.

При боли отъ прилива крови: *Bell.*, *Nux-vom.*, *Carbo-veg.*, *Sep.*, *Sulph*.

При органическихъ разстройствахъ: *Argent-nitr.*, *Arsen.*, *Lycop.*, *Phosph.*, *Sulph.*, *China*, *Conium*.

§ IX.

БОЛѢЗНИ ЖИВОТА.

I. ВОСПАЛЕНІЯ.

Въ животѣ могутъ случиться воспаленія въ *брюшинѣ*, или оболочкѣ, одѣвающей всю внутреннюю поверхность живота, и въ слизистой оболочкѣ *кишекъ*. Воспаленіе узнается по чрезвычайно сильной, постоянной боли, ограниченной часто на небольшомъ пространствѣ и ожесточающейся отъ всякаго движенія и прикосновенія, отъ дыханія, отъ кашля и даже часто отъ одного гнета одѣяла. Оно сопровождается болѣе или менѣе сильною лихорадкой, безпокойствомъ, страхомъ, вздутиемъ живота, отрыжкой, тошнотой и большею частью запоромъ. Только при воспаленіи слизистой оболочки *кишекъ* обыкновенно бываетъ поносъ.

Эта болѣзнь, если не скоро разрѣшится, тѣмъ опасна, что производитъ значительную массу экссудата (выпотѣнія, соченія жидкости изъ воспаленныхъ частей), который, изливаясь въ полость живота, можетъ причинить сращеніе, сплетеніе *кишекъ*, прободѣніе ихъ стѣнокъ и антоновъ огонь; словомъ, это одна изъ тѣхъ болѣзней, въ кото-

рыхъ необходимо дѣйствовать самымъ рѣшительнымъ образомъ и въ которыхъ всякое замедленіе и всякій промахъ неминуемо гибеленъ, и вмѣстѣ одна изъ тѣхъ, въ которыхъ является торжество гомеопатіи.

Главное средство въ первой степени болѣзни: *Acon.* низкихъ разведеній (3) и въ частыхъ приѣмахъ. Пока продолжается развитіе воспалительнаго процесса, съ постоянною, терзающею, рѣжущею, колючею болью, которая отъ прикосновенія чрезвычайно ожесточается, и съ общимъ сухимъ жаромъ и ускореннымъ пульсомъ, нужно продолжать давать *Aconit.* Когда жаръ и колючая боль уменьшатся и останется ощущеніе стягиванія или распиранія, припадками въ родѣ колики, то нужно дать *Bellad.* Послѣднее средство бываетъ прилично и въ самомъ началѣ болѣзни, если при общемъ жарѣ боли имѣютъ сказанный характеръ и еще не установились въ ограниченномъ мѣстѣ, а проявляются то въ той, то въ другой части.

Когда боль колючая, остро или тупо давящая, въ особенности отъ внѣшняго прикосновенія, жаръ незначителенъ или послѣ *Acon.* унялся, то прилично бываетъ *Bryonia.* Но въ особенности это средство необходимо, когда уже есть экссудатъ. Тогда оно дается въ сильныхъ и частыхъ приѣмахъ до окончательнаго всосанія экссудата. Присутствіе экссудата узнается посредствомъ физическаго обслѣдованія (постукиванія) по глухому звуку тѣхъ частей живота, гдѣ онъ образовался.

Когда послѣ *Acon.* и *Bell.*, еще остается мѣстами рѣжущая боль, которая отъ прохожденія вѣтровъ или кала чрезвычайно ожесточается, и вообще когда воспалена больше слизистая оболочка кишекъ, что сопровождается слизистымъ, водянистымъ или кровянистымъ поносомъ, то хорошо дѣйствуетъ *Mercurius-solub.* Это же средство бываетъ прилично, когда болѣзнь затянулась и между слоями брюшины уже отложилось выпотѣніе, хотя и не замѣтно сильныхъ воспалительныхъ явленій.

Этихъ четырехъ средствъ въ большей части случаевъ воспаленія живота совершенно достаточно для быстрого и скорого излеченія, если будутъ во-время и кстати употреблены. Но случаются и постороннія, сопровождающія явленія, которыя требуютъ другихъ средствъ. Такъ при сильномъ страданіи желудка съ болью и вздутіемъ подъ ложечкой, рвотою и страхомъ быстро помогаетъ *Ipecac.*

При упадкѣ силъ, кровавыхъ испражненій, холодѣніи конечностей, блѣдномъ, осунувшемся лицѣ и когда угрожаетъ антоновъ огонь: *Arsen.*

При воспаленіи слизистой оболочки кишекъ съ жгучею, рѣжущею болью, мочерѣзомъ и судорогами въ пузырь *Cantharis.*

При частыхъ непроизвольныхъ испражненіяхъ съ пораженіемъ мозга или съ бредомъ: *Hyoscyamus.*

2. КОЛИКА, РВЪЗЪ ВЪ ЖИВОТЪ.

Послѣ ближайшихъ, чрезвычайно разнообразныхъ причинъ рвѣзи въ особенности необходимо обратить вниманіе на родъ и характеръ припадковъ, потому что только такимъ образомъ можно найти гомеопатическое средство противъ этой разнообразной и часто встрѣчающейся болѣзни.

Изъ обыкновенныхъ причинъ рвѣзи нужно въ особенности принять въ соображеніе слѣдующія:

- Отъ простуды, сырости, скрывшейся испарины: *Cham.*, *Chin.*, *N.-vom.*, *Puls.*
- разстройства желудка трудновари-
мою пищею: *Ipec.*, *N.-vom.*, *Puls.*, *Bell.*,
Antim.-crud., *Bry.*, *Ars.*, *Carb.-v.*, *Chin.*
- огорченія и досады: *Cham.*, *Coloc.*, *Bryon.*
- надсады или тѣлеснаго напряженія:
Arn., *Rhus.*, *Bryon.*
- глистной колики: *Merc.*, *Cina*, *Filix.*
- вѣтровъ: *N.-vom.*, *China*, *Cham.*, *Sulph.*
- геморроидальной колики: *Coloc.*, *N.-vom.*, *Puls.*, *Sulph.*
- колики во время регулъ: *Bell.*, *Coff.*,
N.-vom., *Puls.*, *Cham.*, *Kali-carb.*, *Sep.*
- колики у беременныхъ: *Bell.*, *Bry.*,
Nux-v., *Puls.*, *Sep.*

По роду боли и по сопровождающимъ припадкамъ соотвѣтствуютъ:

Chamomilla—въ особенности дѣтямъ при терзающей, тянущей боли со страхомъ, безпокойствомъ, метаньемъ или бѣганьемъ взадъ и впередъ; при ощущеніи, какъ-будто вѣтры то въ одномъ, то въ другомъ мѣстѣ установятся и хотятъ прорваться; при вздутіи живота, урчаніи съ позывами на низъ или съ малыми слизистыми или водянистыми испражненіями, тошнотою, горькою рвотой; при боли въ поясницѣ, какъ-будто разбита, при переменной краснотѣ и блѣдности лица и синевѣ подъ глазами.

Colocynthis—главное средство противъ чрезвычайно сильной колики; при нестерпимой стягивающей, судорожной боли, особенно когда она является схватками на ограниченномъ мѣстѣ, около пупка; когда колетъ и рѣжетъ какъ ножами; при вздутіи живота или ощущеніи пустоты; при судорогахъ въ икрахъ, страхѣ, безпокойствѣ, отчаяніи, метаньи; при поносѣ и рвотѣ послѣ всякаго приѣма пищи; при ощущеніи послѣ cadaго припадка, какъ-будто въ животѣ все разбито, внутренности разорваны и висятъ на нитяхъ.

Nux-vomica—при давленіи какъ-будто отъ кашля или стягивающей и давящей боли съ напряженіемъ, полнотою, отягощеніемъ отъ одежды, запоромъ или твердыми испражненіями, гнетеніемъ на пузырь и заднепроходную кишку, какъ-будто вѣтры выпираютъ и принуждаютъ корчиться; при стѣсненіи дыханія; при ожесточеніи отъ движенія и облегченія въ спокойномъ положеніи.

Pulsatilla — при колющей и бьющей боли со вздутиемъ и полнотою, урчаніемъ и ощущеніемъ жара въ животѣ, чувствительности къ прикосновенію, общемъ ознобѣ, холодныхъ ногахъ, поносахъ, блѣдности лица, скорченномъ положеніи, ожесточеніи отъ лежанья и сидѣнья, облегченіи отъ движенія.

Belladonna — при щипаніи и терзаніи, какъ-будто кишки отдираются; отъ cadaго движенія хуже; когда подѣ желудкомъ выступаетъ толстый желвакъ и когда боль въ немъ облегчается отъ давленія или скорченія; при судорожномъ стягиваніи около пупка и ощущеніи, какъ-будто внутренности схватываетъ когтями; при жидкихъ слизистыхъ испражненіяхъ; при краснотѣ, вздутости и жарѣ въ лицѣ съ головою болью, вспыльчивостью и раздраженіемъ.

Mercurius — при крутящей, свертывающей боли, твердости живота, необыкновенномъ голодѣ, слюнотеченіи, тошнотѣ, особенно отъ сладкаго, натужномъ позывѣ на низъ и слизистомъ поносѣ.

China — когда животъ вздутъ, какъ барабанъ, давить какъ что-то твердое съ ощущеніемъ холода въ животѣ; кишки внизу живота какъ-будто стягиваетъ; при ожесточеніи по ночамъ.

Colchicum — при спираниіи вѣтровъ, броженіи въ животѣ, чрезвычайномъ вздутіи, ощущеніи какъ-будто внутренности отдираются или какъ-будто поднимаются кверху.

Arsenicum — при нестерпимой жгучей боли со страхомъ, жаждой, рвотой и поносомъ послѣ каждаго приѣма пищи.

Plumbum — при періодически возвращающейся жестокой боли, въ особенности около пупка, съ судорожнымъ стягиваніемъ живота, упорнымъ запоромъ; при твердомъ, неровномъ животѣ съ узловатыми выпуклостями въ разныхъ мѣстахъ; при ощущеніи стягиванія кишекъ; при боли и судорогахъ въ конечностяхъ.

3. ПОНОСЪ.

Поносъ очень часто сопровождается различныя другія болѣзни, какъ на примѣръ тифъ, воспаленіе кишекъ, холеру и проч. и вообще можетъ въ качествѣ припадка являться почти во всякой болѣзни. Здѣсь, разумѣется, идетъ рѣчь только о такихъ родахъ поноса, которые являются, если и не совершенно самостоятельными, такъ по крайней мѣрѣ въ видѣ господствующаго припадка, какъ это бываетъ у дѣтей и вслѣдствіе опредѣленныхъ причинъ, — простуды, порчи желудка, испуга и т. д.

Противъ поноса у дѣтей лучшія средства *Cham.*, *Ipec.*, *Merc.*, *Rheum.*, *Sulph.* и *Calc.*

Chatomilla соотвѣтствуетъ въ особенности желчному или слизистому поносу желтаго или зеленоватаго цвѣта, съ виду похожему на рубленныя яйца, съ урчаніемъ и вздутіемъ живота, щиплю-

щею болью, отсутствіемъ аппетита, обложеніемъ языка, безпокойствомъ, крикомъ, метаніемъ и когда ребенокъ требуетъ, чтобы его постоянно на рукахъ носили.

Ipecacuanha—при желтоватыхъ испражненіяхъ, съ тошнотою и рвотой, слюнотеченіемъ, слабостью, желаніемъ лежать, сонливостью, блѣдностью, синевой подъ глазами, гнетеніемъ и болью въ заднепроходной кишкѣ.

Mercurius—при слизистыхъ, зеленыхъ или кровянистыхъ испражненіяхъ съ болѣзненнымъ побужденіемъ и гнетеніемъ въ заднепроходной кишкѣ, при испражненіяхъ, похожихъ на рубленныя яйца, при саднѣ около задняго прохода, дурномъ запахѣ изо рта, тошнотѣ, ознобѣ, потѣ и когда испражненія учащаются ночью.

Rheum—при испражненіяхъ кисло пахнущихъ, какъ отъ жидкостей, подверженныхъ броженію; при рѣзи, побуждающей притягивать ноги къ животу; при слюнотеченіи, блѣдности и метаніи съ крикомъ.

Sulphur—при надолго затянувшемся или часто возвращающемся поносѣ, слизистыхъ кровянистыхъ испражненіяхъ, острыхъ, объѣдающихъ проходъ, такъ что иногда образуется сыпь, распространяющаяся по всему тѣлу.

Calcareae acetica—важнѣйшее средство противъ затягивающагося поноса безъ боли, слизистаго, у золотушныхъ, при толстомъ животѣ и общей худобѣ, блѣдности и сильномъ аппетитѣ.

Всѣ эти средства могутъ быть употреблены и противъ поноса у взрослыхъ, если припадки соотвѣтствуютъ. Кромѣ того могутъ быть пригодны еще слѣдующія:

Argentum nitricum—при темныхъ, зеленовато-или буро-черныхъ жидкихъ испражненіяхъ, содержащихъ въ себѣ мелкіе слизистые или кожистые клочки и отходящіе съ вѣтрами, отрыжкой, коликою и рвѣзью въ желудкѣ.

Arsenicum—при темныхъ, чрезвычайно вонючихъ испражненіяхъ, особенно по ночамъ или послѣ каждаго приема пищи и питья, съ палящею жаждой, чрезвычайно слабостью, рвотой, страхомъ и съ садномъ около прохода.

Bryonia — при поносѣ лѣтомъ вслѣдствіе простуды, съ зеленоватыми, не очень водянистыми испражнениями, съ сильными натугами и коликою.

China—при быстрыхъ испражненіяхъ, смѣшанныхъ съ непереваренными остатками пищи; при сильной судорожной боли, урчаніи и отрыжкѣ, особенно у истощенныхъ продолжительною болѣзнью или потерей крови и соковъ.

Colchicum—при натужномъ поносѣ съ отхожденіемъ бѣлой, студенистой слизи или крови съ обрывками слизистой оболочки кишекъ, при жестокой боли и вздутіи живота; при задержаніи мочи или отхожденіи очень темной мочи съ давленіемъ и жженіемъ въ мочевомъ каналѣ.

Colocynthis—при быстрыхъ, утомляющихъ испражненіяхъ съ сильною сводящею болью и взду-

тіемъ живота, въ особенности вслѣдствіе досады или гнѣва.

Dulcamara—при водянистыхъ испражненіяхъ безъ значительной боли, особенно лѣтомъ, по ночамъ и вслѣдствіе простуды.

Ferrum—при испражненіяхъ безъ всякой боли, но истощающихъ, водянистыхъ, иногда смѣшанныхъ съ остатками непереваренной пищи и второящихся послѣ принятія пищи и питья.

Phosphori acidum—при продолжительномъ водянистомъ поносѣ съ сильнымъ урчаніемъ въ животѣ и неудержимо отходящихъ вѣтрахъ.

Pulsatilla—при слизистыхъ, бѣловатыхъ или жидкихъ, вонючихъ, переменнаго цвѣта испражненіяхъ вслѣдствіе разстройства желудка, съ горечью во рту, обложеніемъ языка, ознобомъ, тошнотой, рвотой и рѣзью въ животѣ.

Secale cornutum—особенно у маленькихъ дѣтей, при водянистыхъ, желтоватыхъ или зеленоватыхъ испражненіяхъ безъ боли, но очень быстрыхъ, и въ короткое время причиняющихъ значительный упадокъ силъ.

Veratrum—при лѣтнемъ поносѣ со рвотой, безпокойствомъ, страхомъ, холоднымъ потомъ и упадкомъ силъ, особенно послѣ пищи и питья. При **КРОВАВЫХЪ** испражненіяхъ бываютъ полезны въ особенности: *Ars.*, *Ipec.*, *Merc.*, *Sulph.*

— **ВОНЮЧИХЪ, ГНИЛЫХЪ:** *Ars.*, *Carb-v.*, *China.*

- При зеленыхъ желчныхъ: *Cham.*, *Merc.*,
Bry., *Ipec.*, *Puls.*, *Sulph.*
- кисло пахнущихъ: *Calcarea - acetica*,
Rheum.
- острыхъ, разѣдающихъ: *Arsenicum*,
Chamom., *Chin.*, *Ferr.*, *Merc.*, *Puls.*, *Sulph.*,
Veratrum.
- пѣнистыхъ: *Chin.*, *Coloc.*
- слизистыхъ: *Cham.*, *Merc.*, *Puls.*, *Colchic.*
 испражненіяхъ безъ боли: *Calc.-acet.*, *Ferr.*,
Sec.-corn.
- ослабляющихъ: *Ars.*, *Chin.*, *Ipec.*, *Sulph-*
ac., *Sec.-corn.*
- черноватыхъ: *Arsenic.*, *Chin.*, *Ipec.*,
Sulph., *Arg.-nitr.*
- вонючихъ: *Ars.*, *Carb.-v.*, *Chin.*, *Sulph.*,
Calc.
- непереваренныхъ: *Chin.*, *Phos.-ac.*, *Ferr.*
- непроизвольныхъ: *Arsenic.*, *Chin.*, *Phos-*
ac., *Rhus.*, *Veratr.*
- бѣловатыхъ: *Calc.-ac.*, *Colch.*, *Puls.*, *Sulph.*
- поносъ отъ испуга: *Coff.*, *Opium.*
- Отъ досады или гнѣва: *Bry.*, *Chamom.*, *Coloc.*
- холоднаго питья: *Ars.*, *Puls.*
- простуды вообще: *Bry.*, *Dulc.*, *Veratr.*
- сырыхъ овощей: *Ars.*, *Chin.*, *Veratr.*
- молока: *Bry.*, *Sulph.*
- съ натугою: *Merc.*, *Ipec.*, *Caps.*, *Colch.*
Nux-vom.

4. НАТУЖНОЙ КРОВАВЫЙ ПОНОСЪ, ДИСЕНТЕРІЯ.

Дисентерія состоитъ въ воспаленіи слизистой оболочки толстой кишки, начиная отъ той части, которая называется слѣпою кишкой и до прямой или заднепроходной. Она отличается чрезвычайно частыми изверженіями слизистыхъ, кровянистыхъ веществъ съ обрывками плевы (эпителія, или тонкой кожицы съ внутренней поверхности кишекъ) большою частію безъ кала, при сильной натугѣ и рѣзи въ животѣ. Обыкновенно дисентерія сопровождается сильными лихорадочными явленіями. Она обнаруживается большою частію лѣтомъ и осенью, и нерѣдко господствуетъ эпидемически.

Главное средство противъ нея: *Merc.-corros.*, соотвѣтствующее сильной натугѣ, какъ бы выдавливающей всѣ внутренности; испражненію чистою кровью или кровянистою, съ зеленоватою слизью; жестокой рѣзи, тошнотѣ, слабости, дрожанію членовъ и холодному поту.

Когда испражненія не столь часты и кровянисты и натуга не очень значительна, зато рѣзь и боль въ животѣ тѣмъ сильнѣе, заставляють корчиться, животъ полонъ и вздуть какъ барабанъ, то приличнѣе *Colocynth.*

Когда извергаются желчныя вещества, съ небольшимъ количествомъ кровянистой слизи при

сильной натугѣ, рѣзи, тошнотѣ и рвотѣ отъ всякаго пріема пищи, то приличнѣе *Ipecac.*

Colchicum—при кровавистыхъ испражненіяхъ съ обрывками эпителія, съ сильною натугою и выпаденіемъ кишки, съ пученьемъ, коликою и съ жженіемъ и натугою при моченспусканіи.

Capsicum—при чрезвычайномъ вздутіи живота и незначительныхъ, но частыхъ испражненіяхъ съ жестокою натугою и жженіемъ.

Arsenicum—когда испражненія становятся гнилыми и отходятъ непроизвольно; при чрезвычайной слабости, вонючей мочѣ, дурномъ запахѣ изъ рта, равнодушномъ одурѣніи или сильномъ нервномъ возбужденіи и страхѣ, палящей жаждѣ, блѣдности лица и синеватыхъ или красныхъ пятнахъ на тѣлѣ.

При очень сильныхъ лихорадочныхъ явленіяхъ, терзающей боли въ членахъ, въ головѣ, въ затылкѣ и плечахъ, и когда угрожаетъ воспаленіе брюшины, полезно дать нѣсколько пріемовъ *Acon.*, который иногда имѣетъ хорошее вліяніе и на сама я испражненія.

При незначительныхъ степеняхъ дисентеріи съ бѣловатыми слизистыми испражненіями, бѣлымъ обложеніемъ языка, вязкостію во рту, тошнотою или слизистою рвотой часто бываетъ достаточно *Pulsat.*, а при частыхъ небольшихъ слизистыхъ испражненіяхъ съ примѣсью кала, съ натугою и сильною болью около пупка—*Nux-vom.*

5. ХОЛЕРИНА.

Холерина или поносъ со рвотою, сдѣлалась, какъ извѣстно, обыкновенною болѣзью во всѣхъ мѣстахъ, гдѣ побывала настоящая азіятская холера, которую она обыкновенно сопровождаетъ. Она отличается частыми испражненіями сначала жидкаго кала, потомъ желчныхъ или водянистыхъ веществъ и желчною, слизистою или водянистою рвотою въ сопровожденіи болѣе или менѣе значительныхъ страданій живота, при безпокойствѣ, жаждѣ, слабости, судорогахъ въ икрахъ и пр.

Главныя средства противъ холерины: *Ipec.*, *Veratr.* и *Phosph.-ac.*

Ipecacuana прилична, когда преобладаетъ рвота или вовсе нѣтъ поноса, или когда поносъ болѣе желчный и желтоватый, менѣе водянистый и слизистый.

Veratrum—когда испражненія чрезвычайно быстры и водянисты, и сопровождаются холодомъ въ конечностяхъ, холоднымъ потомъ, страхомъ, слабостью, блѣдностью и судорогами въ икрахъ.

Phosphori acidum—при чрезвычайно обильныхъ водянистыхъ испражненіяхъ съ сильнымъ урчаніемъ въ животѣ, вязкостью на языкѣ и чрезвычайно слабостью безъ особенной боли или рѣзи въ животѣ.

6. ХОЛЕРА.

Холера отъ холерины отличается преимущественно совершенно водянистыми, безцвѣтными, рисовой водѣ подобными изверженіями верхомъ и низомъ, общимъ холодѣніемъ тѣла, сухостью и потерей упругости кожи, которая сохраняетъ слѣды отъ нажиманія пальцемъ; прекращеніемъ отдѣленія мочи, слабымъ, часто вовсе неощутительнымъ пульсомъ; жестокими судорогами въ рукахъ и ногахъ, и чрезвычайнымъ упадкомъ силъ.

Важнѣйшія средства противъ холеры: *Ipecac.*, *Veratr.*, *Camph.*, *Cupr.*, *Ars.* и *Acid-hydrocyanicum*.

Ipecacuanha можетъ быть прилична только въ легкихъ случаяхъ, когда рвота и поносъ только что начинаются, а прочіе припадки еще слабы или когда испражненія еще продолжаются по улучшеніи общаго состоянія.

Veratrum главное средство противъ всѣхъ холерныхъ случаевъ съ сильными изверженіями верхомъ и низомъ при чрезвычайномъ страхѣ, холодѣ, холодномъ потѣ, осунувшемся лицѣ съ удлиненіемъ или заострѣніемъ носа, синевою подъ глазами; при холодномъ языкѣ, холодномъ дыханіи и сильной боли въ животѣ.

Camphora. Когда холера обнаруживается мгновенно, съ быстрымъ упадкомъ силъ, безъ рвоты и поноса, съ синевою и ледянымъ холодомъ кожи,

страхомъ, удушьемъ, стонами, судорогами въ конечностяхъ и судорожнымъ сжатіемъ челюстей, тогда только отъ *Camph.* можно ожидать помощи. При поносѣ и рвотѣ съ жаждою она не годится.

Cuprum въ особенности соотвѣтствуетъ чрезвычайно сильнымъ судорогамъ, двигающимъ конечности, особенно пальцы и персты взадъ и впередъ, съ давленіемъ и стягиваніемъ въ предсердіи и груди, и когда слышно, какъ питье при глотаніи клокочетъ, опускаясь въ желудокъ.

Acidum-hydrocyanicum часто чудеснымъ образомъ спасаетъ въ такихъ случаяхъ, когда исходъ болѣзни чрезвычайно быстръ и сопровождается параличемъ дыхательныхъ и кровеносныхъ органовъ, удушьемъ, икотой и судорожнымъ сжатіемъ челюстей.

Arsenicum также очень хорошее средство въ тѣхъ случаяхъ, когда съ самаго начала обнаруживаются опасныя явленія, чрезвычайное безпокойство, страхъ смерти, быстрый упадокъ силъ, мелкій, перемежающій пульсъ, неутолимая жажда, жженіе въ желудкѣ, какъ отъ горячихъ угольевъ, черныя губы и языкъ.

Colchicum—противъ обильной рвоты и поноса съ сильною натугой въ заднепроходной кишкѣ и въ мочевомъ пузырьѣ, и при ощущеніи холода въ желудкѣ.

Secale cornutum оказывается дѣйствительнымъ въ особенности, когда испражненія очень водя-

нисты, очень быстро отходятъ, при ничтожной рвотѣ или совершенномъ отсутствіи ея, но съ быстрымъ упадкомъ силъ; при ледяномъ холодѣ конечностей, очень болѣзненныхъ судорогахъ въ икрахъ и ногахъ или съ ощущеніемъ онѣмѣнія въ нихъ.

Табасит—когда преобладаетъ затрудненіе дыханія и припадки удушья.

Такъ какъ болѣзнь имѣетъ чрезвычайно быстрое теченіе, то и лекарства должно давать очень часто, черезъ 15 и даже черезъ 5 минутъ по приему. Кромѣ того для возбужденія дѣятельности въ кожѣ нужно содержать больного въ теплой постелѣ и терѣть теплыми суконками. Для утоленія жажды можно давать маленькіе кусочки льда и же на оборотъ, горячую воду.

7. ЗАПОРЬ.

Запоръ сопровождается очень многія острыя болѣзни, но не всегда бываетъ опасенъ. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ онъ составляетъ правильное естественное явленіе, какъ на примѣръ у женщинъ, въ первые дни послѣ родовъ, при воспаленіи брюшины, нарывѣ въ животѣ, переломѣ ноги и ревматизмѣ въ суставахъ. Поэтому должно остерегаться всякихъ насильственныхъ дѣйствій противъ этого мнимаго зла. Во всякомъ случаѣ нужно дѣйствовать только противъ общаго состоянія или

той болѣзни, которую запоръ сопровождаетъ. Только когда замѣтно дѣйствительное накопленіе кала или когда отъ недостатка испражнений кровь приливаетъ въ голову, можно употребить искусственныя средства къ удаленію задержаннаго, но не слабительныя, а простыя промывательныя чистою водой. Лекарства, какъ напримѣръ *Nux-vom.*, *Bry.* или *Opium*, противъ запора собственно могутъ быть употреблены съ успѣхомъ только въ такомъ случаѣ, когда они соотвѣтствуютъ и всѣмъ прочимъ припадкамъ или болѣзненнымъ явленіямъ.

Постоянное расположеніе къ запорамъ при общемъ съ виду здоровомъ состояніи можетъ происходить отъ множества очень разнообразныхъ обстоятельствъ и скрытыхъ болѣзненныхъ состояній, которыя часто очень трудно бываетъ открыть. Правильная и соотвѣтствующая діета, воздержаніе отъ обремененія желудка, достаточное движеніе и постепенное приученіе ходить на стулъ въ опредѣленный часъ очень много содѣйствуютъ къ устраненію запоровъ. Бываютъ впрочемъ и такіе запоры, которые зависятъ отъ трудно или вовсе неисправимыхъ органическихъ страданій. Важнѣйшія лекарства, соотвѣтствующія запорамъ вообще: *Bry.*, *Chin.*, *N.-vom.*, *Opium*, *Sulph.* Кромѣ того всякое средство, уничтожающее главную причину болѣзненнаго состоянія, разумѣется, дѣйствуетъ и на правильное устройство всѣхъ отправленій.

Bryonia хорошо дѣйствуетъ противъ запора, появляющагося послѣ поноса или лѣтомъ, у рас-

положенныхъ къ приливамъ въ голову, страждущихъ давящею головою болью, ревматизмомъ; у зябкихъ и раздражительныхъ, сердитыхъ.

China соотвѣтствуетъ людямъ слабаго сложенія, чувствительнымъ, особенно женщинамъ; при испражненіяхъ съ большимъ трудомъ, давленіемъ и болью въ проходѣ, жаромъ и отяжелѣніемъ въ головѣ, выдавливающею болью во лбу и раздражительностью.

Nux-vomica въ бѣльшей части случаевъ главное средство, особенно для ведущихъ сидячую жизнь, ипохондриковъ, геморроидалистовъ; когда запоръ сопровождается потерей аппетита, тошнотой, пученьемъ живота, давленіемъ въ желудкѣ, головою болью, нерасположеніемъ къ работѣ, угрюмостью, ощущеніемъ суженія или смыканія задняго прохода и частыми напрасными позывами на низъ, и также, когда запоръ происходитъ отъ обремененія желудка, попойки или насильственно остановленнаго поноса.

Opiu приличенъ, когда есть потребность испражненія, но нѣтъ настоящаго позыва и въ проходѣ ощущеніе какъ-будто запертъ; тяжесть и ощущеніе стучанія внизу живота; отсутствіе аппетита, жажда, сухость во рту, приливъ крови къ головѣ и краснота лица; особенно при запорѣ вслѣдствіе ослабленія или параличнаго состоянія кишечнаго канала послѣ продолжительнаго поноса или отъ недостатка движенія у сильныхъ, полнокровныхъ, упитанныхъ людей, у беременныхъ.

женщинъ и грудныхъ дѣтей; при отравленіи свинцомъ и при ущемленной грыжѣ.

Sulphur часто хорошо дѣйствуетъ противъ застарѣлыхъ запоровъ послѣ *N-vom.*; при ипохондріи и геморроѣ, при пученьѣ отъ вѣтровъ и частыхъ напрасныхъ позывахъ.

Natrum-muriaticum можетъ быть употребленъ съ успѣхомъ въ очень упорныхъ случаяхъ застарѣлаго запора, когда вовсе нѣтъ ни позыва, ни потребности и кишечный каналъ въ совершенномъ бездѣйствіи.

Plumbum при упорномъ запорѣ съ сильною коликой, твердомъ стягиваніи живота, затыгиваніи прохода и трудномъ отхожденіи твердаго шаровиднаго кала, подобно бараньему.

Кромѣ того противъ судорожнаго задержанія испражнений бываютъ полезны *Platina*, *Veratr.*, *Zinc.*; противъ параличной формы въ родѣ опійной—*Phosph.*, *Rhus.*, *Secale-corn.*; при матеріальныхъ причинахъ, которымъ соотвѣтствуютъ *Sulph.* *Nux-v.* и *Natr.-mur.*, преимущественно *Lycop.*, который при брюшныхъ завалахъ, геморроѣ, хроническомъ катаррѣ кишекъ или при страданіи сосѣднихъ частей, почекъ, мочевого пузыря, матки или при подагрѣ и т. д. оказывалъ наиболѣе успѣшныя дѣйствія.

8. ПУЧЕНЬЕ ОТЪ ВѢТРОВЪ.

Чрезмѣрное развитіе и накопленіе вѣтровъ вообще зависитъ отъ ослабленія пищеваренія и потому часто является вмѣстѣ съ ипохондріей, геморроемъ, запоромъ, спазмами желудка и другими страданіями живота. Въ такихъ случаяхъ эти страданія обнаруживаются не только послѣ пучащей, но вообще послѣ всякой пищи и отлчаются въ особенности мучительнымъ вздутіемъ живота и желудка.

Когда страданіе обнаруживается послѣ принятія пучащей пищи, — капусты, луку пива, — и колики незначительны, но сильно пученье и дыханіе стѣснено: есть жаръ и безпокойство, верхомъ и низомъ отходятъ нѣсколько облегчающіе вѣтры, то всего лучше дѣйствуетъ *China*.

Когда послѣ каждаго приема пищи въ желудкѣ ощущается полнота, тяжесть; желудокъ и животъ раздувается; поясъ и одежда тяготятъ; внизу живота тяжесть съ урчаньемъ и чувствительностью къ прикосновенію, съ ощущеніемъ смыванія въ заднемъ проходѣ, стѣсненія въ головѣ, съ раздражительностью и досадой, то помогаетъ *Nux-vom*.

Sulphur часто приноситъ большую пользу въ самыхъ трудныхъ и застарѣлыхъ случаяхъ, когда пищевареніе совершенно подавлено, когда есть завалы въ печени, геморроидальныя и другія стра-

данія органовъ живота, вздутіе, пученье, накопленіе слюны, изжога, гнилой вкусъ во рту, сильная колика отъ спирація вѣтровъ и гнилой запахъ вѣтровъ.

Кромѣ того нужно обращать вниманіе на слѣдующія указанія:

При **спираціи вѣтровъ**: соотвѣтствуютъ: *Aur.*, *Carb.-v.*, *Caust.*, *Colch.*, *Hep.*, *N.-vom.*, *Phosph.*, *Sulph.*

— **легко отходящихъ** вѣтрахъ: *China*, *Graphites*, *Mercurius*, *Phosph.*, *Veratr.*

— **очень вонючихъ**: *Ars.*, *Asa.*, *Carb.-v.*, *Chin.*, *Puls.*, *Sulph.*

— вѣтрахъ **безъ запаха**: *Bell.*, *Lycopodium.*

— разстройствѣ желудка **жирною пищею**: *Puls.*, *Ars.*, *Carb.-v.*, *Chin.*

9. ГРЫЖА.

Паховая грыжа у взрослыхъ непременно требуетъ хорошо пригнаннаго бандажа, потому что на радикальное излеченіе посредствомъ лекарствъ нельзя надѣяться. Грыжа у дѣтей излечается посредствомъ *N.-vom.* и *Cocc.* и бандажи не нужны. Только на пупочную грыжу у дѣтей нужно накладывать перевязку, — посредствомъ лентъ изъ липкаго пластыря, которыя слѣдуетъ почаще перемѣнять, когда ослабѣваютъ. Еще лучше просто покрывать весь пупокъ и окружность *коллодіемъ*.

Ущемленную грыжу, разумѣется, нужно вправить, но это вправление, часто невозможное, необходимо облегчить соотвѣтствующими средствами:

Aconitum — когда защемленное мѣсто красно, горячо, очень чувствительно къ прикосновенію, въ животѣ жженіе, общій жаръ и волненіе, тошнота и желчная рвота.

Nux-vomica — когда признаки воспаленія незначительны, или когда ихъ вовсе нѣтъ, но зато животъ очень вздутъ, отрыжка сильна или когда предшествовали расстройство желудка, простуда или досада.

Opium — когда изверженное рвотой имѣетъ дурной запахъ и видъ кала, лицо красно и животъ сильно вздутъ.

Sulphur и *Sulphuris acidum* — когда *Aconit.* устранилъ признаки воспаленія, но вправление все-таки не удастся и въ особенности, когда рвота становится кислую.

Veratrum — при рвотѣ и холодномъ потѣ.

При чрезвычайно упорномъ запорѣ съ сильнымъ вздутіемъ живота можно еще испытать: *Capsic.*, *Plumbum* и *Thuja*.

Эти же средства показаны, когда **рвота каломъ** (*miserere*) случается вслѣдствіе сплетенія и стягиванія кишекъ или отъ иныхъ механическихъ причинъ.

Когда защемленной грыжѣ угрожаетъ **антоновъ огонь**, боли утихаютъ и кожа окружаю-

шихъ частей чернѣть, то можно еще испытать *Arsenicum* и *Lachesis*.

Если вправленіе защемленной грыжи не удастся, и угрожающій антоновъ огонь не устраняется, то необходима бываетъ операція. Но слишкомъ торопиться операціею всетаки не слѣдуетъ, потому что, во-время дѣйствуя лекарствами, въ бѣльшей части случаевъ можно предупредить ее.

10. ВЫПАДЕНІЕ ЗАДНЕПРОХОДНОЙ КИШКИ.

Это страданіе есть также родъ грыжи и происходитъ большею частью отъ катаррального воспаленія кишки, продолжительнаго поноса или натуги. Главное средство *Nux-vomica*. Смотри по поводамъ къ разслабленію однакожь могутъ быть потребны: при воспаленіи и при глистахъ *Merc.*; при геморроидальныхъ состояніяхъ *Sulph.*; при золотушномъ состояніи *Calc.* При поносѣ *Arsen.*; при разслабленіи кишки *Calc.*, *Ruta* и *Lycop.*; когда кишка попеременно выступаетъ и сама втягивается, съ ознобомъ въ тѣлѣ *Solan-tub.* Въ свѣжихъ лѣчаяхъ у дѣтей, когда *Nux-vom.* не дѣйствуетъ, иногда помогаетъ *Ignat.*

II. ГЕМОРРОЙ.

Геморроемъ называются, происшедшія отъ неправильнаго обращенія крови припухлости и узловатыя расширенія въ венахъ прямой кишки, которыя нерѣдко мѣстами трескаются и подаютъ поводъ къ періодическому кровотеченію. Очевидно, что геморрой есть только слѣдствіе и припадокъ другой болѣзни, и можетъ быть излеченъ только уничтоженіемъ, производящей его причины. Всякая болѣзнь, нарушающая правильность кровообращенія, можетъ произвести геморрой. Главныя изъ такихъ причинъ нѣкоторыя органическія страданія сердца и легкихъ и хроническія расстройства пищеваренія и брюшныхъ органовъ вообще. А такъ какъ многія изъ этихъ болѣзней не могутъ быть кореннымъ образомъ излечены и часто послѣ геморроидальнаго теченія наступаетъ значительное улучшеніе общаго состоянія, то леченіе геморроя большею частью должно оставаться симптоматическимъ и ограничиваться мѣрами къ устраненію только самыхъ тягостныхъ припадковъ, а не къ прекращенію облегчающихъ кровотеченій и уничтоженію расширенія венъ наружными хирургическими средствами.

Самыя могущественныя средства противъ геморроя *N.-vom.*, *Sulph.*, *Bell.*, *Lycop.* и *Nitr.-ac.*, но для радикальнаго излеченія, какъ сказано, необходимо прежде всего имѣть въ виду главную при-

чину геморроя и соображать все, относящееся къ страданіямъ брюшныхъ органовъ.

Aconitum: приливъ крови, жаръ, воспаленіе шишекъ, кровотеченіе съ колотьемъ; рѣзь и ощущеніе полноты внизу живота; боль въ поясницѣ; зудъ въ проходѣ.

Belladonna: приливъ крови, кровотеченіе съ судорожною коликой и болью въ поясницѣ, приливы къ головѣ, сердцу и легкимъ; раздраженіе спиннаго мозга; воспаленіе шишекъ или напряженіе въ нихъ.

Carbo vegetabilis: приливъ пассивнаго свойства (застой крови) при общей слабости; кровотеченія носомъ; шишки опухлыя, синеватыя, горячія, жгучія; обильное отхожденіе жгучей слизи; боль и тугота въ поясницѣ; запоръ съ горячими испражненіями и кровотеченіе. Также при разстройствѣ пищеваренія, кислотахъ желудка, изжогѣ, давленіи подъ ложечкой и пученьѣ отъ вѣтровъ.

Chamomilla соотвѣтствуетъ въ особенности нервнымъ и судорожнымъ припадкамъ; текучему геморрою съ ощущеніемъ сжиманія внизу живота; поносу съ натугой; судорожной и стрѣляющей боли въ поясницѣ; безпокойству и раздражительности.

Lycoperodium: преимущественно при матеріальныхъ измѣненіяхъ, при опухлости печени, страданіяхъ почекъ, хроническомъ ослизненіи желудка съ запоромъ; при расположеніи къ сыпямъ, ревматизму, приливамъ.

Nitri acidum очень дѣйствительное средство при сильномъ приливѣ крови, когда шишки распухли, воспалены, болятъ; при сильномъ жилогіеніи и ощущеніи жара въ разныхъ частяхъ тѣла; при кровотеченіи и зеленоватомъ слизистомъ поносѣ.

Nux-vomica при закрытомъ и при открытомъ геморроѣ вслѣдствіе сидячаго образа жизни; при ипохонеріи, давленіи и разбитости въ поясницѣ, запорѣ съ натугою, отсутствіи позыва на низъ, отхожденіи слизи и крови, приливахъ крови къ головѣ, тяжести и давленіи въ желудкѣ и животѣ, коликѣ, усталости; при ожесточеніи всѣхъ припадковъ поутру, послѣ умственныхъ напряженій и спиртныхъ напитковъ.

Pulsatilla: при преобладающемъ ослизеніи, наклонности къ катарру желудка и кишекъ, откуда и поносъ; при кровоточивыхъ шишкахъ, испражненіяхъ со слизью и кровью, съ давленіемъ на шишки; при боли въ поясницѣ, частыхъ позывахъ на мочу; расположеніи къ обмороку и общей слабости. Ожесточеніе по вечерамъ.

Serpa—въ случаяхъ, подобныхъ тѣмъ, которымъ соотвѣтствуетъ *Pulsat.*, только при болѣе ясно выраженномъ брюшномъ полнокровіи; при давленіи и напряженіи внизу живота, болѣзненномъ состояніи селезенки, мигрени (односторонней головной боли), вздутіи предсердія, хроническомъ катаррѣ желудка, запорѣ и зудѣ въ проходѣ.

Sulphur—главное средство въ большей части геморроидальныхъ состояній; при натугѣ и дав-

ленія во время испражненія; при запорѣ и поносѣ, также при томъ и другомъ попеременно; при отхожденіи крови и слизи, воспаленныхъ шишкахъ, колючей и саднящей боли въ проходѣ; поясница какъ разбита, горить, колетъ и давить; боль въ затылкѣ и лопаткахъ.

Противъ часто несноснаго **зуда въ проходѣ** хорошо дѣйствуютъ *Aconitum*, *N.-vom.*, *Sep.*, *Sulph.*, *Ignat.*, *Graph.*, *Phosph.*, *Zinc.*

Противъ **жженія и садна**: *Arsen.* или *Capsic.*

Противъ **красноты, опухоли и воспаленія** геморроидальныхъ шишекъ: *Acon.*, *Bell.*, *Arsen.*, *Cham.*, *Puls.*

Противъ **колики** и сильной боли въ животѣ; *Coloc.*, *N.-vom.*, *Puls.*, *Sulph.*

Противъ **отхожденія слизей**: *Antim.*, *Caps.*, *Carbo-veg.*, *Merc.*, *Puls.*

Противъ частаго **кровотеченія** *Bell.* и *Sulph.* или *Acon.*, *Caps.*, *Cham.*, *Kreos.*, *Puls.*, *Sulph.-ac.* Когда кровотеченіе очень сильно и обильно: *Ipec.*, *Kreos.* и *Millefol.* Въ очень опасныхъ случаяхъ въ помощь лекарствамъ можно употребить пальчативныя холодныя примочки и ледь.

12. ГЛИСТЫ.

Дѣти и отчасти взрослые имѣютъ въ кишкахъ червей, которыхъ присутствіе обнаруживается большею частію только по временамъ отхожденіемъ въ

испражненіяхъ. Когда эти черви вслѣдствіе болѣзненнаго состоянія кишекъ или ихъ содержанія непомѣрно умножаются, тогда только являются извѣстныя страданія и болѣзнь. Эта болѣзнь, стало-быть, происходитъ не столько отъ присутствія самыхъ глистовъ, сколько отъ общаго состоянія или той причины, которая породила и умножила ихъ. Стало-быть также простое умерщвление или изгнаніе глистовъ вовсе не составляетъ прочнаго излеченія: нужно излечить болѣзнь, способствующую размноженію глистовъ. Это достигается соотвѣтствующимъ діететическимъ содержаніемъ и гомеопатическими лекарствами. Извѣстно, на примѣръ, что дѣти, содержащіяся на хлѣбной, мучной, картофельной и молочной пищѣ, въ теплѣ и при недостаточномъ движеніи всего больше подвержены глистамъ. Нужно ограничить употребленіе такой пищи и заботиться о достаточномъ движеніи и свѣжести тѣла. Но каково бы ни было сложеніе организма, глисты само собою, какъ въ старину предполагали, развиваться въ немъ не могутъ: зародыши глистовъ всегда попадаютъ въ организмъ извнѣ; развиваются же и растутъ больше или меньше, смотря по найденнымъ благопріятнымъ для нихъ условіямъ.

Аскариды или мелкіе глисты, живутъ обыкновенно въ прямой кишкѣ и по временамъ причиняютъ несносный зудъ въ проходѣ. Чувствительные дѣти отъ этого зуда часто бываютъ внѣ себя, особенно по ночамъ. Главное средство въ такомъ

случаѣ: *Ignatia*. Нѣсколько приѣмовъ бываетъ достаточно для уничтоженія зуда или по крайней мѣрѣ для успокоенія его на нѣкоторое время. Когда зудъ особенно силенъ ночью и сопровождается лихорадочнымъ безпокойствомъ, то можно употребить *Aconit*. Въ застарѣлыхъ случаяхъ и когда судъ является въ опредѣленное время, обыкновенно около новолунія или полнолунія, полезно передъ наступленіемъ этихъ періодовъ луны давать *Sulphur*. Кромѣ того дѣйствительными противъ мелкихъ глистовъ оказываются: *Calcarea*, *Ferrum*, *Marum* и *Mercurius*.

Страданія, причиняемые длинными **круглыми глистами**, бываютъ разнообразнѣе. Обыкновенные признаки: блѣдность лица съ синевою подъ глазами, вдругъ подступающая и такъ же скоро проходящая тошнота и боль въ животѣ, обильная водянистая слюна, рвота, отвращеніе отъ нѣкоторой пищи, особенно отъ сладкой, зудъ въ носу и т. д. Нерѣдко появляются и припадки, имѣющіе опасный характеръ: временное косоглазіе, сонливость и судороги. Главныя средства противъ страданій отъ длинныхъ круглыхъ глистовъ: *Cina*, *Merc.*, *Sabadilla*, *Spigelia*, *Aconitum*, *Sulphur.*, *Calcarea*, *Veratr*.

Cina—когда животъ толстъ, лицо блѣдно, зрачки расширены, зудъ въ носу, чрезвычайный голодь, попеременно съ отсутствіемъ аппетита, частная рвота, безпокойный сонъ и когда ребенокъ мочится ночью подъ себя. Когда притомъ есть волненіе и

жаръ, полезно дать напередъ нѣсколько приѣмовъ *Aconit.* или *Mercur.*, когда есть натужные позывы на низъ или частыя слизистыя испражненія.

Spigelia — при частыхъ внезапныхъ схваткахъ боли въ животѣ, жадномъ голодѣ, періодической головной боли, расширеніи зрачковъ или закатываніи глазъ, моченьи подъ себя и отхожденіи слизи низомъ безъ настоящихъ испражнений.

Sabadilla — оказывается полезною въ особенности въ самыхъ трудныхъ случаяхъ, когда глисты извергаются рвотой или по-крайней-мѣрѣ тошнота и рвота часто сопровождаются ощущеніемъ посторонняго тѣла въ глоткѣ. — Въ этихъ случаяхъ я съ успѣхомъ давалъ *Veratr. 1.* (Дер.).

Когда глистное страданіе сопровождается сильнымъ раздраженіемъ нервовъ, пугливостью и вздрагиваніями во снѣ, то лучше всего дѣйствуютъ: *Belladonna* и *Lachesis*.

Расположеніе къ глистной болѣзни или образованію глистовъ лучше всего уничтожается посредствомъ *Calcar.*, въ рѣдкихъ приѣмахъ, иногда попеременно съ *Sulphur*.

Страданія, причиняемые **солитеромъ** или длиннымъ тесемочнымъ глистомъ, такъ разнообразны и неопредѣленны, что только отхожденіе клочковъ дѣйствительно доказываетъ его присутствіе; всѣ же прочіе признаки обманчивы. Страданія эти, впрочемъ, рѣдко бываютъ столько значительны или опасны, чтобы требовать скорого механическаго изгнанія или умерщвленія глиста.

Къ такимъ мѣрамъ побуждаетъ большею частью только отвращеніе и страхъ мало основательный, между тѣмъ какъ эти-то мѣры именно и могутъ сдѣлаться гораздо опаснѣе присутствія глиста. Они бывають не только опасны на время самой операціи, но часто и надолго потомъ оставляють важныя разстройства. Гомеопатическими средствами нельзя навѣрное и вдругъ выгнать глиста; можно только постепенно излечить глистную болѣзнь, то есть измѣнить состояніе организма такимъ образомъ, что онъ сдѣлается неспособнымъ къ содержанію этого чужаднаго.

Filix mas въ нѣсколько пріемовъ иногда совершенно или по-крайней-мѣрѣ надолго уничтожаетъ всѣ припадки, а иногда при продолжительномъ употребленіи этого средства и весь глистъ постепенно отходитъ по частямъ.

При сильной жгучей и сверлящей боли въ животѣ, обильномъ слюнотеченіи, зябкости, чувствительности къ холоду и при ощущеніи какъ-будто животъ ввалился или желудокъ подточенъ, съ давящею рвотой и ощущеніемъ инороднаго тѣла въ глоткѣ, хорошо дѣйствуетъ *Sabadilla* въ не очень частыхъ пріемахъ.

Когда эти средства оказались неэффективными, то лучше всего употреблять *Sulph.* и *Merc.* (высокихъ дѣленій) попеременно, черезъ два или три дня по пріему, а при золотушномъ, сыромъ сложеніи отъ времени до времени вставлять по пріему *Calc. 30.*

Самое выгодное время для леченія глистной болѣзни—весенніе мѣсяцы, мартъ, апрѣль и май, потому что глисть въ это время и безъ того бываетъ слабъ и отходить кусками.

Трихины. Въ послѣднее время очень много было написано о трихинахъ и напущено не мало страху описаніями опустошеній, производимыхъ въ тѣлѣ зараженною трихинами свининой, ветчины, колбасами и т. п. Къ счастью, однакожъ, трихиновая болѣзнь, или зараженіе трихинами, встрѣчается довольно рѣдко, по-крайней-мѣрѣ въ Россіи. Трихина есть маленькій, простымъ глазомъ едва различаемый нитеобразный червякъ, около одной пятой линіи длиною, свернутый спиралью и заключенный въ шаровидномъ пузырькѣ или капсулѣ. Онъ встрѣчается въ свинномъ мясѣ иногда въ громадномъ количествѣ, напр. въ одномъ лотѣ отъ 1,000 до 100,000 пузырьковъ, вкрапленныхъ между волокнами мышцъ. Попадъ въ желудокъ человѣка эти пузырьки распадаются и трихины развиваются съ чрезвычайною быстротою. Уже черезъ 24 часа по поступленіи въ кишку они достигаютъ половой зрѣлости, а на шестой день самки, бывающія ростомъ почти въ пять разъ больше самцовъ, плодятся. Это новое поколѣніе, такъ называемыя кишечныя трихины, и причиняетъ болѣзнь. Они не только накапливаются въ громадномъ числѣ въ кишкѣ, но пронизываютъ ея стѣнки и проникаютъ въ полость живота и груди, къ сердцу и далѣе, въ мышцы

всего тѣла, просверливая себѣ ходъ между волокнами. Просверливаютъ они однакожь только мышцы, не выходя наружу черезъ кожу и другія оболочки. Сначала трихина лежитъ между мѣшечными волокнами, вытянувшись въ длину, и потомъ, достигнувъ извѣстнаго возраста, свертывается въ спираль, причемъ около нея, какъ бы отъ выпота образуется капсула, отвердѣвающая при помощи отложенія известковыхъ солей. Въ этомъ видѣ она можетъ прожить многіе годы, пока не замретъ отъ продолжающагося известковаго отложенія или пока не попадетъ, какъ на примѣръ изъ свиньи въ другой животный организмъ, гдѣ въ мигъ пробуждается, чтобы наплодить новое поколѣніе. Понятно, что подобное поселеніе въ организмъ должно произвести разстройства. И дѣйствительно эти разстройства бываютъ опасны и даже смертельны. Первые припадки, какъ кажется, обнаруживаются въ слизистой оболочкѣ именно въ видѣ раздраженія, поноса, катарра и воспаленія. Во время трихинной эпидеміи въ Плауэнѣ, въ Саксоніи, гдѣ было поражено этою болѣзнію около 30 человѣкъ, началомъ было ощущеніе разбитости въ тѣлѣ, боли въ членахъ; затѣмъ черезъ нѣсколько дней, большею частью внезапно оказывается опухоль въ лицѣ. Боль и лихорадка не давали больнымъ покою ни днемъ, ни ночью. Сильно больные не могли безъ боли пошевелить членами и лежали неподвижно, скорчившись. Къ этому присоединялись опухоли въ разныхъ дру-

гихъ частяхъ. Болѣзнь эту очень легко смѣшать съ ревматизмомъ и даже съ тифомъ. Оканчивается она часто водяною. Положительно вѣрныхъ признаковъ этой болѣзни, при невозможности изслѣдовать живую мышцу, конечно нѣтъ. При подозрѣніи на съѣденное трихины содержащее мясо предлагаемыя рвотныя и проносныя съ прибавкою глистогонныхъ средствъ, конечно, могутъ быть дѣйствительными только въ самомъ началѣ, то есть въ первые часы по введеніи трихинъ въ желудокъ.

Специфическаго средства еще не найдено и мало вѣроятности скоро найти его. Лечение возможно стало-быть, только паллятивное. При отека лица и ногъ можно прибѣгнуть къ *Arsen.* или *Ferr.* При боли и тугости въ мышцахъ *Rhus.* или *Arnic.* При развитой подкожной водянкѣ *Chin., Helleb.* и *Arsen.*

Для предупрежденія зараженія не слѣдуетъ ѣсть никакого сыраго мяса, въ особенности свинины недовареной и недостаточно прокопченной. Сильнымъ копченьемъ, а въ особенности исправною варкою, какъ нынче уже дознано, капсулы разрушаются и трихины убиваются, такъ что даже зараженное мясо становится безвреднымъ. Съ сырымъ-же мясомъ, а также съ подгнившими плодами и кореньями могутъ попасть въ организмъ и различные другіе глисты въ видѣ зародышей и переходныя формы этихъ чужеродныхъ.

Въ видахъ предупрежденія трихинной болѣзни, кромѣ микроскопа, рекомендованнаго колбасникамъ, приготовляющимъ окорока, не мѣшало-бы обратить вниманіе на первое начало, на воспитаніе свиней. Тамъ, гдѣ свиньи стоятъ на хорошемъ и преимущественно хлѣбномъ кормѣ и не ѣдятъ крысъ, изверженій и всякой падали, тамъ они сами будутъ здоровы и никому не передадутъ трихинъ.

§ X.

БОЛѢЗНИ ПЕЧЕНИ И СЕЛЕЗЕНКИ.

1. ВОСПАЛЕНІЕ И ДРУГІЯ БОЛѢЗНИ СЕЛЕЗЕНКИ.

Воспаленіе отъ простой опухоли селезенки трудно отдѣлять. Признаками служатъ: боль, давленіе, колотье, усиливаемыя прикосновеніемъ, дыханіемъ, кашлемъ, чиханіемъ, сидѣніемъ въ согбенномъ положеніи, лежаньемъ на лѣвомъ боку; жаръ и опухоль въ лѣвомъ подреберьи; боль въ лѣвомъ плечѣ; лихорадка съ ознобомъ; икота; рвота кровью и пищей; разстройство пищеваренія; кислый вкусъ, отрыжка. Подходящія средства:

Arsenicum—при сильномъ жженіи въ селезенкѣ съ опухолью, тоску причиняющемъ біеніи подъ

ложечкой, поносѣ, черной рвотѣ, сухомъ жарѣ, жаждѣ, растрескавшихся губахъ, землистомъ цвѣтѣ лица, маломъ пульсѣ и большой слабости.

Belladonna — въ началѣ и при воспаленіи поверхности селезенки, колотѣ, приливахъ крови къ головѣ и лицу, жарѣ и сильномъ нервномъ возбужденіи.

Bryonia — послѣ *Aconit.* и *Bellad.*, для разрѣшенія выпота въ оболочкѣ селезенки; при колющей или давящей боли, запорѣ и желудочномъ разстройствѣ и когда боль усиливается отъ движенія.

China — въ хронической и медленно развивающейся болѣзни. При общей слабости, опухоли селезенки, рвотѣ кровью, перемежающемся характерѣ болей.

Nux-vomica — при ощущеніи опухоли, давленіи и колющей или судорожной боли въ лѣвомъ подреберьи, ощущеніи полости въ желудкѣ, или давленіи, тошнотѣ, рвотѣ кровью, обложеніи языка и геморроидальномъ расположеніи.

Противъ такъ называемаго **КОЛОТЯ** въ селезенку, часто происходящаго просто отъ брюшныхъ мышцъ, показана *Bryonia*, а при пученьѣ отъ вѣтровъ *Pulsatilla*.

Противъ **хроническаго** воспаленія селезенки, кромѣ *Chin.*, пригодны: *Brom.*, *Lycor.*, *Plumb.* и *Sulph.* При застарѣломъ отвердѣніи *Jod.*

Противъ **опухоти** селезенки, особенно послѣ перемежающейся лихорадки — *China*, если она не

была уже употреблена въ большихъ приѣмахъ. Въ противномъ случаѣ—*Ferr.* и *Arsen.*

2. ЖЕЛЧНЫЯ СТРАДАНИЯ.

Такъ называемое **желчное состояніе** происходитъ отъ слишкомъ обильнаго изліянія желчи въ желудокъ и кишки и обнаруживается желтымъ обложеніемъ языка, потерей аппетита, тошнотой, желчною рвотой и поносомъ, темною мочей, горькимъ вкусомъ во рту, позывомъ на кислое, давленіемъ и полнотой около печени и желтымъ цвѣтомъ кожи. Лучшія средства: *Bryon.*, *Digit.*, *Merc.*, *Nux-vom.*, *Sulph.*; иногда *Chamom.* или *Pulsat.*

Къ желчному состоянію, отъ воздѣйствія его на кровеносную и нервную системы, иногда присоединяется лихорадочное движеніе, которое называютъ **желчною лихорадкой**. Эта лихорадка имѣетъ такое-же отношеніе къ желчному состоянію, какъ гастрическая лихорадка къ желудочному катарру. Она можетъ, впрочемъ, появляться и въ видѣ сопровождающаго осложненія при желудочномъ и кишечномъ катаррѣ, воспаленіяхъ въ груди и т. д. Средства: *Acon.*, *Bryon.*, *Merc.*, *Cham.*, *Pulsat.*; въ трудныхъ случаяхъ *Arsen.*

Желтуха, или такъ называемое разлитіе желчи, распознается по желтому цвѣту кожи, темной мочѣ и блѣдному, на глину похожему калу. Са-

мымъ дѣйствительнымъ средствомъ почти всегда оказывается *Mercurius*. Если же ртуть уже была употребляема прежде и въ большомъ количествѣ, то лучше дѣйствуетъ *China*. Когда же желчь разлилась вслѣдствіе досады, помогаетъ *Bryonia*. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ бывають необходимы: *Digit.*, *Nux-vom.*, *Sulph.*, *Arsen.*, *Coloc.*, *Jod*.

Желтуха у **новорожденныхъ**, напротивъ, отличается тѣмъ, что моча бываетъ свѣтлая, а калъ темный, желчью окрашенный. Лучшее средство тутъ обыкновенно *Aconit*. Если же оказываются слизистыя и поносистыя изверженія, какъ бы рубленныя, то приличны *Merc.* и *Chamom.*, а въ упорныхъ случаяхъ *Laches*.

Желтуха можетъ также происходить отъ желчныхъ камней въ печени или желчныхъ протокахъ, или отъ органическаго страданія печени, и въ такомъ случаѣ, разумѣется, труднѣе излечается.

Желчные камни, состоящіе большею частью изъ отвердѣвшаго жиру, желчнаго пигмента и извести, образуются въ желчномъ пузырьѣ, гдѣ они лежать свободно, или приросли къ стѣнкамъ. Проходя при отдѣленіи по желчнымъ протокамъ, они раздражаютъ стѣнки протоковъ, причиняють воспаленіе ихъ и часто бывають причиною задержанія желчи, то есть обратнаго поступленія ея въ кровь, желтухи, или же такъ называемой **желчной колики**, періодическихъ припадковъ жестокой боли въ печени, съ желчною рвотой и поносомъ. Иногда они отходятъ и съ испражненіями

довольно свободно. Вѣрнаго средства къ уничтоженіи желчныхъ камней въ гомеопатіи, такъ же какъ и въ аллопатіи еще не найдено. Для облегченія припадковъ боли служатъ, смотря по обстоятельствамъ: *Bell.*, *Cham.*, *Coloc.*, *Merc.*, *Sulph.*, *Veratr.* и въ особенности *Arsen.*

Вообще при желчныхъ страданіяхъ нужно имѣть въ виду состояніе желудка и кишекъ, потому что соотвѣтствующія этимъ состояніямъ средства, особенно *Antim.*, *Calc.*, *Ipec.*, *Lycop.*, *Natr-mur.*, *Sep.*, здѣсь также могутъ оказаться потребными. *Lycop.* между прочимъ бываетъ полезенъ во многихъ хроническихъ страданіяхъ печени и ихъ послѣдствіяхъ, когда эти страданія не сопровождаются слишкомъ значительнымъ измѣненіемъ состава печени.

3. ВОСПАЛЕНІЕ ПЕЧЕНИ.

Покровы печени (брюшины надъ печенью) воспаляются чаще, нежели самое тѣло печени. Воспаляются также желчный пузырь, его протоки и развѣтвленія воротной вены. Различить эти мѣста воспаленія довольно трудно. Но воспаленіе печени вообще узнается по различнаго рода болямъ, особенно давящей и колющей, въ правой сторонѣ, начиная изъ-подъ соска и до подреберья, спереди, по боку и до спины. Боль ожесточается вдыханіемъ, чиханіемъ, кашлемъ, дотрогиваніемъ; со-

проводается болью въ правомъ плечѣ, опухолью въ особенности печени, желтухой, рвотой, запоромъ или поносомъ, сильною лихорадкой съ ознобомъ, головою болью, мрачнымъ расположеніемъ духа, тоской. Воспаленіе желчнаго пузыря и протоковъ происходитъ большею частью отъ желчныхъ камней. Воспаленіе печени легко можетъ быть смѣшано съ страданіями груди. Послѣдствіями его бываютъ выпоть, нагноеніе, сращеніе. Причины часто бываютъ механическія, ушибъ или нажимъ, какъ напр. у женщинъ отъ крѣпкаго стягиванія корсетомъ, или также ревматизмъ. Хроническое воспаленіе печени можетъ тянуться очень долго безъ особенно явныхъ признаковъ и привести къ измѣненіямъ состава ткани.

Aconitum—главное средство въ началѣ, при сильномъ жарѣ, колющей и жгучей боли, опухоли въ области печени, ускоренномъ полномъ пульсѣ, затрудненномъ дыханіи, отрывистомъ сухомъ кашлѣ.

Arsenicum—въ самыхъ трудныхъ случаяхъ, при угрожающемъ нагноеніи или антоновомъ огнѣ; при болящей опухоли, сильномъ жженіи, рвотѣ и испражненіи черными веществами; сухой горячей кожѣ, сильной жадѣ и тоскѣ.

Belladonna—при воспаленіи покрововъ печени; схватывающей и колющей боли, ожесточаемой малѣйшимъ прикосновеніемъ, вдыханіемъ, движеніемъ и лежаньемъ на больномъ боку; напряженіи въ верхней части живота и тревожномъ снѣ, безсонницѣ. Когда сверхъ того бываютъ приливы

крови къ головѣ, головокруженіе, сухой кашель, одышка, икота, жажда, потеря сознанія, тошнота, трудная рвота и сильная лихорадка, часто обдасть жаромъ.

Bryonia—при воспаленіи самаго тѣла печени. При разстройствѣ пищеваренія и отдѣленія желчи, желтухѣ, запорѣ и когда можно опасаться нагноенія. При давящей и колющей боли, ожесточаемой прикосновеніемъ и движеніемъ; при ревматизмѣ и когда боль въ печени причинена досадой.

Merc.-solubilis (или *M.-dulcis*) — въ сильныхъ степеняхъ воспаленія тѣла печени и желчныхъ протоковъ и угрожающемъ нагноеніи; при жгучемъ жарѣ со смѣнами ознобомъ; при жаждѣ, обильномъ потѣ, безпокойствѣ, давленіи во всей верхней части живота, поносѣ или запорѣ.

Nux-vomica—по минованіи сильнаго воспаленія и въ болѣе слабыхъ и ревматическихъ формахъ при колотѣхъ, давленіи и стучаніи въ печени, запорѣ, гастрическихъ и желчныхъ страданійхъ жаждѣ, горечи во рту, одышкѣ, головной боли и ожесточеніи по утрамъ.

Въ трудныхъ острыхъ случаяхъ съ тифозными признаками и быстрымъ упадкомъ силъ бываетъ пригоденъ также *Phosphor*. Хроническимъ состояніямъ соотвѣтствуютъ: *Brom.*, *Jod.*, *Chin.*, *Lycor.*, *Magn.-mur.*, *Phosph.*, *Sep.*, *Sulph.* — Лекарства слѣдуетъ давать въ низкихъ дѣленіяхъ и частыхъ приемахъ. Діета должна быть строго тощая.

§ XI.

БОЛѢЗНИ МОЧЕВЫХЪ И ПОЛОВЫХЪ ОРГАНОВЪ.

1. РАЗСТРОЙСТВО МОЧЕОТДѢЛЕНІЯ.

Болѣзни мочевыхъ органовъ: почекъ, пузыря, мочеточниковъ и канала могутъ состоять въ матеріальныхъ измѣненіяхъ этихъ органовъ и въ болѣзненныхъ ощущеніяхъ въ нихъ или же только проявляются въ этихъ частяхъ, но происходятъ частью изъ крови, отъ болѣзненного смѣшенія ея, какъ напримѣръ въ скарлатинѣ, кори, тифѣ, холерѣ, подагрѣ, частью отъ болѣзней нервной системы, особенно спиннаго мозга, какъ напр. при параличѣ пузыря. При леченіи всѣхъ болѣзней мочевыхъ органовъ весьма важно отличать характеръ ихъ, воспалительный, катарральный, нервный (судорожный) и органическій (измѣненія состава). Послѣдняя форма, разумѣется, самая трудная и часто бываетъ неизлечима.

Задержаніе мочи и мочерѣзъ часто происходятъ отъ мочевыхъ камней и отъ суженія (стриктуры) мочевыхъ протоковъ. Здѣсь мы будемъ говорить только о менѣ важныхъ разстрой-

ствахъ, происходящихъ отъ мѣстнаго воспаленія, судорогъ, геморроя и т. д.

При трудномъ мочеиспусканіи съ болью, сильными побужденіями и незначительнымъ количествомъ мочи наиболѣе соотвѣтствующія средства: *Acon.* и *Puls.*

Когда такому страданію предшествовалъ **ушибъ** или паденіе—*Arnica.*

Когда страданіе происходитъ отъ наружнаго или внутренняго употребленія **шпанскихъ мушекъ**—*Camphora.*

При задержаніи мочи во время **беременности** или при **остановкѣ** регулъ: *Bell.* и *Pulsat.*

Отъ **спиртныхъ напитковъ** или пива: *N.-vom.* и *Puls.*

— **испуга** или **досады**: *Acon.* и *Chamom.*

— слѣдствій произвольнаго **задержанія во время ѣзды** и т. п. *N.-vom.*

Когда при сильномъ болѣзненномъ побужденіи моча вовсе не идетъ или идетъ **каплями**: *Cantharis* или *Mercurius.* Эти же средства соотвѣтствуютъ кровянистой и слизистой мочѣ.

Когда есть притомъ признаки **геморроя**: *Nux-vom., Sulph., Lycor.*

При задержаніи съ **судорожными** и **воспалительными** явленіями: *Camph., Bell., Digit.*

— задержаніи отъ **нервныхъ** причинъ: *Hyosc., Nux-vom.* и въ особенности *Opium.*

При задержаніи отдѣленія въ почкахъ: *Hellebor.*, а въ сильныхъ степеняхъ, когда угрожаетъ мочевоe зараженіе крови: *Arsen.*

— слишкомъ частомъ побужденіи: *Argent.*, *Bellad.*, *Hyosc.*, *Petros.*, *Pulsat.*, *Spigelia*, *Uva-ursi.*

— частомъ побужденіи по ночамъ: *Cornium*, *Nux-vomica*, *Belladonna.*

— произвольномъ мочеиспусканіи ночью, во снѣ: *Puls.*, *Bell.*, *Carb.-veg.*, *Cina*, *Herp.*, *Sulph.*, *Phos.*, *Kreos.*, *Arg.-nitr.*

— произвольномъ моченспусканіи вслѣдствіе слабости или паралича смыкающей мышцы мочевого пузыря: *Bell.*, *Ars.*, *Caust.*, *Dulc.*, *Phosph.*, *Puls.*, *Sulph.*, *Zinc.*

— мочетеченіи отъ страданія спиннаго мозга: *Nux-vom.*, *Rhus.*

— отхожденіи мочи отъ капля или смѣха: *Antim.-crudum* и *Zinc.*

— отхожденіи мочи отъ движенія: *Bry.* и *Puls.*

Относительно качества мочи могутъ быть приняты въ соображеніе слѣдующія указанія:

Бѣловатой, молочнистой соотвѣтствуютъ: *Dulc.*, *Jod.*, *Muriat.-ac.*, *Phosph.-ac.*

Бѣлокъ, содержащій (бѣлковинное мочеизнурение, Брайтова болѣзнь), *Canth.*, *Coloc.*, *Ferr.*, *Merc.*, *Phos.*, *Colch.*, *Kali-ars.*, *Terebinth.*, *Ars.*, *Cupr.*, *Aur.-m.*, *Calc.-phosph.*, *Calc.-arsen.*,

- Bry.*, *Hepar.-sulph.* (послѣ скарлатины) *Kalibichr.*, *Kali-nitr.*, *Natr.-s.*, *Benz.*, *Apis.*, *Laches.*
Гной содержащей: *Cannab.*, *Canth.*, *Clematis.*, *Merc.*, *Lycop.*
Жирной (съ пленкою): *Calc.*, *Hep.*, *Jod.*, *Sulph.*
Зеленоватой: *Colchic.*, *Camph.*, *Jod.*, *Magn.-carb.*, *Rheum.*
Коричневой: *Bry.*, *Antim-crud.*, *Chin.*, *Mercurius.*, *Phosph.*, *Puls.*
Черноватой: *Colch.*, *Lycop.*, *Asparag.*
Красной: *Acon.*, *Bell.*, *Bryon.*, *Merc.*, *Phosph.*
Кровянистой: *Ars.*, *Canth.*, *Calc.*, *Carb.-v.*, *Ipec.*, *Lycop.*, *Merc.*, *Terebinth.*
Мутной: *Tart.-emet.*, *Ars.*, *Chin.*, *Mercur.*, *Sepia.*
Свѣтлой, водянистой: *Con.*, *Ignat.*, *Coloc.*, *Arg-nitr.*
Слизистой: *Calc.*, *Canth.*, *Merc.*, *Puls.*
Острой, обѣдающей: *Cannab.*, *Caust.*, *Jod.*, *Kreos.*, *Mers.*, *Phosph.*, *Seneg.*
Остро пахнущей: *Tart.-emet.*, *Asa.*, *Phosph.*, *Rhod.*
Кисло пахнущей: *Calc.*, *Graph.*, *Natr.-carb.*, *Petros.*, *Sulph.*
Сахаръ содержащей: (сахарное мочензнурение): *Dulcam.*, *Ferr.*, *Jod.*, *Ammon.*
Гнилью пахнущей: *Calc.*, *Chin.*, *Nitr.-acid.*, *Phos.*, *Rhod.*, *Sulph.*
Съ красноватымъ осадкомъ: *Bell.*, *Graph.*, *Natr.-m.*, *Puls.*
 — **бѣловатымъ:** *Calc.*, *Merc.*, *Phos.*, *Sepia.*

- Съ желтоватымъ:** *Baryt.*, *Chin.*, *Cuprum.*,
Lycop., *Phosph.*
- **слизистымъ:** *Aur.*, *Chin.*, *Dulc.*, *Merc.*,
Natr-carb.
- **волокнистымъ:** *Cannab.*, *Canth.*, *Merc.*,
Nitr-ac.
- **песчанымъ:** *Calc.*, *Lycop.*, *Natr-mur.*, *Puls.*,
Sep., *Sil.*
- **глинистымъ:** *Ammon.-mur.*, *Ars.*, *Chin.*,
Sassap., *Sepia*, *Sulph.*
- **кристаллизированнымъ:** *Chin.*, *Ferr.*, *Co-*
locynth., *Lobel.*

2. ВОСПАЛЕНІЕ ПОЧЕКЪ, ПУЗЫРЯ И МОЧЕВАГО КАНАЛА.

Эти воспаленія отличаются особенною жесто-
костью и постоянствомъ боли. При воспаленіи по-
чекъ боль ощущается въ срединѣ спины, на чер-
тѣ пупка, по бокамъ позвоночнаго столба; при
воспаленіи пузыря—внизу живота, надъ лобкомъ.
Давленіе, сотрясеніе и движеніе ожесточаютъ. Мо-
ча отдѣляется въ маломъ количествѣ, коричневая,
красная, кровянистая, содержащая бѣлокъ и гной.
Сопровождается лихорадкою, боль въ бедрахъ
и ляжкахъ, гастрическими и нервными страда-
ніями.

Важнѣйшія средства:

Aconitum—послѣ простуды, испуга и другихъ волненій; при сильномъ общемъ жарѣ, колотѣ и жженіи въ почкахъ или пузырьѣ съ чувствительностью къ прикосновенію; при частыхъ напрасныхъ позывахъ на мочу и небольшомъ количествѣ красной горячей мочи.

Belladonna—при колющемъ жженіи въ поясничныхъ позвонкахъ, простирающемся въ пузырь и періодически усиливающимся; при жарѣ въ области почекъ съ рѣжущею болью; при маломъ количествѣ красной мочи, съ болью, натугой, тоскою, безпокойствомъ, особенно ночью; при чувствительности области пузыря и приливахъ крови къ голоу.

Cannabis: воспаленіе почекъ, пузыря и мочевого канала съ слизетеченіемъ; при тянущей, колющей или нарывной боли въ области почекъ, простирающейся въ паха; при тупомъ давленіи въ области почекъ, рѣжущей боли вдоль мочеточниковъ, по пахамъ, давленіи на пузырь съ задержаніемъ мочи; при отхожденіи мочи каплями, съ жженіемъ, съ рѣзью въ устьѣ канала; при частомъ испущеніи свѣтлой, водянистой, мутной или красноватой мочи; при раздвоеніи струи мочи.

Cantharis: воспаленіе почекъ, пузыря и мочевого канала, острое и хроническое. Задержаніе мочи, мочерѣзъ, моченье кровью. При лихорадкѣ, судорожной боли въ промежности и вдоль мочевого канала, простирающейся въ подтянутыя вверхъ ядра. При жгучей боли въ головкѣ, болѣзненныхъ

эрекціяхъ, колотыи, рѣзы и стрѣляніи въ спину и ляжки, съ ожесточеніемъ отъ давленія и движенія. При дергающей боли въ почкахъ; чувствительности пузыря къ нажиму, съ колющей, саднящей и жгучей болью; сильныхъ позывахъ на мочу съ отхожденіемъ каплями, судорогами въ пузырь; кровотеченія, рѣзы, колотыи, жженія передъ и послѣ испущенія мочи. При совершенномъ задержаніи мочи. При ознобѣ, холодѣніи рукъ и ногъ, позывахъ на низъ, рвотѣ, тоскѣ, сильной жаждѣ, маломъ пульсѣ, корчѣ членовъ. При слизистомъ, кровянистомъ и песчаномъ осадкѣ въ мочѣ.

Sulphur—въ хроническихъ состояніяхъ, у подагриковъ и геморроидалистовъ; при злоупотребленіи спиртныхъ напитковъ. Моченье кровью, мочерѣзь, задержаніе мочи съ натугой, жженіемъ, рѣжущею болью и колотьемъ, особенно въ каналѣ. Слизетеченіе. Моча бурокрасная, темная, кровянистая, слизистая, бѣловатая, очень вонючая, съ мучнистымъ, розовымъ осадкомъ, пристающимъ къ посудѣ. При запорѣ и ипохондрии.

Terebinthina—въ хроническихъ состояніяхъ. Моченье кровью. Боль въ почкахъ. Судорожные напоры и давленіе въ пузырь, къ почкамъ и отъ почекъ внизъ по пахамъ. Передъ испущеніемъ мочи натуга и рѣзь въ пузырь, облегчаемые движеніемъ. При испущеніи мочи нестерпимое жженіе въ пузырь и каналѣ. Моча красная, кровянистая, густая, слизистая, содержащая бѣлокъ и клочья слизистой оболочки.

3. КАТАРРЪ МОЧЕВАГО ПУЗЫРЯ И КАНАЛА.

То и другое часто встрѣчается въ связи съ брюшнымъ полнокровіемъ и геморроемъ, или у стариковъ, или отъ половыхъ причинъ, при утолщеніи и другихъ матеріальныхъ измѣненіяхъ пузыря. То и другое страданіе имѣетъ характеръ всѣхъ другихъ катарровъ: близко граничитъ къ воспаленію, оказываетъ слизетеченія въ различныхъ степеняхъ, переходящія въ припуханіе, утолщеніе или расслабленіе слизистой оболочки. Въ мочѣ оказываются различныя примѣси гноя и крови. Боль очень разнообразна. Нерѣдко встрѣчается и задержаніе мочи. При воспалительномъ характерѣ, особенно въ началѣ, пригодны: *Cannab.*, *Canthar.* и *Merc.*; при переходѣ изъ воспалительнаго въ катарральный или хроническій: *Sulph.*, *Terebinth.* и *Nitri-acid.*; при чисто катарральномъ свойствѣ: *Calc.*, *Dulc.*, *Pulsat.*, *Nux-vom.*; въ хроническихъ состояніяхъ: *Lycop.*, *Sep.*, *Sulph.*, *Uva-ursi* и *Senega*. Въ хроническихъ состояніяхъ съ воспаленіемъ и при подозрѣваемомъ нагноеніи, съ болью: *Arsen.*, безъ боли *Hep.-sulph.* При такъ называемой молочной мочѣ, когда слизь створаживается уже въ пузырь: *Phosph.-acid.*

4. НЕРВНЫЯ И СУДОРОЖНЫЯ СТРАДАНИЯ МОЧЕВЫХЪ ОРГАНОВЪ.

Мочеръзъ, боль при испусканіи мочи, и **задержаніе мочи**, трудное моченье, большею частью зависятъ отъ воспаленія, катарра или органическихъ причинъ и рѣдко бываетъ чисто судорожнаго свойства. При невозможности точно опредѣлить причину страданій, слѣдуетъ обратить особенное вниманіе на характеръ боли. При перемежающейся, схватывающей, стягивающей боли пригодна *Bellad.*; при натужной: *Hyosc.* или *Con.*; когда есть признаки воспаленія *Acon.*; въ связи съ катарромъ: *Pulsat.*

Боль въ почкахъ, большею частію сопровождающаяся образованіемъ камней, обыкновенно ощущается въ нижнихъ боковыхъ частяхъ спины и оттуда тянется вдоль мочеточниковъ въ животъ, область пузыря, ядра и ляжки. Она ожесточается отъ горячительнаго питья и пищи, ѣзды, ходьбы, лежанья на спинѣ; въ сильной степени колики сопровождается икотою, рвотой, тоской, холоднымъ потомъ и обморокомъ. Въ началѣ, при не очень жестокой боли, главное средство *Lycop.*; при частыхъ позывахъ на мочу *Puls.*; при очень сильной коликѣ *Colocynth.*, *Bell.* или *Op.* въ судорожной или *Canthar.* въ воспалительной формѣ.

Судороги мочевого пузыря, съ частыми позывами или съ задержаніемъ мочи сопряжен-

ное болѣзненное стягиваніе пузыря, часто происходитъ отъ воспаленія, катарра или отъ органическихъ и даже механическихъ причинъ (заваловъ сгустками крови, слизи, камней), но встрѣчается и какъ чисто нервное страданіе. При преобладаніи первыхъ изъ поименованныхъ причинъ бываютъ пригодны: *Canth.*, *Cannab.*, *Terebinth.*; при напорѣ мочи въ особенности *Pulsat.* При страданіи нервномъ по преимуществу: *Nux-vom.*, *Bell.*, *Hyosc.*, *Op.*, *Phosph.*; при ревматизмѣ: *Cham.*, *Rhus.*; при камнѣ *Sassaparilla*.

5. ОРГАНИЧЕСКІЯ БОЛѢЗНИ МОЧЕВЫХЪ ОРГАНОВЪ.

Почки могутъ заболѣвать бугорчаткою (туберкулами чахотки, ракомъ, червями, жировымъ перерожденіемъ, зернистымъ или бѣлковиннымъ перерожденіемъ (Брайтова болѣзнь), нагноеніемъ, размягченіемъ, атрофіей и т. д. Они могутъ даже смѣщаться (такъ называемая блуждающая почка, обыкновенно вслѣдствіе механическихъ причинъ, ушиба, паденія на задницу и т. д.). **Мочевой пузырь** можетъ утолщаться, ссуживаться, расширяться, пухнуть, нагнаиваться. **Мочевой каналъ** очень часто ссуживается послѣ слизетечений и нераціональнаго леченія ихъ. Наконецъ **песокъ** и **камни** могутъ образоваться въ почкахъ и пузырьѣ и проходить по мочеточникамъ,

причиняя многоразличныя страданія. Распознаваніе всѣхъ этихъ состояній, конечно требуетъ много знанія и большой опытности и, при всемъ томъ, самое леченіе трудно тѣмъ болѣе, что многія изъ нихъ неизлечимы. Къ устраненію страданій при бѣлковинномъ перерожденіи почекъ, одной изъ главныхъ причинъ водяной, служатъ: *Bry.*, *Colch.*, *Helleb.*, *Arsen.*; при другихъ органическихъ болѣзняхъ: *Arsen.*, *Calc.*, *Lycop.*, *Merc.*, *Sulph.*, смотря по симптомамъ.

Отъ страданій, сопровождающихъ **каменную болѣзнь**, болѣе или менѣе успѣшно избавляютъ: *Bell.*, *Cannab.*, *Lycop.*, *Petrol.*, *Sassapar.*, *Sulph.*, *Uva-ursi*. Для радикальнаго излеченія, еще спорнаго, были предложены: *Calc.*, *Natr-mur.*, *Petrol.*, *Silic.*, *Sulph.*

Противъ воспаленія и опухоли послѣ **гонорреи**:

Clemat. 2 и, въ болѣе трудныхъ случаяхъ: *Merc-bijod.* 3.

— **отвердѣній** съ перерожденіемъ: *Aur.*, *Brom.*, *Jod.*, *Graph.*, *Con.*; при **туберкулезномъ** расположеніи: *Baryt.*

— **нервныхъ болей** и **судорожнаго подтягиванія**: *Nux-vom.* или *Zinc.*

6. ГОНОРРЕЯ, ТРИППЕРЪ, ПЕРЕЛОЙ.

Большая часть патологовъ новѣйшаго времени соглашается, что трипперъ не принадлежитъ къ

сифилитическимъ болѣзнямъ, а составляетъ своеобразное заразительное катарральное воспаленіе слизистой оболочки мочевого канала. Воспаленіе и припуханіе слизистой оболочки начинается съ устья мочевого канала и постепенно подвигается далѣе вверхъ, причемъ отдѣляется гноевидная слизь, въ болѣе или менѣе значительномъ количествѣ, иногда при напряженіи кровь; нажимъ на каналъ причиняетъ боль. Воспаленіе отъ канала можетъ перейти на пузырь, предстательную железу, ядра, лимфатическіе сосуды и паховыя железы. При распространеніи воспаленія на клетчатку, окружающую каналъ, могутъ образоваться инфильтраціи и нарывы или же стриктуры. Когда воспаленіе мочевого канала переходитъ въ хроническое состояніе, то краснота отверстія канала блѣднѣетъ, но слизистая оболочка остается припухлою, иногда покрывается грибовидными наростами. Трипперъ всегда происходитъ отъ непосредственнаго переноса триппернаго яда, отъ соприкосновенія съ пораженною этимъ ядомъ слизистой оболочкой. Нѣкоторые субъекты только больше, другіе меньше расположены къ принятію заразы. Между первымъ моментомъ привитія и обнаруженіемъ болѣзни проходитъ отъ 3—8 до 14 дней. Начало болѣзни обнаруживается щекотаніемъ въ концѣ канала и залипаніемъ покраснѣвшаго выхода жидкою слизью. При нажимѣ слизь выступаетъ каплями, сначала безъ боли. Являются частые позывы на мочу. Постепенно оказывается жгучая боль, особенно

при испусчении мочи. Слизь обращается въ гной. Отверстіе запухаетъ. Иногда образуется отечная опухоль крайней плоти, сопровождающаяся гноевиднымъ отдѣленіемъ около головки (наружная или ложная гоноррея). Иногда крайняя плоть опухаетъ до защемленія (phimosis и paraphimosis). Эрекціи бываютъ чрезвычайно болѣзненны. Въ первые 8—10 дней отъ начальныхъ признаковъ болѣзни постепенно усиливается до высшей точки воспаленія; затѣмъ краснота и боль при испусчении мочи начинаютъ спадать, но количество истечения увеличивается. Къ концу 3—4 недѣли истечение становится блѣднѣе, слизистѣе и прекращается или же обращается въ хроническое. Острый трипперъ рѣдко длится менѣе 4 недѣль; чаще же продолжается 6—8 недѣль. Срокъ на осложненія вовсе не можетъ быть опредѣленъ. Хроническій трипперъ часто затягивается очень надолго. У туберкулезныхъ онъ даже очень трудно излечимъ. Нельзя сказать, впрочемъ, чтобы и леченіе остраго триппера было дѣломъ легкимъ. Изъ множества предложенныхъ средствъ, конечно, пригодныхъ въ различныхъ обстоятельствахъ этой болѣзни и часто дѣйствовавшихъ успѣшно, нельзя указать ни на одно, которое бы заслуживало названія специфическаго. Обыкновенно употребляютъ: *Cannab.*, *Petrosel.*, *Merc.-sol.*, *Petrol.*, *Clemat.* Д-ръ Кафка вмѣсто *Cannabis sativa* употребляетъ *Cannab. indica* 1 (8—10 капель на стаканъ воды, черезъ часъ по ложкѣ), которую находитъ гораздо болѣе

дѣйствительною, когда уже наступилъ мочерѣзъ и болѣзненные эрекции. Въ началѣ, при первыхъ признакахъ зараженія онъ даетъ *Sulph.* 6, по 2 приѣма въ день, чѣмъ часто упреждается развитіе воспаления или по-крайней-мѣрѣ, во всякомъ случаѣ, предупреждаются важныя осложненія. При чрезвычайно сильномъ мочерѣзѣ, отхожденіи мочи каплями, натугѣ, жгучей боли въ пузырь и болѣзненныхъ эрекціяхъ *Cantharis* 3, въ частыхъ приѣмахъ. При сильной опухоли, густомъ гноевидномъ истеченіи и при гнойномъ выпотѣ около головки *Merc.-sol.* 3 или *N.-vom.* 3 въ частыхъ приѣмахъ. При распространеніи воспаления мочевого канала на окружающую кѣтчатку и образованія **отвердѣній** *Merc.-sol.* или *Jod.* 3. При **опухоли крайней плоти** *Bell.*, *Hep.*, или *Jod.* При боли и чрезвычайной чувствительности промежности (**воспаленіи предстательной железы**),—обстоятельствѣ весьма важномъ и требующемъ неусыпнаго вниманія, — *Bell.* 3, въ растворѣ, черезъ часъ или полтора по приѣму и въ то же время наружно, въ видѣ мази, *Bellad.* 0, 15 капель на унцію сала. Если же *Bell.* не оказываетъ достаточно быстраго дѣйствія, то взять *Atrop.* 3, точно также. По укрощеніи боли, для скорѣйшаго разрѣшенія дается *Merc.* 3 въ частыхъ приѣмахъ. Если притомъ оказывается задержаніе мочи, то слѣдуетъ обратиться къ *Canth.*, *Hyosc.* или *Stramon.* При воспаленіи и **опухоли ядра** или придатка *Bell.* или *Atrop.* до уничтоженія

жара и боли, а потомъ при твердой опухоли *Merc.-sol.*, *Clemat.*, *Jod.*, *Nitr-ac.*; при мягкой (жидкомъ эксудатѣ) *Puls.*, *Arn.*, *Rhodod.* или *Aur.*

Во время воспалительнаго періода страданія ядра больной непремѣнно долженъ лежать. При трипперѣ вообще необходимо носить суспензорій и избѣгать значительныхъ движеній.

7. ОПУХОЛЬ И ВОСПАЛЕНИЕ ЯДЕРЪ.

Когда опухоль или воспаленіе ядра происходитъ вслѣдствіе ушиба или инаго механическаго поврежденія, то нужно прежде всего употребить *Arn.* внутрь и снаружи. Полезна бываетъ и *Aconit.* Если послѣ этого будетъ оставаться опухоль или чувствительность, то соотвѣтствуетъ *Conium.*

Опухоль и воспаленіе ядра вслѣдствіе гонорреи объяснены въ предыдущей статьѣ.

Иногда воспаленіе околоушной железы или заушница переходитъ на шюлята, и тогда помогаютъ: *Merc.* или *Bell.* Последняя въ особенности, если есть признаки пораженія мозга.

Противъ **хроническихъ** опухолей и затвердѣній шюлятъ хорошо дѣйствуютъ: *Aur.*, *Clemat.* и *Spong.*

— затвердѣнія, угрожающаго переходомъ въ **туберкулы** или **ракъ**: *Baryt.* и *Conium.*

Противъ **ВОДЯНКИ** шудать: *Graph.*, *Jod.*, *Rhod.*, *Sil.*

— **атрофіи**, **сухотки** или уменьшенія шудать: *Jod.*

— **лишаевъ** и **сыпи** на мошонкѣ: *Aur.*, *Nitr.-ac.*, *Petros.*

— **зуда** и **жженія** безъ сыпи: *Ign.*, *Merc.*, *Petr.*

8. СИФИЛИСЪ.

Сифилисъ заражаетъ не иначе, какъ черезъ непосредственное соприкосновеніе больного со здоровымъ. Заразительное начало заключается въ гноѣ сифилитической язвы, производящемъ при прикосновеніи на мѣстахъ, имѣющихъ очень нѣжную кожу, ограниченное воспаленіе, которое переходитъ въ язву, или такъ называемый шанкръ. Когда послѣ этого первоначальнаго или мѣстнаго шанкра, спустя нѣкоторое время, появляются другія подобныя болѣзни кожи или слизистой оболочки и притомъ на мѣстахъ, отъ перваго болѣе или менѣе отдаленныхъ, то это называется вторичнымъ или общимъ сифилисомъ (*Syphilis secundaria*), который столько-же заразителенъ, какъ и первоначальный. Кромѣ полового сообщенія, зараженіе можетъ послѣдовать черезъ ротъ,—поцѣлуй, стаканъ, ложку, трубку или сигару, отъ кормилицы къ ребенку и на оборотъ,—и черезъ

руки или нечистые инструменты, — отъ больной къ бабкѣ или изслѣдующему врачу, если на рукѣ была незамѣченная ссадина или ранка. Вообще зараженіе быстрѣе прививается, если прикасающаяся кожа поранена. Части тѣла, имѣющія толстую кожу и цѣльную кожицу, не подвергаются зараженію.

Шанкръ бываетъ: 1) простой, мягкій, 2) твердый, 3) разѣдающій и 4) гангренозный.

Въ началѣ всякій шанкръ составляетъ болѣзнь мѣстную и является въ видѣ маленькаго жгучаго пузырька на красномъ, воспаленномъ пятнѣ, черезъ 3—6 дней послѣ зараженія.

Развившійся **простой шанкръ** обыкновенно представляетъ неправильно круглую язву съ рѣзко очерченными, мягкими, вызубренными краями и сальнымъ дномъ, отдѣляющимъ гноевидную жидкость. При успѣшномъ леченіи, салу подобная масса постепенно уничтожается и гной изъ жидкаго обращается въ доброкачественный, края перестаютъ расширяться и язва наполняется здоровою грануляціей. По заживаніи остается лучистый бѣлый рубецъ. Иногда встрѣчается по нѣскольку шанкровъ рядомъ. Простой мягкій шанкръ излечается иногда въ 2—3 недѣли, но иногда длится и долѣе. Онъ часто сопровождается бубономъ, опухолью крайней плоти или мокнущимъ воспаленіемъ внутренней поверхности крайней плоти (наружною гонорреей).

Твердый шанкръ, Гунтеровскій, имѣтъ твердые, волнообразные, багровые края и затвердѣлое основаніе. Излеченіе твердаго шанкра всегда требуетъ гораздо болѣе времени и не можетъ считаться законченнымъ, пока есть неразрѣшившіеся остатки затвердѣнія, хотя-бы самая язва и была заживлена. Отъ него чаще всего развивается общій или вторичный сифилисъ.

Разъѣдающій шанкръ развивается преимущественно и у безъ того худосочныхъ субъектовъ изъ мягкаго, или же вслѣдствіе непомѣрнаго меркуріальнаго леченія. Онъ обыкновенно имѣтъ неправильную форму, сѣроватое или зеленоватое дно и быстро расширяется при отдѣленіи жидкаго, очень вонючаго гноя.

Гангренозный шанкръ или пораженіе антоновымъ огнемъ можетъ развиваться, какъ изъ мягкаго, такъ и изъ твердаго шанкра, особенно при осложненіи сильнымъ воспаленіемъ, опухолью и защемленіемъ крайней плоти, раздраженіи и напряженіи воспаленныхъ частей, злоупотребленіемъ спиртныхъ напитковъ, госпитальною заразою, накопленіемъ неочищеннаго гноя и т. д. На пораженномъ мѣстѣ образуется свинцоватаго цвѣта струпу, впослѣдствіи чернѣющій, нечувствительный и окруженный красною опухолью. Распространеніе этого помертвенія не только причиняетъ значительное разрушеніе, но можетъ угрожать и самой жизни.

Шанкръ мочевого канала трудно бываетъ отличить; впрочемъ, онъ и встрѣчается очень рѣдко.

Разрушительныя дѣйствія слишкомъ усерднаго меркуріальнаго леченія сифилиса давно уже начали побуждать специалистовъ отыскивать иныхъ средствъ. Многіе аллопаты нынче совершенно отвергаютъ меркуріальные препараты. Гомеопатія также давно уже указываетъ на опасное не менѣе сифилиса леченіе, производящее меркуріальное худосочіе, и различаетъ формы, которымъ соответствуетъ меркурій, отъ формъ, требующихъ иныхъ, столько-же дѣйствительныхъ средствъ, постоянно предупреждая, впрочемъ, отъ наружныхъ притравъ или такъ называемой абортивной metody, — прижиганія ляписомъ, отъ котораго чаще всего потомъ оказывается вторичный или общій сифилисъ. Сверхъ того въ послѣднее время большинство гомеопатовъ пришло къ убѣжденію, что сифилисъ высокими дѣленіями лекарствъ не лечится, а требуетъ непременно низшихъ дѣленій 2—3, т. е. дозъ сравнительно массивныхъ. Прежде чаще всего употреблявшійся *Merc.-solub.*, также найденъ мало дѣйствительнымъ. Главнымъ средствомъ противъ **простаго** мягкаго шанкра служить *Merc.-corros.* 2 дѣленія, по 1 грану утромъ и вечеромъ. Другіе назначаютъ третьяго дѣленія и въ болѣе частыхъ пріемахъ, напр. черезъ три часа. Снаружи на язву накладывается миндальное масло на корпій. Впослѣдствіи, когда въ окружности уже нѣтъ воспаления и опухоли и края язвы не

болятъ, Кафка прикладываетъ вмѣсто масла растворъ сулемы (1 гр. на 2 унціи воды) на корпій, перемѣняя 2 — 3 раза въ день. Въ діетѣ устраняется все горячительное. Предписывается совершенно спокойное положеніе. Содержаніе въ чистотѣ, мѣстныхъ тепловатыхъ ванны 2—3 раза въ сутки, составляетъ необходимое условіе. Если-бы по особенностямъ расположенія больного, оказалось, что *Merc.-corros.* не дѣйствуетъ, какъ нужно, и въ 2—3 недѣли нѣтъ измѣненія, то слѣдуетъ вмѣсто этого препарата взять *Cinnabaris* или *Merc.-praecuribet* въ томъ же дѣленіи и въ той-же дозѣ.

Противъ твердаго шанкра, требующаго прежде всего разрѣшенія отвердѣній, всего успѣшнѣе (по мнѣнію Кафки) дѣйствуетъ *Kali-hydrjod.* X. 1. *) по двѣ капли, 2 — 3 раза въ день, прибавляя черезъ каждые три дня по одной каплѣ до тѣхъ поръ, пока не послѣдуетъ смягченія отвердѣвшихъ частей, что совершается обыкновенно недѣли въ 3—4. Затѣмъ приемы продолжаются въ постепенно уменьшаемыхъ дозахъ до совершеннаго излеченія, въ 6—8 недѣль. Если втеченіи 3 — 4 недѣль нѣтъ замѣтнаго дѣйствія, то къ данной порціи раствора іодистаго кали, Кафка прибавляетъ

*) Кафка въ этомъ случаѣ употребляетъ собственно не общепринятаго дѣленія, а *Kali hydrjod.* 1 драхму на 2 драхмы виннаго спирту и 2 драхмы воды, и даетъ этого раствора, начиная съ одной капли. Двѣ капли перваго десятичнаго дѣленія дадутъ то же самое количество лекарства.

4 капли тинктуры іода, для возбужденія болѣе сильной реакціи. (Этого-же можно достигнуть просто вставкою одного или двухъ приѣмовъ въ день *Jod.* 3). Потомъ дается *Merc.-jod.* 2, по два приѣма въ день, прибавляя черезъ каждые три дня по приѣму до явнаго улучшенія. Потомъ, въ томъ же порядкѣ количество лекарства уменьшется или берется дѣленіе повыше. Наружно на твердый шанкръ ничего не прикладывается, кромѣ сухой кории или съ миндальнымъ масломъ. Даже самый слабый растворъ сулемы только поддерживаетъ отвердѣніе.

Противъ **разъѣдающаго** шанкра употребляется *Nitri-acid.* 1, черезъ два часа по приѣму. Этимъ уничтожается вредъ, причиненный ртутью. Но вмѣстѣ съ тѣмъ организмъ бываетъ въ этихъ случаяхъ такъ истощенъ, что требуетъ возможно скорого поправленія питанія. На это — хорошее средство *Chinin-arsenic.* 1, черезъ 4 часа по приѣму.

При **гангренозномъ** шанкрѣ первая надобность — прервать ходъ помертвѣнія. Для этого извѣстныя средства: *Arsen.* 3, *Laches.* 6, *Sec.-corn.* 3 и *Chin.* 3, а затѣмъ леченіе оканчивается, при хорошихъ сокахъ больного *Merc.-corros.*, а при худосочіи такъ, какъ показано при разъѣдающемъ шанкрѣ.

Бубонъ. Мягкій шанкръ иногда сопровождается воспалительною опухолью паховыхъ железъ, переходящею въ нагноеніе. При твердомъ шанкрѣ

этого нагноенія не бываетъ: случаются только не-
болящія бубоны и холодныя отвердѣнія. Противъ
воспалительнаго бубона важнѣйшее средство *Merc.-*
corros. особенно, когда онъ является какъ ослож-
неніе, равнѣ заживленія шанкра. Противъ небо-
лящаго, особенно *Cinnabar.* и *Merc.-jod.* Кромѣ
того бывають пригодны *Nitr-ac.*, *Kali-hydrjod.* и
Arsen., смотря по характеру шанкра. Бывають
нужны также *Apis.*, при сильномъ воспаленіи и
чрезвычайной чувствительности; *Hep.-sulph.* и *Sil.*
при продолжительномъ и дурномъ нагноеніи; *Thuj.*
при осложненіи бородавчатыми наростами около
головки или задняго прохода.

При созрѣвшемъ нагноеніи бубонъ долженъ
быть вскрытъ, и слѣдуетъ заботиться о свободномъ
отхожденіи гноя и о чистотѣ раны.

Вторичный, третичный и наслѣдственный сифи-
лисъ требуютъ такихъ сложныхъ соображеній, что
мы не можемъ дать имъ мѣста здѣсь, гдѣ пред-
полагается дать только самонужнѣйшія указанія
для тѣхъ, кто съ первоначальною болѣзнью не
имѣетъ возможности обратиться къ знающему
врачу.

9. РАЗСТРОЙСТВО РЕГУЛЬ И СО- ПРОВОЖДАЮЩІЯ ИХЪ СТРАДАНІЯ. КРОВОТЕЧЕНІЯ.

Мѣсячное очищеніе для многихъ женщинъ со-
ставляетъ источникъ разнообразныхъ и часто же-

стокихъ страданій, которыя перѣдко еще усиливаются отъ множества бесполезныхъ и даже опасныхъ, такъ называемыхъ кровегонныхъ средствъ въ большихъ приѣмахъ. Главныя причины этихъ разстройствъ—неправильный образъ жизни, горячительная пища, недостатокъ тѣлесныхъ упражненій, ночныя бдѣнія, раздраженіе воображенія и простуда во время регуль. Всѣ эти причины дѣйствуютъ въ особенности сильно во время формировація дѣвушки, или при наступленіи первыхъ регуль. Отсюда происходитъ, что въ большихъ городахъ такъ много хворыхъ, золотушныхъ и слабыхъ женщинъ, страждущихъ бѣлями, блѣдною немочью, истерикой и разными органическими разстройствами, которыя отравляютъ и сокращаютъ жизнь не только имъ, но и дѣтямъ ихъ.

При леченіи разстройства регуль и происходящихъ отъ того страданій прежде всего необходимо установить порядокъ образа жизни и діетическаго содержанія. Всѣ массивныя кровегонныя средства, какъ вредныя, строго запрещаются. Горячія ножныя ванны, къ которымъ такъ часто прибѣгаютъ, тоже могутъ быть употребляемы только съ величайшею осторожностью, потому что въ бѣльшей части случаевъ онѣ бесполезны, а при дѣйствительномъ недостаткѣ крови могутъ сдѣлаться весьма вредными.

Остановка регуль у дѣвушекъ есть большею частью слѣдствіе блѣдной немочи, которую и слѣдуетъ лечить. Когда регулы очень слабы, кратко-

временны или иногда прерываются, то большею частью соотвѣтствуетъ *Pulsat.*, какъ то видно и по указаніямъ при леченіи блѣдной немочи (смотри это). При явномъ малокровіи полезны: *Puls.*, *Chin.* и *Calc.*, также *Ferr.* При застоѣ крови или брюшномъ полнокровіи: *Nux-v.*, *Sep.*, *Sulph.* При ѣдкихъ, вонючихъ бѣляхъ *Nitri-acid.* Когда вмѣсто регулъ является кровотеченіе изъ носу или другихъ частей, съ головокруженіемъ, головною болью и т. д., то преимущественно приличны *Bell.* и *Bry.*

Противъ спазмовъ, судорогъ, рѣзи, колики или сильной боли въ животѣ во время регулъ самыя лучшія средства: *Bell.*, *Cham.*, *Coccul.*, *Coff.*, *Kali-carb.*, *Nux-v.*, *Plat.*, *Puls.* и *Sepia.*

Belladonna прилична въ особенности при замедленіи и недостаточности регулъ съ ощущеніемъ гнетенія внизу живота и на проходѣ, съ жаромъ и краснотою лица, головною болью и головокруженіемъ.

Calcarea при золотушномъ сложеніи, приливахъ къ головѣ, сверлящей головной боли, головокруженіи, слабомъ пищевареніи, коликахъ, боли въ поясницѣ, одышкѣ, бѣляхъ, тяжести въ членахъ.

Chamomilla при рановременномъ и обильномъ истеченіи; при сильной боли и чувствительности всего живота къ прикосновенію; при боляхъ въ поясницѣ, похожихъ на родовыя потуги; при поносистыхъ испраженіяхъ, темной крови сгустками и блѣдности лица.

China: при блѣдной немочи, малокровіи, дряблости мускуловъ, нервной слабости и раздражительности, блѣдности лица, давленіи въ головѣ, слабомъ пищевареніи, бессонницѣ и худобѣ.

Cocculus: при недостаточномъ истеченіи, давящихъ боляхъ, тошнотѣ, слабости, обморокахъ, стѣсненіи груди, вздохахъ, столахъ и тоскѣ.

Coffea: при сильномъ кровотеченіи и напряженіи въ животѣ, какъ-будто лопнуть хочетъ или какъ-будто кишки разрѣзываютъ, съ отчаяніемъ, корчами, скрежетаніемъ зубовъ, крикомъ, метаніемъ, холодѣніемъ и коченѣніемъ членовъ.

Kali-carbonicum: при общей слабости, дрожаніи, ознобѣ, безпокойствѣ, рѣзи и давленіи въ поясницѣ, запорѣ и въ особенности когда регулы слишкомъ рано приходятъ или слишкомъ долго продолжаются.

Nitri-acidum: при задержаніи регулъ; при судорожной боли и давленіи внизъ во время теченія; при бѣлыхъ, темныхъ, сукровичныхъ, вонючихъ бѣляхъ.

Nux-vomica: когда регулы слишкомъ рано приходятъ, бываютъ обильны и продолжительны; при ощущеніи закручиванья, пученья въ животѣ; при тошнотѣ, запорѣ, напрасныхъ позывахъ на низъ и на мочу, головной боли и раздражительномъ, сварливомъ расположеніи духа.

Platina: при обильномъ продолжительномъ истеченіи густой черной крови съ давящею болью.

въ частяхъ, частымъ побужденіемъ на мочу; при мнительности, плаксивости и уныніи.

Pulsatilla: при замедленномъ, недостаточномъ истеченіи жидкой водянистой крови; тяжести внизу живота, какъ-будто камень лежитъ; давленіи какъ въ родовыхъ потугахъ; частыхъ позывахъ на низъ, зябкости, остываніи ногъ и плаксивости.

Serpi: когда крови отходитъ мало и послѣ того долго продолжается слизистое истеченіе съ болью и давленіемъ въ животѣ, мигренью, тяжестью въ рукахъ и ногахъ, и хандрѣ.

Sulphur: при замедленіи и задержаніи регулъ съ болью; при отхожденіи блѣдной крови или очень густой, черной; при кислотахъ въ желудкѣ, изжогѣ, давленіи подъ ложечкой и другихъ разстройствахъ пищеваренія; при коликѣ и частомъ побужденіи на мочу, запорѣ или поносѣ съ слизистыми испражненіями; при геморроидальныхъ шишкахъ, боли въ поясницѣ, слабости въ ногахъ, головной боли, одышкѣ, біеніи сердца, накожныхъ сыпяхъ, нервномъ утомленіи и меланхолическомъ настроеніи духа.

Когда регулы сопровождаются дѣйствительными **судорогами** или подергиваніями въ конечностяхъ, то соотвѣтствуютъ преимущественно *Coffea*, *Secale cornutum*, *Ignatia*, *Cuprum* и *Coccus*.

Противъ чрезвычайно **обильнаго** мѣсячнаго и противъ **кровотеченій** во время **беременности** и родовъ главныя средства: *Arn.*, *Bell.*,

Cham., *Chin.*, *Croc* , *Ferr.*, *Ipec.* *Kreos.*, *Puls.*, *Sabin.* и *Sec.-corn.*

Когда кровотечение произошло отъ **механической причины**, то важнѣйшее средство во всякомъ случаѣ *Arn.*

Когда у слабыхъ, блѣдныхъ и малокровныхъ женщинъ регулы являются **слишкомъ часто** или обильно и угрожаютъ истощеніемъ, то давать *Calc.* довольно долго въ промежуткахъ между сроками регуль.

Когда во время родовъ оказывается неумѣренное **кровотеченіе**, то приличны въ особенности *Ipec.*, *Puls.* и *Sec.-corn.*, а при **выкидахъ** *Sabina* и *Ipec.*

При очень **значительной** потерѣ крови, когда является головокруженіе, обмороки, блѣдность и холоднѣіе конечностей, приличны бываютъ: *Chin.* и *Ferrum*.

Женщинамъ крѣпкаго сложенія и **полнокровнымъ**, когда кровотеченіе происходитъ отъ прилива и общаго раздраженія кровеносныхъ сосудовъ, особенно приличны: *Bell.*, *Arn.*, *Sabin.* и *Kreos.*

Слабымъ, **истощеннымъ**, когда кровотеченіе происходитъ отъ слабости и лѣности матки или недостатка сократимости кровеносныхъ сосудовъ: *Chin.*, *Croc.*, *Ferr.*, *Puls.*, *Sec.-corn.*

При отхожденіи густой **черной** крови: *Cham.*, *Croc.*, *Plat.* *Sabin.*

При свѣтлой, **ВОДЯНИСТОЙ**: *Bell., Ferr., Chin., Ipec.*

При всѣхъ кровотеченіяхъ кромѣ лекарствъ необходимо спокойное и горизонтальное положеніе, а при леченіи собственно слѣдуетъ сравнить также все сказанное о болѣзняхъ беременных и роженницъ.

Когда вмѣсто регулъ текутъ бѣли, слизь или же бѣли прежде или послѣ регулъ постоянно являются, то въ первомъ случаѣ въ особенности соотвѣтствуютъ: *Chin.* и *Puls.* въ послѣднемъ *Kreos.* и *Sep.*

10. БѢЛИ.

Эта неспріятная и чрезвычайно распространенная болѣзнь состоитъ въ катарральномъ воспаленіи слизистой оболочки рукава или, рѣже, матки, мочевого канала, и въ большей части случаевъ есть только симптомъ или послѣдствіе другого общаго болѣзненнаго состоянія. Чаще всего главною причиною бываетъ малокровіе или блѣдныя немочь; также излишнія или слишкомъ раннія половыя и другія ослабляющія раздраженія.

При леченіи прежде всего необходимо устранить ближайшую поддерживающую страданіе причину и устроить правильную во всѣхъ отношеніяхъ діету и содержаніе. Причина должна быть также принята въ соображеніе и при выборѣ лекарства.

При **блѣдной немочи** и разслабленномъ состояніи соотвѣтствуютъ преимущественно *Pulsat.*, *Ferr.*, *Calc.*, *China*, *Natr.-mur.*, *Phosph.*

При **воспалительномъ** состояніи и мѣстномъ раздраженіи: *Alumina*, *Jod.*, *Merc.*, *Sabina*, *Sepia*, *Thuja*.

При **худосочномъ** состояніи матки или другихъ органовъ: *Argent-nitr.*, *Arsen.*, *Kreos.*, *Sulph.*, *Graph.*

По отдѣльнымъ симптомамъ:

При простомъ **слизистомъ** отдѣленіи бѣлаго, или желтаго цвѣта: *Calc.*, *Natr.-mur.*, *Puls.*,

— **гноевидномъ**: *Merc.*, *Nitri-ac.*, *Sepia*, *China*.

— **жидкомъ водянистомъ**: *Alum.*, *Graph.*, *Ferr.*, *Jod.*, *Sabina*.

— **густомъ**: *Arsen.*, *Bovista*, *Mezer.*, *Natr.-mur.*, *Puls.*, *Sep.*, *Zinc.*

— **объѣдающемъ**: *Alum.*, *Arsen.*, *Jod.*, *Kreos.*, *Merc.*, *Sil.*, *Sulph.*

— **дурно-пахнущемъ**: *Kreos.*, *Nitri-ac.*, *Sabina*.

— **зеленоватомъ**: *Carbo-veg.*, *Kreos.*, *Merc.*, *Sabina*, *Sulph.*

— **кровянисто-слизистомъ**: *China*, *Calc.*, *Kreos.*, *Lycop.*, *Nitr.-ac.*

— **желтоватомъ**: *Arsen.*, *Kali*, *Lycop.*, *Sep.*

— **бѣломъ молочнистомъ**: *Calc.*, *Ferr.*, *Lycop.*, *Natr.-mur.*, *Puls.*, *Sabina*, *Sepia*, *Silic.*, *Zinc.*

При слабости и истощеніи: *Calc.*, *China*,
Kreos, *Natr.-mur.*, *Puls.*, *Sepia*.

— блѣдности лица: *Arsen.*, *Calc.*, *Graph.*,
Natr.-mur., *Puls.*, *Ferr.*

— боли въ спинѣ и поясницѣ: *Baryta*,
Graph., *Phosph.*, *Puls.*

§ XII.

БОЛЕЗНИ КОЖИ.

1. РОЖА.

Рожа поражаетъ большею частью лицо и голову, а затѣмъ ноги. Нерѣдко она перемѣняетъ мѣсто, мало-по-малу распространяясь на сосѣднія части, напримѣръ, съ одной стороны лица на всю голову. Иногда она сопровождается гастрическими припадками. Иногда рожистое воспаление является также около ранъ и нарывовъ.

Belladonna почти всегда уничтожаетъ обыкновенную гладкую рожу, унимая не только воспаление и боль въ кожѣ, но и страданія мозга, которыя иногда бываютъ очень опасны. Въ тѣхъ рѣдкихъ случаяхъ, когда *Bell.* оказалась недостаточною, нужно употребить *Laches*.

Противъ пузыристой рожи вяжнѣйшее средство *Rhus*. Если же оно не скоро унимаетъ несносное

жженіе и зудъ, то дать нѣсколько приемовъ *Euphorb.* Полезно при этомъ также защищать мокнущія мѣста и лопнувшіе пузыри отъ вліянія воздуха присыпкою картофельной или пшеничной муки.

Отечнымъ рожистымъ воспаленіямъ чисто лучше соотвѣтствуетъ *Apis.* При нагноеніи *Merc.* При наклонности къ антонову огню *Arsen.* При осложненіи желудочнымъ катарромъ *Bry.*

Расположеніе къ возратамъ, иногда чрезвычайно сильное, всего лучше побѣждается посредствомъ *Graph.* и *Camph.*

Рожистое воспаленіе кожи у **новорожденныхъ** опасноѣ, чѣмъ у взрослыхъ и первое средство противъ него *Arn.*, потому что оно развивается большею частью отъ поврежденія и воспаленія пуповины. Когда *Arn.* оказывается недостаточною, нужно употребить *Bell.* или *Merc.* Слѣдуетъ сравнить также сказанное о болѣзняхъ новорожденныхъ.

2. ПОЯСОВИДНАЯ РОЖА.

Эта болѣзнь встрѣчается очень рѣдко и состоитъ въ рожистомъ воспаленіи съ мелкими пузырьками, жженіемъ и зудомъ, полосой въ ширину ладони, охватывающемъ станъ обыкновенно

до половины. Лихорадки или иныхъ припадковъ при томъ почти вовсе не бываетъ, только жгучій зудъ часто причиняетъ беспокойство и бессоницу. Специфическія средства противъ этой болѣзни *Rhus.* и *Merc.* Когда пузырьки лопаются и мокнуть, можно присыпать ихъ мукою или положить хлопчатой бумаги.

3. СКАРЛАТИНА.

Скарлатина и красуха не всегда легко отличаются, тѣмъ больше, что въ эпидеміяхъ нерѣдко обѣ появляются не только въ одно время, но даже вмѣстѣ у одного больного, и сопровождающія и послѣдственныя страданія бываютъ большею частью одни и тѣ же. Въ отношеніи къ леченію это различіе, впрочемъ не важно; развѣ только при назначеніи употребленія предохранительныхъ средствъ, потому что гладкой скарлатинѣ соотвѣтствуетъ *Bell.*, а красухѣ, кажется, больше приличенъ *Acon.*

Скарлатинная сыпь состоитъ или въ большихъ, гладкихъ, огненнокрасныхъ пятнахъ, которыя отъ нажиманія пальцемъ исчезаютъ, или въ яркочерныхъ пятнахъ, усаженныхъ темнокрасными прыщиками, или же изъ смѣси тѣхъ и другихъ. Высыпаніе обыкновенно сопровождается болѣе или менѣе значительнымъ воспаленіемъ (краснотой,

опухолью и болью) глотки и горла, причиняющимъ иногда опухоль наружныхъ шейныхъ железъ.

Болѣзнь эта по разнообразію сопровождающихъ припадковъ и послѣдствій часто бываетъ такъ трудна, сложна и злокачественна, что здѣсь могутъ быть предложены только самыя общія и повехностныя указанія: всѣ же подробности должны быть предоставлены соображенію врача, который долженъ дѣйствовать по указанію обстоятельствъ.

Въ началѣ *Bell.* и *Acon.*, попеременно самыя лучшія средства и часто совершенно достаточныя для направленія болѣзни къ хорошему исходу. При сильномъ раздраженіи, безпокойствѣ, бессонницѣ и замедленіи высыпанія, полезно употребить *Coff.* и *Sulph.*

При очень сильномъ воспаленіи горла сверхъ *Bell.* болѣе всего соотвѣтствуютъ *Merc.*, *Lach.* и *Baryt.*, если же это воспаленіе угрожаетъ гангреною—*Ars.* и *Muriat.-acidum.*

Противъ воспаленія околоушныхъ железъ: *Bellad.*, *Hep.*, *Merc.* и *Bry.*

— сонливости, одурѣнія и воспаленія мозга: *Bell.* и *Opium.*

При внезапно скрывшейся сыпи: *Bryon.*, *Ipec.*, *Phosph.* или *Sulphur.*

Противъ послѣдственной **ВОДЯНКИ** главныя средства: *Ars.*, *Helleb.*, *Colch.*, *Lycor.* и *Rhus.* Изъ нихъ *Colch.* и *Lycor.* показаны въ особенности, когда моча недостаточна, мутна или даже со-всѣмъ темна или черновата.

Для предохраненія принимаются слѣдующія мѣры: вездѣ, гдѣ появляется эпидемія скарлатины и красухи, всѣмъ дѣтямъ, еще не перенесшимъ эту болѣзнь, и даже взрослымъ, которые ея опасаются, давать черезъ три или четыре дня по приему *Bell.* Когда болѣзнь обнаружилась уже въ домѣ или въ самомъ семействѣ, то можно давать ежедневно по приему. Когда можно предположить, что болѣзнь имѣетъ болѣе характеръ красухи, можно давать *Bell.* и *Acop.*, попеременно. Этимъ если не всегда предупреждается выраженіе, то по-крайней-мѣрѣ готовится хорошій исходъ болѣзни.

4. КРАСУХА.

Сыпь красухи бываетъ похожа то на корь, то на скарлатину. То же самое можно сказать и о сопровождающихъ страданіяхъ, съ тою разницею однакожъ, что при сходствѣ сыпи съ карлатиною сопровождающіе припадки (кашель и катарръ, походятъ на принадлежащіе кори, и наоборотъ, но всегда въ сравнительно слабой степени. Красуха вообще рѣдко требуетъ леченія и обкновенно проходитъ сама собою. Если же онакожъ жаръ очень силенъ, то не мѣшаетъ употребить *Acop.*, а при воспаленіи горла *Bell.* Противъ безпокойства, раздражительности и безсонницы хорошо и быстро дѣйствуетъ *Coffea.*

5. КОРЬ.

Эта заразительная, но большею частью доброкачественная болѣзнь, всегда начинается лихорадочнымъ жаромъ и катарральными явленіями, сухимъ кашлемъ съ скребленіемъ, щекотаніемъ и жженіемъ въ горлѣ, воспаленіемъ и чувствительностью глазъ къ свѣту. Потомъ уже, иногда черезъ нѣсколько дней, появляется сыпь, состоящая изъ красныхъ, неправильной формы и нѣсколько возвышенныхъ пятенъ, которыя черезъ 8 или 14 дней проходятъ при постепенномъ слущиваніи кожицы.

Важнѣйшія средства противъ кори: *Puls.* и *Acon.* Въ большей части случаевъ нѣсколькихъ пріемовъ *Puls.* въ первые дни бываетъ достаточно для сообщенія всей болѣзни хорошаго исхода. Когда жаръ передъ высыпаніемъ очень силенъ, нужно употребить *Acon.* Когда страдаетъ мозгъ и есть бредъ или воспаленіе глазъ и свѣтобоязнь очень сильны, то можно давать *Bell.* и *Acon.* попеременно.

Когда сыпь долго не показывается, то можно ускорить процессъ высыпанія пріемами *Sulph.* или *Ires.* Последнее прилично въ особенности, когда есть стѣсненіе въ груди.

Когда кашель очень сухъ, силенъ и судороженъ, можно дать *Nyosc.* или *Ires.*; когда же ка-

тарральное состояніе возвышается до воспаленія легкихъ, то лучше *Acon.* и *Bryon*

При сопровождающемъ слизистомъ поносѣ кромѣ *Puls.* соотвѣтствуютъ *Merc.* и *China.*

6. ОСПА.

Вѣтренная оспа почти никогда не требуетъ леченія и проходить сама собою, не сопровождаясь никакими особенно сильными страданіями. Только когда жаръ очень силенъ, полезно давать *Acon.*; при страданіи мозга—*Bell.* и при очень большихъ прыщахъ съ сильнымъ нагноеніемъ—*Merc.* или *Sulph.*

Также легко проходить **полуоспа** или **варіолидъ** (оспа, измѣненная предшествовавшей прививкою), которая однакожъ чаще требуетъ *Acon.* во время жара. По появленіи прыщей нѣсколько приемовъ *Sulph.* ускоряютъ созрѣваніе и исцѣленіе. Если же появляются значительные сопровождающіе припадки, то леченіе требуется такое же, какъ и для настоящей оспы.

Настоящая **оспа** почти всегда сопровождается сильнымъ жаромъ, въ особенности передъ и во время высыпанія прыщей; почему и тутъ самое лучшее средство *Acon.*, а при сильномъ волненіи раздраженіи и бессонницѣ *Coff.*; при пораженіи мозга *Bell.*

Когда оспенные прыщи уже обнаружались, то важнѣйшія средства *Thuja*, *Merc.*, *Tart.-emet.* и *Sulph.* Въ большей части случаевъ *Thuja* одна приводитъ болѣзнь къ скорому и хорошему исходу, такъ что почти вовсе не остается никакихъ рябинъ. Если же нагноеніе очень сильно, то необходимо бываетъ употребить нѣсколько приѣмовъ *Merc.* и *Sulph.*

Когда обнаруживаются значительныя страданія груди и горла, то должно дать *Tart.-emet.*

Когда оспенные прыщи чернѣютъ и нагноеніе становится сукровичнымъ, нужно употребить *Ars.*

При слюнотеченіи, сильномъ раздраженіи глазъ и поносѣ соотвѣтствуетъ *Mercurius*.

Касательно остающихся послѣдственныхъ страданій глазъ нужно сообразить сказанное о глазныхъ болѣзняхъ.

7. ПРОСОВИДНАЯ СЫПЬ И КРАПИВНАЯ ЛИХОРАДКА.

Острая просянка, красная и бѣлая, является большею частью какъ сопровождающій припадокъ какой-нибудь лихорадочной болѣзни, напримѣръ нервной горячки, или тифа, острого ревматизма и т. д. Въ большей части случаевъ она требуетъ *Ars.* или *Ipec.*

Ipecacuanha соотвѣтствуетъ въ особенности тогда, когда при испаринѣ на кожѣ безъ всякаго

видимаго повода является ознобъ съ стѣсненіемъ груди, одышкой, головокруженіемъ, дрожаніемъ, безнокойствомъ, тоскою, дурнотою и тошнотою. *Ирес.* въ этомъ случаѣ ускоряетъ высыпаніе и имѣетъ благодѣтельное вліяніе на исходъ всей болѣзни.

Arsenicum соотвѣтствуетъ уже высыпавшей просянкѣ, особенно бѣлой, при тифѣ и родильной лихорадкѣ и при преобладающихъ припадкахъ слабости и тоски. Въ послѣднемъ случаѣ съ пользою могутъ быть употреблены также *Bry* и *Valeriana*.

Крапивная сыпь или **крапивная лихорадка** болѣзнь не опасная, но часто чрезвычайно упорная. Она состоитъ въ незапномъ появленіи красныхъ или бѣлыхъ припухлостей или волдырей съ сильнымъ зудомъ и жженіемъ. Сыпь эта часто такъ же скоро исчезаетъ, какъ появилась, и потомъ снова является. Она часто обнаруживается послѣ употребленія жирной пищи, раковъ, земляники или отъ прикосновенія крапивы и ядовитыхъ насѣкомыхъ, а иногда и отъ неизвѣстныхъ причинъ. Обыкновенныя средства противъ этой болѣзни: *Bell.*, *Dulc.*, *Rhus*, *Urtica*, *Ars.* и *Puls.*, также *Apis* весьма важное средство отъ крапивной сыпи, особенно при совмѣстныхъ страданіяхъ матки у женщинъ. Когда сыпь обнаруживается отъ жирной пищи, то помогаютъ обыкновенно *Puls.* и *Ars.*, отъ прикосновенія ядовитыхъ растений—*Bell.*, *Rhus*, *Urt.* или *Bryon.*,

отъ ядовитыхъ насѣкомыхъ — *Apis, Ars.*; вслѣдствіе простуды — *Dulc.*; отъ вина — *Nux-vom.* или *Sulph.*

Отъ очень упорной хронической крапивной лихорадки иногда избавляютъ *Calc., Cop.-bals.* и *Lycop.*

8. ЧЕСОТКА.

Эта заразительная сыпь состоитъ изъ мелкихъ пузырьковъ, которые появляются группами въ сгибахъ сочлененій, между пальцами и на тѣлѣ, кромѣ лица; причиняютъ сильный зудъ и при небреженіи развиваются до большихъ пузырей и изъязвленій. Болѣзнь эта, какъ извѣстно, сопровождается зарожденіемъ насѣкомаго, называемаго чесоточнымъ клещемъ, который обыкновенно сидитъ между пузырьками въ бороздкахъ подъ верхнею кожей.

Главное средство противъ этой болѣзни *Sulph.* Когда чесотка приключилась отъ зараженія, когда присутствіе клеща не подвержено сомнѣнію и куда болѣзнь еще можетъ быть названа мѣстною, то съ успѣхомъ можно примѣнить и мѣстное леченіе, направленное къ истребленію клеща. Это лучше всего достигается втираніемъ всѣхъ пораженныхъ мѣстъ сѣрною мазью изъ 1 доли сѣрнаго цвѣта на 4 доли свиного сала, употребивъ передъ каждымъ втираніемъ мыльную ванну. Въ то же время внутрь дается утромъ и вечеромъ

по каплѣ *Tinct.-sulph.* или по одному грану втораго растиранія. Когда чесотка очень запущена или очень жирна и образуетъ большіе пузыри, то попеременно съ *Sulph.* можно давать *Merc.* Запущенная чесотка, хотя-бы и приобрѣтенная отъ вѣшняго зараженія, постепенно можетъ обратиться изъ мѣстной въ общую болѣзнь и въ такомъ случаѣ въ особенности истребленіе ея одними мѣстными средствами можетъ причинить очень важныя хроническія страданія. Поэтому никогда не слѣдуетъ лечить чесотку только одними наружными средствами. Случаются и другія зудящія сыпи, часто ошибочно принимаемыя за чесотку, вовсе не имѣющія клеща и происходящія отъ внутреннихъ разстройствъ. Въ такихъ случаяхъ въ особенности очень вредно и опасно прибѣгать къ наружнымъ притравамъ или сушащимъ средствамъ, кромѣ необходимаго очищенія кожи купаньемъ и омовеніемъ. Лечение такихъ хроническихъ страданій, такъ же какъ и лечение такъ называемыхъ лишаевъ, требуетъ кромѣ *Sulph.* обыкновенно *Ars.*, *Caust.*, *Lyc.*, *Merc.*, *Carb.-veg.*, *Mezer.*, *Graph.*, *Antim-crud.*, *Rhus*, *Ranunc.*

Arsenicum соотвѣтствуетъ въ особенности отрубевиднымъ, чешуевиднымъ и мокнущимъ сыпямъ съ жженіемъ и безнокойствомъ, а также нарывамъ и огненнымъ вередамъ.

Causticum — крупно-пузырьчатой прыщевидной чесоткѣ.

Lycopodium—коростѣ и струновидной сыпи съ мокнущими ссадинами.

Mercurius — сухой кровоточивой чесоткѣ или гнойнымъ, разѣдающимъ прыщамъ съ несноснымъ зудомъ, въ особенности въ теплѣ и въ постелѣ.

Carbo vegetabilis—сухой, мелкозернистой, просовидной сыпи.

Mezereum—просовидной сыпи съ ссадинами и несноснымъ жженіемъ и зудомъ по ночамъ.

Graphites—корковидной, разѣдающей сыпи съ мокнущими ссадинами.

Antimonium crudum—осповидной сыпи съ коричневыми или черноватыми корками.

Rhus — мелко и крупно-пузырьчатой и просовидной сыпи или разѣдающимъ мокнущимъ и также чешуевиднымъ лишаямъ.

Ranunculus bulbosus—частымъ, мокнущимъ пузырькамъ, сливающимся въ коросты.

9. ЗУДЪ.

Зудъ въ кожѣ можетъ причинять страданія безъ видимаго обнаруженія сыпи. Большею частью это случается около задняго прохода и половых частей, но иногда на всемъ тѣлѣ. Чаше всего зудъ уничтожается посредствомъ *Sulph.* Нерѣдко, впрочемъ, онъ происходитъ отъ различныхъ внутреннихъ причинъ, глистовъ, геморроя и т. д.,

которыя, разумѣется, требуютъ каждая своего леченія.

Противъ тонко покалывающаго, жгучаго зуда, какъ отъ блохъ, особенно вечеромъ, въ постелѣ, и когда онъ при чесаніи, проходя на одномъ мѣстѣ, появляется на другомъ, часто успѣшно дѣйствуетъ *Ignatia*.

Противъ зуда, который появляется въ особенности при раздѣваніи: *N-vom.*, *Ars*.

При согрѣваніи въ постелѣ: *Puls.* и *Merc*.

— сильномъ жженіи: *Rhus*.

— скоромъ появленіи крови отъ чесанья: *Merc.* и *Sulph*.

Противъ зуда въ заднемъ проходѣ: *Calc.*, *Caust.*, *Lyc.*, *Ignat.*, *Sep.*, *Sulph*.

— на мошонкѣ: *Nitri-ac.*, *Petrol.*, *Sulph*.

— на дѣтородныхъ частяхъ: *Calc.*, *Caust.*, *Carb.-v.*, *Con.*, *Plat.*, *Natr.-mur.*, *Sep.*, *Sulph*.

10. ЛИШАЙ.

Лишайми вообще называютъ очень разнообразныя формы хронической болѣзни кожи, каковы *eczema*, *herpes*, *lichen*, *psoriasis* и т. д. Они являются большею частью только на одной какой-нибудь части тѣла и бываютъ то сухіе, то мокнушіе и всегда очень упорные. Чаще всего встрѣчается и всѣхъ упорнѣе держится мокрый лишай на голени. Лечение этой болѣзни кожи,

происходящей большею частью отъ внутренняго разстройства, требуетъ очень подробнаго изслѣдованія и соображенія всѣхъ предшествовавшихъ болѣзней, послужившихъ къ ней поводомъ. Чаше всего ей соотвѣтствуютъ: *Sulph.*, *Merc.*, *Ars.*, *Lach.*, *Rhus.*, *Mezereum* и *Graph.*

При **пупыристой** сыпи (lichen) въ особенности рекомендуются: *Ars.*, *Calc.*, *Con.*, *Sulph.*, а также *Carb.-veg.*, *Phosph.-acid.*, *Staph.*, *Stront.*

При **чешуевидной** (psoriasis): *Aur.*, *Clemat.*, *Dulc.*, *Led.*, *Oleand.*, *Phosph.-ac.*, *Sulph.* При колющемъ зудѣ: *Con.*; при нагноеніи струньевъ *Lycor.*; при жидкомъ гнойномъ отдѣленіи *Seria*; при сифилитическомъ или меркуріальномъ худосочіи *Merc.* и *Nitr.-acid.* (Сравн. также средства, приведенныя въ статьѣ о чесоткѣ).

II. САДНО, ОБОПРѢЛОСТЬ.

ОбопрѢлость обыкновенно случается у новорожденныхъ между ляжками, около шеи и подъ мышками; случается и у взрослыхъ, особенно очень полныхъ, лѣтомъ и послѣ продолжительной ходьбы. Въ большей части случаевъ достаточно бываетъ очищенія кожи своевременнымъ купаньемъ, если же этого мало, то можно употребить *Cham.* Когда обопрѢлость далеко распространяется и очень мокнетъ, можно дать *Merc.* или *Lycor.*

Садно и обопрѣлость у взрослыхъ или натертыхъ мѣста всего легче излечаются обмываніемъ водою съ *Tinct. Arn.*

Пролежни, часто встрѣчающіеся у больныхъ, если не составляютъ принадлежности самой болѣзни, какъ напримѣръ въ нервной и гнилой горячкѣ, также всего лучше излечаются посредствомъ *Tinct. Arn.*

12. ВЕРЕДЪ, ЧИРЕЙ, КАРБУНКУЛЬ.

Противъ мелкихъ вередовъ, которые нерѣдко являются по нѣскольку вдругъ, самое лучшее средство *Arn.* Противъ большихъ съ продолжительнымъ нагноеніемъ и сильною болью — *Нер.* или *Merc.* Когда окружность очень воспалена и болятъ, полезно давать *Bell.* При обширной отечной опухоли *Apis.* Для ускоренія назрѣванія самое лучшее вспомогательное средство медовая лепешка. Къ опасному взрѣзыванію нарывовъ ни въ какомъ случаѣ не должно прибѣгать.

Когда нарывъ очень великъ, злокачественъ (карбункуль) и угрожаетъ гангреною, то слѣдуетъ употребить *Arsen.* въ частыхъ приемахъ. Карбункуль въ особенности бываетъ опасенъ у пожилыхъ людей, когда является около затылка и на спинѣ, и требуетъ очень тщательнаго леченія. Медовая лепешка, не очень крутая (побольше

меду) тутъ служить не только смягчительнымъ и очищающимъ средствомъ, но и предохранительнымъ отъ помертвенія, т. е. поддерживаетъ дѣйствіе *Arsen.* Иногда, при продолжающемся воспаленіи въ окружности вскрышагося нарыва бываетъ, нужно употреблять *Bell.* или *Apis*, попеременно съ *Arsen.*

Противъ постояннаго расположенія къ вередамъ всего лучше дѣйствуетъ *Sulph.*

13. НОГТОЃДА.

Ногтоѣда или нарывъ на пальцѣ большею частью образуется около ногтя, но можетъ быть и на серединѣ и у основанія пальца. Такой нарывъ, обыкновенно сопровождается значительнымъ воспаленіемъ окружающихъ частей съ чрезвычайно сильною болью и нерѣдко причиняетъ костоѣду, отдѣленіе цѣлаго сустава или по-крайней-мѣрѣ обезображеніе и сведеніе пальца. Для обыкновенныхъ случаевъ, когда воспаленіе и нагноеніе поверхностно, почти всегда достаточно одного *Нер.* для совершеннаго исцѣленія. Когда воспаленіе простирается глубже, на мышцы и связки, нужно употребить *Merc.* Когда уже кость затронута, нужно давать *Silic.* и *Merc.* попеременно. Пока нарывъ еще не вскрылся, полезно бываетъ употреблять теплыя припарки или держать палецъ въ теплой мыльной водѣ. Но взрѣ-

зывать нарыва позволяется только тогда, когда нагноение совершенно созрѣло: всякое слишкомъ поспѣшное употребленіе ножа, также какъ и накладываніе острыхъ пластырей или мазей можетъ причинить весьма злокачественныя нагноенія.

14. ОТМОРОЖЕНЬЕ.

При краснотѣ и трещинахъ на кожѣ рукъ и ногъ съ жгучею болью почти всегда полезно наружное употребленіе *Tinct. Arn.* Когда трещины глубоки и мокнуть, то можно пожиже разводить тинктуру водою; когда же трещинъ нѣтъ, можно брать растворъ покрѣпче. Въ очень упорныхъ случаяхъ, когда кожа имѣетъ багровый цвѣтъ и пухнетъ, но ни трещинъ, ни ранъ нѣтъ, иногда еще лучше дѣйствуетъ слабый растворъ *Acid.-nitr.* (10 капель цѣльной кислоты на полъ-унца воды). Когда по уничтоженіи боли и опухоли остается багровый цвѣтъ кожи, можно внутрь употребить *Petrol.*, *Acid.-nitri* или *Pulsat.*, а при сильной боли *Ars.*

Когда вслѣдствіе ознобленія красныя и болящія опухоли переходятъ въ нагноеніе, то кромѣ показанныхъ средствъ могутъ быть полезны *Sulph.* и *Thuja*. (Ср. сказанное о язвахъ).

15. ОЖЕГЪ.

Поверхностный ожегъ, когда верхняя кожица еще не сошла, всего лучше лечиться примочкою или обмываніемъ теплымъ спиртомъ, что почти всегда предупреждаетъ образованіе пузырей. Когда боль очень сильна, можно въ спиртъ подбавить нѣсколько капель *Tinct. Canthar.* или *Urtic.* (10 капель на унцію спирту).

При сильныхъ ожогахъ, когда кожа сошла, нужно прежде всего заботиться о чистотѣ раны и предохраненіи отъ воздуха. Для этого накладывается новая хлопчатая бумага, которой даютъ прилипнуть и, по мѣрѣ образованія новой кожицы, по частямъ снимаютъ. Когда рана глубока и обильно гноится, такъ что хлопчатую бумагу нужно перемѣнять, то смачиваютъ первый слой ея сладкимъ миндальнымъ масломъ.

Внутрь при сильномъ общемъ жарѣ дается *Acon.* Иногда является рвота и требуетъ *Ipec.* При сильномъ волненіи, страхѣ и біеніи сердца *Ignat.* Противъ нестерпимой, жгучей боли лучше всего дѣйствуютъ *Arsen.* и *Caust.*, а противъ обильнаго и продолжительнаго нагноенія *Sulph.*

16. ЯЗВЫ.

Язва большею частью происходитъ отъ внутреннихъ общихъ болѣзней, какъ напримѣръ, не-

правильности кровообращенія и органической болѣзни сердца, на которыя при леченіи и должно быть обращено главное вниманіе.

Чаще всего встрѣчаются и всего упорнѣе бываютъ язвы на ногахъ, особенно у рабочихъ людей, которые принуждены много стоять, или у женщинъ во время беременности и послѣ многихъ родовъ, вслѣдствіе вскрывшихся варикозныхъ узловъ. Главныя средства противъ такихъ язвъ: *Sulph.*, *Ars.*, *Merc.*, *Carb.-v.* и *Lach.*

Sulphur соотвѣтствуетъ въ особенности язвамъ съ лишаевидною окружностью, сильнымъ зудомъ и разстройствомъ пищеваренія, у ипохондрикковъ или пожилыхъ и худосочныхъ людей.

Arsenicum—при сильномъ, несносномъ жженіи, особенно ночью, въ постелѣ, и при твердыхъ, мозолистыхъ краяхъ язвы.

Mercurius—при обильномъ нагноеніи нечистыхъ, глубокихъ язвъ темнаго или сѣроватаго цвѣта.

Carbo-vegetabilis —при ощущеніи жженія, кровоточивости и непріятномъ запахѣ язвы.

Lachesis—когда язва очень распространяется въ ширину, какъ-бы разѣдаетъ окружность, и усажена по краямъ мелкими язвинами.

Часто язва образуется вслѣдствіе застарѣлой чесотки или мокрыхъ лишаевъ. Главное средство и въ этомъ случаѣ *Sulph.*, а затѣмъ *Graph.*, *Merc.* и *Rhus.*

О золотушныхъ язвахъ см. сказанное вообще о леченіи золотухи и опухоли железъ.

Язвы съ **костоѣдою** требуютъ преимуще-
ственно *Silic.*, *Merc.*, *Calc.*, *Jod.*, *Asa-foot.*

Фистуламъ соотвѣтствуютъ: *Calc.*, *Phosph.*,
Silicea.

Разовиднымъ язвамъ: *Ars.*, *Con.*, *Lach.*,
Mercurius.

Антонову огню или **гангренѣ**: *Ars.*,
Carb.-veg., *Chin.*, *Lach.*, *Secale-corn.*, *Silic.*

Грибовиднымъ наростамъ и такъ на-
зываемому **дикому мясу**: *Ars.*, *Carbo-anim.*,
Laches., *Merc.*, *Nitr.-ac.*, *Sulph.*

Гниющимъ язвамъ: *Arsen.*, *Carb.-veg.*, *Kreos.*,
Muriat-ac.

Кровоточивымъ: *Ars.*, *Carb.-veg.*, *Kreos.*,
Lach., *Nitri-ac.*, *Sulph-ac.*

17. МЪШЕЧНАЯ ОПУХОЛЬ ИЛИ ПОДКОЖНЫЙ ЖЕЛВАКЪ.

Этого рода опухоли образуются подъ кожей и имѣютъ то твердое, то мягкое или даже жидкое содержаніе въ особой оболочкѣ, сумкѣ или мѣшкѣ. Онѣ большею частью бываютъ круглы, иногда на стеблѣ и рѣдко причиняютъ боль. Все-го чаще онѣ встрѣчаются на головѣ и на лбу, иногда по нѣсколько вмѣстѣ. Хотя эти желваки большею частью не причиняютъ ощутительныхъ страданій, однакожъ при значительной величинѣ бываютъ безобразны, такъ что во всякомъ случаѣ

не мѣшаетъ испытать леченіе. Уничтоженіе этихъ наростовъ нерѣдко удается очень скоро посредствомъ нѣсколькихъ приѣмовъ *Calc.* или *Sil.*

Подобные желваки образуются также иногда на рукахъ и ногахъ около суставовъ, на сухожиліяхъ, и уничтожаются тѣми же средствами, а въ упорныхъ случаяхъ иногда помогаетъ *Phosph.*

На колѣнахъ у рабочихъ людей, принужденныхъ много стоять на колѣнахъ, также образуется отъ давленія мясистая небольшая опухоль, которая при значительномъ развитіи иногда затрудняетъ ходьбу. Она почти всегда, даже въ самыхъ застарѣлыхъ случаяхъ уничтожается посредствомъ *Silic.*

18. БОРОДАВКИ И МОЗОЛИ.

Бородавки преимущественно на рукахъ являются иногда въ такомъ значительномъ числѣ что кромѣ безобразія становятся помѣхою и требуютъ леченія. Противъ нихъ съ большимъ успѣхомъ употребляется *Lycor.*; иногда *Sep.* Если же этого недостаточно, то можно утромъ и вечеромъ примачивать тинктуру *Veratr.* или *Thu.*

Мозоли, натертые тѣсною или неплотно сидящею обувью, требуютъ прежде всего охраненія отъ тренія, что достигается наклеиваніемъ лайковыхъ кружковъ съ круглыми вырѣзками, дающими просторъ мозоли при нажимѣ на одну только

окружность, или же просто наклеюю липкой фаяровой бумаги (papier Fayard). Предохраненная отъ тренія и нажима мозоль часто сама собою уничтожается. Но иногда мозоли нарастають и безъ тренія, подобно бородавкамъ, составляя особенную болѣзнь кожи. Въ такомъ случаѣ могутъ быть пригодны и лекарства, способныя дѣйствовать на такіе наросты. Сюда принадлежать въ особенности: *Antim.*, *Calc.*, *Graph.*, *Lyc.*, *Nitr.-ac.*, *Sep.*, *Sulph.*

19. ПЕЧЕНОЧНЫЯ ПЯТНА И ВЕСНУШКИ.

Печеночныя пятна обыкновенно появляются вслѣдствіе хроническихъ страданій брюшныхъ органовъ, съ излеченіемъ которыхъ и проходятъ. Въ большей части случаевъ самымъ дѣйствительнымъ средствомъ тутъ бываетъ *Sepia*. Когда при этихъ пятнахъ нѣтъ никакихъ особенно болѣзненныхъ состояній и *Sep.* не помогаетъ, то часто помогаетъ примачиваніе тинктурою *Veratr.*

Веснушки часто уничтожаются посредствомъ *Lycop.* и *Veratr.* Последнее средство можно также употребить въ видѣ примочки.

20. УГРИ, ПРЫЩИ НА ЛИЦѢ И МѢДНЫЙ НОСЪ.

Противъ угрей на лицѢ могутъ быть употреблены, смотря по обстоятельствамъ: *Antim.*, *Natr-mur.*, *Nitr-ac.*, *N-vom.*, *Sepia*, *Staphysagr.*, *Sulph.*, а также *Bovist.*, *Calc.-phosph.*, *Carb-an.*, *Carb-veg.* и *Rhus*.

Противъ багровыхъ бугроватостей и **мѣднаго цвѣта** кожи на носу (*Gutta rosacea*) въ особенности *Arsen.*, *Carb.-an.*, *Sulph.*, *Thuj.*, или же *Aur.* и *Phosph.-acid*.

Прыщевиднымъ сыпямъ соотвѣтствуютъ въ особенности: *Antim.*, *Arsen.*, *Dulc.*, *Graph.*, *Hepar.*, *Merc.*, *Nitr.-ac.*, *Oleand.*, *Sassap.*, *Sulph.*, *Thuj.*, а также *Calc.*, *Carb.-veg.*, *Caust.*, *Con.*, *Mezer.*, *Phosph-acid.*, *Sepia*.

21. МОЛОЧНЫЙ СТРУПЪ.

Молочный струпъ на лицѢ поражаетъ нерѣдко вообще здоровыхъ дѣтей, особенно въ первомъ возрастѣ, и остротою просачивающейся жидкости часто причиняетъ сильное жжение и безпокойство, хотя большею частью имѣетъ вовсе не злокачественный характеръ и только придаетъ лицу непріятный видъ. Обыкновенныя средства противъ этой сыпи: *Rhus.*, *Viola-tric.* и *Sassaparilla*. Когда окружность воспалена и ребенокъ очень безпо-

коенъ, можно предварительно дать *Acon.* и потомъ уже *Rhus.* Если затѣмъ не скоро послѣдуетъ улучшение, то употребить *Viola-tric.* и, если нужно, *Sassap.* Въ очень упорныхъ случаяхъ можно въ промежуткахъ давать *Sulph.*

Когда сыпь распространяется на уши, образуетъ тамъ мокнушіе струпья и причиняетъ истечение изъ ушей, то приличны въ особенности *Merc.* и *Hep.*

22. ПАРША НА ГОЛОВѢ.

Парша отличается мелкими пузырьками, образующими мокнушіе струпья на волосистой кожѣ, и сопровождается иногда опухолью шейныхъ железъ. Важнѣйшее средство противъ нея *Rhus.*, съ которымъ попеременно можно давать *Sulph.* Одно изъ первыхъ условій успѣха леченія — чистота и частыя обмыванія головы съ мыломъ. Когда *Rhus.* и *Sulph.* оказываются недостаточными, можно употребить *Hep.* или *Staphys.*

Кромѣ этого случается еще другая парша, состоящая не изъ пузырьковъ и корокъ, а изъ постоянного образованія грибовиднаго растенія около волосныхъ луковокъ и имѣющая характеристическій запахъ мышинаго кала. Главныя средства противъ этой парши *Staph.* и *Hep.*

ГЛАВА II.

§ XIII.

ОБЩІЯ БОЛѢЗНИ.

1. РЕВМАТИЗМЪ.

Ревматизмъ большею частью поражаетъ мускулы рукъ и ногъ, рѣже суставы, а иногда случается и въ мускулахъ туловища, именно въ затылочныхъ, спинныхъ и грудныхъ. Иногда ревматизмъ соединяется съ лихорадкою, причемъ въ суставахъ обнаруживается боль и опухоль (острый ревматизмъ или ревматическая лихорадка). Еще чаще онъ является въ видѣ постоянной или постоянно возвращающейся боли въ одномъ какомъ-нибудь мускулѣ безъ замѣтнаго страданія другихъ частей тѣла (хроническій ревматизмъ). Самая обыкновенная причина его — простуда на сквозномъ вѣтрѣ, въ сырую, холодную погоду, скрывшійся потъ и т. д. Однакоже онъ можетъ произойти и отъ злоупотребленія лекарственныхъ веществъ, каковы хина, ртуть, свинецъ и т. д. При леченіи, кромѣ причинъ, съ точностью нужно опредѣлить мѣсто и родъ боли и сопровождающіе припадки.

Aconitum приличенъ, когда при остромъ ревматизмѣ лихорадка очень сильна, сопровождается безпокойствомъ, біеніемъ сердца, тоскою; когда боль колющая или терзающая; опухоль красная и чувствительная къ прикосновенію.

Bryonia превосходное средство противъ ревматизма, въ особенности когда боль занимаетъ преимущественно мускулы, отъ движенія усиливается, сопровождается тугостью и опухолью; при ожесточеніи ночью, страданіи желудка и мутной темно-красной мочѣ.

Chamomilla—при тянущей или терзающей боли съ ощущеніемъ онѣмѣнія или какъ-будто членъ отнялся; при ожесточеніи ночью, безпокойномъ метаніи, облегченіи отъ движенія или когда сидеть; при зябкости и досадномъ расположеніи духа.

Mercurius—при боли, ожесточающейся въ теплѣ, въ постелѣ и на сыромъ воздухѣ; при мягкой опухолѣ около суставовъ; при обильномъ, но не облегчающемъ потѣ; при ощущеніи холода въ страдающихъ частяхъ.

Pulsatilla—когда боль и опухоль переходятъ отъ одного сустава въ другой, ночью въ постелѣ ожесточается, при обнаженіи облегчается и сопровождается блѣдностью лица, зябкостью, ощущеніемъ онѣмѣнія и отсутствіемъ жажды.

Rhus — когда боль терзающая, тянущая или вывихная съ ощущеніемъ слабости, онѣмѣнія и стрекотанія; ожесточается въ особенности въ по-

коѣ или когда послѣ сидѣнія или лежанія встанешь; при красной, лоснящейся опухоли съ колющею болью отъ прикосновенія.

Colchicum—при очень сильной, терзающей, колющей или дергающей боли съ онѣмѣніемъ и стрекотаніемъ; красной, воспаленной опухоли; когда все тѣло болитъ; при ожесточеніи съ вечера до утра, съ жаромъ и недостаточною, очень темною мочей.

Zincum—когда почти всѣ суставы верхнихъ и нижнихъ конечностей поражены терзающею и тянущею болью съ онѣмѣніемъ и дрожаніемъ; при ожесточеніи отъ согрѣванія и движенія, при судорожномъ напряженіи въ членахъ; при біеніи или дерганіи въ разныхъ частяхъ мускуловъ и вздрагиваніи тѣла, какъ съ испугу во время сна.

Arnica—при вывихной или мозжащей боли; при твердой, красной лоснящей опухоли съ ощущеніемъ какъ-будто всякая подстилка слишкомъ жестка.

Belladonna—при колющей, жгучей боли, которая ночью ожесточается; при чрезвычайно чувствительной опухоли съ обширною лоснящеюся краснотой; при приливахъ въ голову, краснотѣ лица и глазъ и біеніи жилъ на шеѣ.

Tartarus emeticus—при жестокой боли въ суставахъ, переходящей съ мѣста на мѣсто или появляющейся въ нѣсколькихъ мѣстахъ вдругъ, съ опухолью и краснотой.

Если выродожденіи ревматической боли или тотчасъ послѣ быстрого прекращенія ея наступитъ безпокойство, страхъ, біеніе сердца, одышка, то немедленно слѣдуетъ прибѣгнуть къ *Spigel.*, которая, будучи во-время употреблена, можетъ предотвратить угрожающій **переносъ** на сердце.

Противъ застарѣлаго **хроническаго** ревматизма кромѣ того хорошо дѣйствуютъ: *Causticum*, *Ferrum*, *Lachesis* и *Sulphur*.

Causticum соотвѣтствуетъ въ особенности боли, несносной на воздухъ и облегчающейся въ теплѣ и постелѣ, при совершенномъ онѣмѣніи или искривленіи, скорченіи больнаго члена.

Ferrum—боли и ревматическому онѣмѣнію въ суставѣ плеча.

Lachesis—застарѣлой тугости или корчѣ члена и послѣ злоупотребленія ртути.

Sulphur—очень застарѣлому ревматизму вообще, упорнымъ и легко возвращающимся остаткомъ боли.

Ревматизмъ суставовъ съ опухолью требуетъ преимущественно: *Acon.*, *Arn.*, *Bell.*, *Chin.*, *Puls.*, *Rhus*, *Zinc*.

— съ тугостью и корчей: *Bry.*, *Caust.*, *Lach.*, *Rhus*, *Sulph.*

— съ онѣмѣніемъ: *Ars.*, *Chin.*, *Ferr.*, *Rhus*, *Ruta*.

— съ переходящею блуждающею болью *Bry.*, *Puls.*, *Zinc*.

Ревматизмъ съ ожесточеніемъ отъ движенія:

Bell., Bry., Chin.

— съ ожесточеніемъ въ покоѣ: *Rhus., Rhod., Dulc., N.-mosch., Lyc., Thuj.*

— съ ожесточеніемъ ночью и въ постелѣ: *Acon., Cham., Merc., Puls., Colch., Lyc., Thuj.*

Когда ревматизмъ происходитъ отъ промоченія: *Rhus., Calc., N.-mosch.*

— отъ сквознаго вѣтра: *Calc., Chin., Bell.*

— отъ сухаго холода: *Ars., Bry., N.-vom.*

— отъ ртути: *Chin., Hep., Jod., Sulph.*

— отъ хины: *Arsen., Bell., Ferr., Puls., Veratr.*

— отъ валеріаны: *Bell., Merc.*

— отъ свинца: *Bell., N.-vom.*

— отъ гонорреи: *Clem., Merc., Tereb., Thuj.*

— обнаруживается при переменѣхъ погоды: *Bry., Calc., Dulc., Merc., Phos., N.-mosch., Rhod., Rhus., Veratr.*

2. ЛОМОТА, ПОДАГРА.

Подагра отличается отъ ревматизма тѣмъ, что занимаетъ не мускулы, а исключительно суставы ихъ связки и концы костей, гдѣ причиняетъ утолщенія, сращения (желваки и сведенія). Подагра есть общая болѣзнь соковъ всего организма и состоитъ въ расположеніи къ отложенію въ су-

ставахъ известковыхъ массъ, подобно тому, какъ въ каменной болѣзни образуются отложенія въ почкахъ и въ мочевомъ пузырьѣ. Поэтому задача при леченіи состоитъ не въ томъ только, чтобы уничтожить отдѣльные припадки боли, но въ томъ, чтобы по возможности измѣнить общее состояніе соковъ.

Страданія отъ этой болѣзни обыкновенно обнаруживаются сперва въ ногахъ (подагра), начинаясь преимущественно съ большого перста, пятки или сустава лодыжки. Впослѣдствіи уже поражаются и другія части, колѣно и суставы пальцевъ на рукахъ. Въ послѣднемъ случаѣ болѣзнь называется хирагрой.

Въ началѣ ломотныхъ припадковъ, въ особенности, когда они сопровождаются сильнымъ жаромъ, нѣсколько приѣмовъ *Acon.* часто доставляютъ большое облегченіе. Когда опухоль тверда, умѣренна красна, боль какъ отъ вывиха и ощущение, какъ-будто всякая подстилка слишкомъ жестка, то помогаетъ *Arn.* При яркой краснотѣ и рожевидномъ воспаленіи окружности—*Bell.* При красной, лоснящейся опухоли съ сильною болью глубоко въ костяхъ и совершенною неподвижностью сустава хорошо дѣйствуетъ *Sabina.* При ожесточеніи боли, въ особенности ночью и въ теплой постелѣ можно принять въ соображеніе *Ferr., Merc.* и *Rhus.* При быстрыхъ перемѣщеніяхъ боли изъ одного сустава въ другой *Puls.* Людямъ, употребляющимъ много вина и очень

питательную пищу соотвѣтствуютъ *Acon.*, *Calc.*, *Sulph.*

Когда ломота имѣетъ болѣе хроническій характеръ и образуются желваки и сведенія суставовъ, то главные средства: *Calc.*, *Caust.*, *Colch.*, *Ledum.*, *Mangan.*, *Chin.*, *Ferr.*, *Phosph.-ac.*, *Rhod.*, и *Sulph.*, изъ которыхъ въ особенности отъ *Calc.* и *Sulph.* можно ожидать наибольшаго содѣйствія радикальному излеченію. Само собою разумѣется, впрочемъ, что здѣсь, какъ и во всѣхъ общихъ болѣзняхъ, выборъ лекарства всегда зависитъ отъ множества особенныхъ обстоятельствъ, въ которыхъ находится больной организмъ, а успѣхъ отъ соотвѣтствующаго діететическаго содержанія и образа жизни.

3. БОЛЬ ВЪ БЕДРѢ, ВЕРТЛУЖНАЯ БОЛЬ.

Этому страданію нерѣдко подвергаются дѣти. Ребенокъ вдругъ, безъ видимой причины, начинаетъ хромать и подтягивать кверху одну ножку, не жалуясь ни на какую боль. Отъ пренебреженія этого явленія и при золотушномъ расположеніи, болѣзнь можетъ развиваться до высокой степени, перейти въ воспаленіе, нагноеніе бедреннаго сустава и костоѣду или сращеніе, такъ что нога укорачивается, сохнетъ и становится искаленной на всю жизнь. При первомъ появленіи

этого страданія для уничтоженія его бываетъ достаточно нѣсколькихъ приемовъ *Bell.* и потомъ, черезъ 24 или 48 часовъ нѣсколько приемовъ *Merc.* при совершенно спокойномъ положеніи члена. Само собою разумѣется, что съ самаго начала болѣзни нужно изслѣдованіемъ удостовѣриться, нѣтъ-ли какого инаго поврежденія, вывиха, перелома и т. д.

У взрослыхъ также встрѣчается вертлужная боль, но совсѣмъ инаго свайства, потому что обыкновенно страдаетъ не суставъ, а мускулы и нервы бедра. Тутъ большею частью бываетъ очень сильная боль, которая иногда простирается въ колено и даже въ пятку и совершенно препятствуетъ ходить. Противъ этого страданія главные средства *Colocynth.* и *Puls.* И тутъ также необходимо внимательное изслѣдованіе для удостовѣренія, нѣтъ-ли гораздо болѣе опасной болѣзни, какъ напримѣръ воспаленія и нагноенія бедренныхъ мускуловъ. Въ этомъ случаѣ первое средство *Apis.*

4. БОЛЬ ВЪ ПОЯСНИЦѢ.

Эта мгновенно какъ отъ удара схватывающая боль въ поясницѣ, въ особенности при нагибаніи или поднятіи тяжести, препятствующая всякому движенію, будучи предоставлена сама себѣ, обыкновенно продолжается дней 6 или 12. Обыкно-

венно она бываетъ ревматическаго свойства, однакоже бываютъ случаи, когда она происходитъ вслѣдствіе напряженія отъ растяженія какой-нибудь связки или даже перерыва нѣкоторыхъ мышечныхъ волоконъ. Въ обоихъ случаяхъ *Arn.*, въ два-три дня можетъ совершенно уничтожить страданіе. При частыхъ возвратахъ *Rhus*, всего лучше уничтожаетъ расположеніе къ этой болѣзни. Когда есть осложненіе страданіями живота, запоръ или геморрой, то соотвѣтствуютъ *N.-vom.* и *Sulph.*

5. ГОРЯЧКА.

Въ старину были извѣстны только два главныхъ вида горячки: одна *воспалительная*, которая по общему повѣрью почиталась даже очень «здоровою болѣзнью»: проберетъ, вытряхнетъ всякую старую хворобу, такъ что послѣ только толстѣй знай; другая *инная*, которую врачи однакожъ почему-то называли нервной. Сверхъ того извѣстна была еще *блная* горячка отъ опоя спиртными напитками. Но съ-тѣхъ-поръ какъ наука подвинулась впередъ и въ моду у нея вошелъ тифъ, да притомъ лихорадки подверглись новой классификаціи; съ-тѣхъ-поръ какъ усмотрѣно, что всякая болѣе или менѣе острая болѣзнь сопровождается лихорадочнымъ (горячечнымъ) движеніемъ въ крови и что разные виды перемежающихся лихо-

радокъ зависятъ отъ разныхъ страданій разныхъ органовъ, — явились лихорадки: ревматическая, катарральная, гастрическая, желчная, глистная, сыпная, зубная, изнурительная и прочая, а мѣсто прежнихъ горячекъ заступилъ тифъ, который сталъ дѣлать на головной (съ пораженіемъ мозга) и брюшной (гнилостный). Но тифъ оказался между прочимъ такимъ хамелеономъ, что цвѣтъ его довольно мудрено уловить. За то и въ аллопатической практикѣ леченіе его прошло черезъ рядъ всѣхъ возможныхъ и невозможныхъ нелѣпостей, пока наконецъ не остановились въ наше время на одномъ укрѣпляющемъ питаніи съ полнымъ отрицаніемъ лекарствъ. Зато же, — въ случаяхъ недоразумѣнія, на тифъ сваливаются сплошь да рядомъ всевозможныя болѣзни: «тифозное состояніе» все покрываетъ, точно такъ, какъ бывало геморрой выручалъ изъ всѣхъ недоразумѣній касательно хроническихъ недуговъ. Во всей этой мудрости простая «здоровая» горячка какъ-то совсѣмъ затерялась: ученые врачи перестали о ней говорить, потому что сдали ее въ отдѣленіе «тифозныхъ состояній.» Притомъ русская наука, будучи, что ни говорите, пока все еще французско-нѣмецкою, не знала, что и дѣлать даже со словомъ «горячка»: по-французски все *Fièvre*, по-нѣмецки все—*Fieber*, лихорадка; слова *горячка* у нихъ вовсе нѣтъ. Какъ только перестали на каеэдрахъ говорить о *Fièvre chaude* и о *hitziges Fieber*, такъ наша горячка и осталась ни при-

чемъ. Для возстановленія законныхъ правъ этого очень хорошаго и вполне выразительнаго слова мы предложили-бы по-крайней-мѣрѣ нѣкоторыя изъ специальныхъ лихорадокъ называть горячками; напримѣръ, ревматическая горячка, скарлатинная горячка и т. д., то есть употреблять слово горячка вездѣ, гдѣ есть усиленное движеніе крови или воспалительное состояніе, и предоставить слово «лихорадка» безконечному ряду перемежающихся страданій, которыя большею частью отличаются ознобомъ.

А такъ какъ публика, руководствующаяся домашними лечебниками, не обязанная знать всѣхъ тонкостей новыхъ классификацій, — которыя притомъ завтра же могутъ и переимѣниться, — большею частью до-сихъ-поръ продолжаетъ вѣрить въ существованіе простой старинной горячки и нѣкоторые даже изъявляли намъ удивленіе, что ея нѣтъ въ нашемъ лечебникѣ, то мы намѣрены пополнить этотъ пробѣлъ. Это тѣмъ легче сдѣлать, что по личному нашему убѣжденію простая горячка продолжаетъ существовать и лучше признавать ее за горячку, чѣмъ относить къ хамелеону тифу, который только въ соблазнъ вводить.

Горячка, состоящая въ сильномъ возбужденіи кровеносной системы съ сильнымъ жилогіеніемъ, общимъ жаромъ, какъ-бы общимъ воспаленіемъ всего организма, съ сухостью рта, быстрымъ испареніемъ и сухостью кожи, уменьшені-

емъ количества и сгущеніемъ мочи, безпокойствомъ, метаніемъ, грезами, бредомъ и спячкою приключается отъ очень разнообразныхъ причинъ, начиная отъ простуднаго задержанія испарины до нравственныхъ потрясеній. Отличительная черта этой болѣзни, которую мы продолжаемъ называть горячкою, состоитъ въ отсутствіи сколько-нибудь явныхъ признаковъ пораженія одного какого-нибудь органа: воспалительное состояніе повидимому занимаетъ весь организмъ. Бредъ и спячка тутъ вовсе не доказываютъ мѣстнаго пораженія мозга,—воспаленіе мозга и его оболочекъ вообще встрѣчается рѣдко и то больше въ дѣтскомъ возрастѣ, — а просто при общемъ воспалительномъ (горячечномъ) состояніи всего организма и при бурномъ волненіи крови отправления мозга очень естественно сбиваются. При нѣкоторыхъ предрасполагающихъ обстоятельствахъ воспаленіе крови изъ общаго конечно можетъ обратиться и въ мѣстное воспаленіе оболочекъ мозга. Но въ большинствѣ случаевъ этого не бываетъ. Лечение этой болѣзни въ старину состояло, разумѣется, въ прохлажденіи (холодное и кислое питье и ледъ на голову) и отвлеченіи (кровоупусканіе, пиявки), прочищеніи проносными и т. д. Гомеопатическое капиталное средство, очевидно *Aconit.*, который обнимаетъ всѣ симптомы отъ перваго до послѣдняго. Только въ случаѣ слишкомъ преобладающаго напора крови къ головѣ, производящаго сильный

бредъ, особенно при открытыхъ глазахъ, нужна бываетъ *Belladonna*. Въ запущенныхъ случаяхъ при безчувственной спячкѣ съ храпомъ, если *Bell.* уже не дѣйствуетъ, можетъ понадобиться *Opium*.

6. ТИФЪ, НЕРВНАЯ И ГНИЛАЯ ГОРЯЧКА.

Тифъ состоитъ въ особенномъ измѣненіи крови, и можетъ гнѣздиться въ животѣ, въ легкихъ, въ мозгу и его оболочкахъ. Чаще всего центромъ болѣзни бываетъ нижняя часть кишечнаго канала. Вскрытіе умершихъ отъ тифа показало, что такъ называемыя пейеровскія железы въ тонкой, слѣпой и толстой кишкахъ припухаютъ, воспаляются и обращаются въ нарывы. Обнаруживающіяся во время развитія болѣзни нервныя явленія подали поводъ къ названію ея нервною горячкой. Названіе это не соотвѣтственно тѣмъ болѣе, что можетъ подать незнающему ложное понятіе о болѣзненныхъ процессахъ, составляющихъ основаніе тифа и обыкновенно относящихся къ этимъ нервнымъ явленіямъ, какъ причина къ слѣдствію.

Важнѣйшія и чаще всего соотвѣтствующія тифу лекарства: *Acon.*, *Bell.*, *Bryon.*, *Rhus*, *Nux.-vom.*, *Cocc.*, *Arsen.*, *Carb.-an.*, *Phosph.-ac.*, *Op.*, *Phosph.*, *Mur.-ac.*

Aconitum приличенъ въ началѣ болѣзни, когда между виѣшними причинами главную роль играютъ утомленіе черезъ силу въ связи съ простудой или душевнымъ потрясеніемъ и въ особенности при обнаруженіи слѣдующихъ припадковъ: въ продолженіи нѣсколькихъ дней легкой ознобъ съ тяжестью и утомленіемъ въ членахъ; отсутствіе аппетита; безпокойный пугливый сонъ; возвышеніе температуры кожи до сильнаго общаго жара съ неутолимою жаждой и твердымъ, полнымъ, ускореннымъ пульсомъ; лицо, то горитъ, то блѣднѣетъ; кровь приливаетъ въ голову и грудь; головокруженіе, бредъ во снѣ, нервное безпокойство и раздраженіе, біеніе сердца, страхъ и уменьшенное отдѣленіе мочи.

Если послѣ нѣсколькихъ пріемовъ *Acon.* не будетъ спокойнаго сна или общей теплой испарины и пульсъ не утратитъ твердости и скорости, то нужно немедленно взяться за одно изъ слѣдующихъ средствъ:

Belladonna — когда есть замѣтное пораженіе мозга; конвульсивныя подергиванія въ членахъ, безпокойство въ рукахъ, ногахъ и головѣ, побуждающее къ непрерывному движенію; припадки обморока, сонливость, снычка съ храпомъ; смѣна блѣдности и холода съ краснотою и жаромъ въ лицѣ, вздрагиваніе со сна, вслѣдствіе страшныхъ сновидѣній; безпамятство и бредъ наяву; стоны, попытки уйти; внутренній жаръ; головная боль и головокруженіе съ блестящими

вытаращенными глазами и расширенными зрачками; усиленіе припадковъ отъ шума и яркаго свѣта; сухость губъ и рта; сухой, горячій, красный, растрескавшійся языкъ; отсутствіе аппетита, палящая жажда; затрудненное глотаніе; вздутый животъ, чувствительный къ прикосновенію; частыя, малыя, поносистыя испражненія; темнокрасная моча въ небольшомъ количествѣ и съ краснымъ осадкомъ.

Bryonia—послѣ незначительной простуды боль, какъ-будто тѣло избито; бьющая, распирающая головная боль во лбу; болѣзненная чувствительность головной кожи къ прикосновенію; головокруженіе при вставаніи съ мѣста; усталость и тяжесть въ членахъ; нерасположеніе къ движенію и открытому воздуху; бессонница вслѣдствіе волненія крови, жара и тоски; пугающія сновидѣнія въ полусонномъ состояніи; горечь во рту, желто обложенный языкъ; при умѣренной жаждѣ отвращеніе отъ пищи; тошнота, давленіе и колотье подъ ложечкою и въ подреберьяхъ; недостаточныя и твердыя испражненія или совершенный запоръ; при сильномъ общемъ жарѣ бредъ о своихъ дѣлахъ съ искаженіемъ чертъ лица, хватаніемъ за болящую голову и со стонами; бѣлая или красная мелкая сыпь; жажда при сухомъ, растрескавшемся языкѣ; красное вздутое лицо.

Rhus—чрезвычайная слабость и изнеможеніе; сонливость, желаніе лежать; бормотаніе и ощипываніе около себя; безпамятство или болтливый

бредъ съ попытками бѣжать, въ перемежку съ яснымъ сознаниемъ, въ продолженіи котораго больной жалуется на жестоку ю боль около желудка, особенно при прикосновеніи; поносистыя, иногда кровавистыя испражненія большею частью послѣ полуночи; темная моча; сухой жаръ съ тоскою или клейкій потъ; притупленіе слуха.

Nux-vomica — чрезвычайная чувствительность всѣхъ органовъ, въ особенности же слуха и зрѣнія; сонливость, подобная опьяненію; бѣло обложенный или черноватый языкъ; жажда при отвращеніи отъ всякаго питья; отвращеніе отъ пищи; гнилой или горькій вкусъ во рту; терзающая, дающая головная боль съ головокруженіемъ; тоскливое біеніе сердца; біеніе, давленіе и натяженіе подъ ложечкой и въ подреберьяхъ; ощущеніе онѣмѣнія и въ членахъ, злое, сварливое расположеніе духа.

Cocculus приличенъ въ подобныхъ же обстоятельствахъ, какъ и *Nux-vomica*, въ особенности же, когда сильны обмороки и головная боль или когда отнимаются члены.

Arsenicum даже въ самыхъ отчаянныхъ случаяхъ можетъ дать хорошій исходъ болѣзни, если употребленъ во-время, то есть тогда, когда начинается дѣйствительное соотвѣтствіе припадковъ; такъ на примѣръ, когда тифъ образовался изъ другой болѣзни пищевыхъ путей, гастрической или желчной лихорадки или холеры, или когда въ самомъ началѣ болѣзни повидимому незначи-

тельные страданія, одно изверженіе рвотой или два-три поносистыхъ испражненія, вдругъ причиняють чрезвычайный упадокъ силъ; далѣе, когда тифъ принимаетъ перемежающійся характеръ или же прямо осложняется перемежающеюся лихорадкой. Прочіе признаки, требующіе этого средства, суть жгучая боль въ животѣ, при дотрогиваніи чрезвычайно ожесточающаяся, или же больной утверждаетъ, что вовсе не чувствуетъ никакой боли, но въ то же время морщится, когда ему пожмутъ животъ около праваго бедра; сухой, черноватый, растрескавшійся языкъ; язвины во рту; палящая жажда; головокруженіе и шумъ въ головѣ; притупленіе слуха; блѣдное, сѣроватое лицо съ измѣненными чертами; частые позывы на рвоту съ припадками дурноты; вздутый животъ, желтоватыя, водянистыя, вонючія, объѣдающія проходъ испражненія, иногда непроизвольно отходящія; жгуче-горячая, сухая какъ пергаментъ кожа на тѣлѣ, при холодныхъ какъ ледъ рукахъ и ногахъ; красныя пятна, какъ подтеки крови или бѣлая мелкая сыпь; чрезвычайная слабость и худоба.

Carb animalis приличенъ при подобныхъ же обстоятельствахъ, какъ и *Ars.*, особенно же, когда есть кровотеченіе изъ носу или изъ задняго прохода; при вялой, липкимъ, вонючимъ потомъ покрытой кожѣ; при одурѣломъ, какъ-бы тупоумномъ состояніи, тоскѣ, стѣсненіи, пролежняхъ и косноязычии.

Phosphori-acidum—особенно при совершенномъ равнодушіи и безчувственности съ блѣднымъ, осунувшимся лицомъ, бессмысленно вытаращенными глазами; только посторонніе громкіе оклики и расталкиванія могутъ привести больного въ сознаніе, и тогда онъ отвѣчаетъ правильно, но лѣнливо и неохотно; поносистыя испражненія безъ боли; темная, мутная моча, языкъ сухъ или обложенъ клейкою слизью.

Opium бываетъ полезенъ при безчувственномъ состояніи и спячкѣ съ темною краснотой, жаромъ и вздутостью лица, дико вытаращенными глазами, отвислою нижнею челюстью, громкимъ храпомъ, бредомъ и бормотаньемъ и при упорномъ запорѣ.

Phosphorus—когда больной истощенъ потерей соковъ, при чрезвычайной слабости и худобѣ, особенно рукъ; сѣромъ цвѣтѣ лица съ осунувшимися чертами и впалыми глазами или съ отекомъ около глазъ; чрезвычайной чувствительности всѣхъ органовъ; пугливости или притупленія слуха, особенно въ отношеніи къ человѣческому голосу; кровоточивости десенъ; кровавыхъ пятенъ; боли подъ ложечкой отъ прикосновенія и движенія; при частыхъ кашицевидныхъ сѣровато-коричневыхъ испражненіяхъ. Также когда есть затрудненіе дыханія; стѣсненіе, тоска и тяжесть на груди; кашель съ болью въ груди, то колющею, то жгучею, то отдирающею и съ коричневатой

красною, ржавою или кровянистою мокротою и ночнымъ потомъ.

Muriatis-acidum — въ подобныхъ же случаяхъ, какъ и *Phos. ac.*, но въ особенности когда примѣчается: безпрестанное съезживанье больного въ постелѣ при невнятномъ бормотаніи и отсутствіи сознанія; обильная водянистая моча; частый, перемежающійся пульсъ.

При чрезвычайномъ разнообразіи формъ, въ какихъ тифъ способенъ проявляться, не удивительно, если и всѣхъ здѣсь показанныхъ средствъ будетъ недостаточно. Вполнѣ предупредить подобную недостаточность нѣтъ возможности и мы по необходимости все остальное предоставляемъ соображенію врача, тѣмъ болѣе, что тифъ именно одна изъ тѣхъ болѣзней, которая требуютъ не только большаго вниманія, но и весьма обширнаго знанія гомеопатической фармакологіи, чтобы въ каждомъ данномъ и почти всегда особенномъ, отъ другихъ отличномъ случаѣ, найти соотвѣтствующее средство.

Для благополучнаго исхода болѣзни весьма важно и необходимо помѣстить больного въ просторной, свѣтлой комнатѣ, доступной свободному и безопасному провѣтриванію. Только при чрезвычайной чувствительности больного къ свѣту нужно, пока это состояніе продолжается, завѣшивать окна темною тканью. Всякій утомительный шумъ также долженъ быть удаленъ. Температура должна поддерживаться по возможности

ровная, не ниже 15° и не выше 17° Р. Постель должна быть удобная, эластическая, и одѣяло въ особенности въ началѣ не слишкомъ теплое. Такъ какъ возвратъ этой болѣзни бываетъ чрезвычайно опасенъ и малѣйшая неосторожность можетъ быть неисправимо губительною, то на діетическое содержаніе больного и выздоравливающего, нужно обращать чрезвычайно строгое вниманіе.

Оказывающіяся въ продолженіи болѣзни красныя чувствительныя мѣста, угрожающія образованіемъ пролежней, слѣдуетъ обмывать по два или по три раза въ день водою съ *Tinct. arnic.* по равнымъ частямъ; къ дѣйствительно открывающимся ранамъ для предупрежденія антонова огня, если жизненные силы еще не невосвратно упали, можно прикладывать тертую морковь.

7. ПЕРЕМЕЖАЮЩАЯСЯ ЛИХОРАДКА.

Перемежающаяся лихорадка обыкновенно состоитъ изъ трехъ смѣнь: озноба, жара и пота, за которыми слѣдуетъ промежутокъ безъ видимаго или ощутительнаго страданія, за исключеніемъ болѣе или менѣе значительнаго утомленія и слабости. Лихорадочныя припадки возвращаются каждый день, черезъ 2 или черезъ 3 дня, большею частью въ одинъ и тотъ же часъ. Ли-

хорадки господствуютъ въ особенности въ сырыхъ, болотистыхъ мѣстахъ, весною и осенью. Лечение лихорадокъ сопряжено съ большими трудностями по причинѣ множества разнообразныхъ сопровождающихъ болѣзненныхъ явленій, которыя бывають въ тѣсной связи съ лихорадкой и непременно должны быть приняты въ соображеніе, потому что отъ самаго ничтожнаго изъ нихъ часто зависитъ выборъ лекарства. Лихорадка у каждаго больного, по причинѣ такихъ сопровождающихъ, а иногда и невидимыхъ предшествовавшихъ обстоятельствъ, можетъ имѣть свой особенный характеръ, и требовать, слѣдовательно, своего особеннаго средства. Наоборотъ, всякое лекарство производитъ свои особенныя лихорадочныя явленія, имѣетъ свою лихорадку, которую, поэтому, и можетъ гомеопатически уничтожать. Вотъ почему хина, столько прославленная за лихорадку, не можетъ быть всеобщимъ противулихорадочнымъ лекарствомъ; излечаетъ только одну извѣстную форму, а противъ сотни другихъ остается безсильною и, будучи употреблена не-въ-попадъ, въ большихъ количествахъ, причиняетъ только вредъ, къ прежней болѣзни прибавляетъ завалы въ печени и селезенкѣ, ослабленіе, отеки, водяную, — словомъ, — хинную болѣзнь.

China только въ тѣхъ случаяхъ оказывается цѣлительнымъ средствомъ, когда кромѣ дѣйствительно предшествовавшаго вліянія болотнаго мѣ-

азма есть соотвѣтствующія этому веществу болѣзненные явленія,—значительный упадокъ силъ, разслабленіе, тревожный, безпокойный сонъ; желтый, сѣрый цвѣтъ лица; дрожаніе членовъ; вздутый животъ и уменьшенное отдѣленіе мутной мочи съ краснымъ осадкомъ. Припадки сопровождаются передъ ознобомъ тошнотой или жаждой, голодомъ, головною болью, тоскливостью, біеніемъ сердца; жаждой обыкновенно между ознобомъ и жаромъ или послѣ жара, во время пота; ознобъ и жаръ перемежаются, или жаръ является долго спустя по минованіи озноба.

Arsenicum главное средство противъ всѣхъ тѣхъ лихорадокъ, въ которыхъ растительная дѣятельность организма очень подавлена, печень и селезенка увеличены въ объемъ, ноги отекаютъ и замѣтно чрезвычайное разслабленіе, а также, когда всѣ эти явленія причинены злоупотребленіемъ хины. Припадки отличаются силою и продолжительностью. Въ особенности силенъ и продолжителенъ бываетъ жаръ съ палящею неутолимою жаждой, сильнымъ раздраженіемъ кровеносныхъ сосудовъ и обильнымъ потомъ, который большею частію выступаетъ нѣсколько часовъ спустя послѣ жара. Сопровождающія явленія: тоска, судороги, боль, бредъ и параличныя состоянія,—явленія, которыя въ промежуткахъ между лихорадочными припадками пропадаютъ.

Ipecacuanha превосходное средство противъ лихорадки, причиненной разстройствомъ желудка и

въ особенности, когда есть полнота и давленіе въ желудкѣ послѣ всякаго принятія пищи; отвращеніе, тошнота, рвота, поносъ, стѣсненіе и давленіе въ груди, ощущеніе стягиванія, одышка, судорожный кашель. Явленія эти обнаруживаются большею частью только во время лихорадочныхъ припадковъ, передъ самымъ ознобомъ или во время его. Въ промежуткахъ они рѣдко показываются или же бываютъ очень слабы. Ознобъ ощущается больше внутри, чѣмъ на поверхности тѣла и нерѣдко отъ наружнаго согрѣванія усиливается. Жажда во время жара.

Nux-vomica соотвѣтствуетъ такимъ же лихорадочнымъ явленіямъ, какъ и *Ipec.*, въ особенности, если болѣзнь уже затянулась и когда притомъ замѣтны: худоба, слабость, желто-сѣрый цвѣтъ лица и значительное расстройство пищеваренія. Въ припадкахъ ознобъ не очень рѣзко отдѣляется отъ жара, такъ что ознобъ съ жаромъ встрѣчаются вмѣстѣ, или жаръ предшествуетъ ознобу или же при наружномъ жарѣ есть внутренній ознобъ и на оборотъ. Характеристическое отличіе лихорадки, которой соотвѣтствуетъ *N.-vom.*, состоитъ въ особенности въ томъ, что больной не только во время озноба, но и во время жара и пота желаетъ оставаться накрытымъ, потому что, лишь только раскроется, тотчасъ зябнетъ. Во все продолженіе болѣзни обыкновенно бываетъ запоръ.

Pulsatilla соотвѣтствуетъ въ особенности людямъ флегматическимъ, кроткимъ, блѣднымъ, ма-

локровнымъ и женщинамъ, имѣющимъ недостаточныя и неправильныя регулы. Въ припадкахъ ознобъ бываетъ продолжительнѣе жара и часто даже перебивается его. Во время самыхъ промежутковъ замѣчается зябкость или по крайней мѣрѣ руки и ноги стынуть. Жажды почти вовсе не бываетъ или очень мало, и только во время жара. Горькій вкусъ во рту; рвота слюною, желчью и кислыми веществами; головокруженіе, головная боль; обильная, водянистая моча.

Veratrum соотвѣтствуетъ злокачественнымъ асфигмическимъ лихорадкамъ съ слабостью, изнеможеніемъ, упадкомъ силъ, медленнымъ и слабымъ біеніемъ сердца и пульса, съ обильными водянистыми изверженіями, рвотою и поносомъ, съ блѣдною, холодною кожей, холоднымъ потомъ, осунувшимся и мертвенно-синеватымъ лицомъ. Припадки отличаются преобладаніемъ озноба и незначительнымъ, снаружи почти незамѣтнымъ жаромъ; жаждою во время озноба и темною, недостаточною мочей. Сопровождающія страданія являются въ особенности во время озноба.

Ignatia соотвѣтствуетъ лихорадкамъ слабѣйшей степени и въ особенности тѣмъ, которыя появляются вслѣдствіе испуга, досады и страха у чувствительныхъ и нервныхъ особъ. Во время припадковъ ознобъ и жаръ очень быстро смѣняются, являются иногда вмѣстѣ или занимаютъ только часть тѣла, такъ напримѣръ, что во время жара ноги стынуть. Жажда замѣтна только во время

озноба. Ознобъ уменьшается отъ наружнаго со-
грѣванья. Во время перемежекъ, кромѣ нѣкото-
рой слабости, нѣтъ никакихъ страданій.

Ferrum—въ особенности послѣ злоупотребленія
хины, при общемъ ослабленіи, опухоли и отвер-
дѣніи печени и селезенки, вздутіи живота, отека
ногъ, блѣдности губъ, десенъ и полости рта, и
при двойномъ, перемежающемся шумѣ въ шей-
ныхъ венахъ (волчковый шумъ, *bruit de diable*,
Nonnengeräusch, признакъ малокровія, открывае-
мый посредствомъ изслѣдованія стетоскопомъ).
Припадки сопровождаются приливами въ голову,
головною болью, головокруженіемъ, напряженіемъ
жилъ, отекомъ около глазъ, давленіемъ въ же-
лудкѣ и животѣ послѣ всякаго принятія пищи
или рвотою пищей, натуженіемъ въ животѣ и
одышкой.

Sina—специфическое средство противъ лихо-
радокъ, въ которыхъ тотчасъ послѣ припадка,
иногда послѣ рвоты является жадный голодъ.
Сопровождающія явленія: блѣдный, сѣроватый
цвѣтъ лица, синева подъ глазами, разширеніе
зрачковъ, жажда во время озноба и почти со-
вершенно чистый языкъ.

Natrum muriaticum соотвѣтствуетъ застарѣлымъ
лихорадкамъ или такимъ, которыя имѣютъ рас-
положеніе къ частымъ возвратамъ, сопровожда-
ются ломомъ въ костяхъ, желтымъ цвѣтомъ лица,
горькимъ вкусомъ во рту, изъязвленіемъ угловъ
рта и большою слабостью. Во время озноба и въ

особенности во время жара сильная головная боль; во время жара безсознательное состояніе, родъ спячки и потемнѣніе зрѣнія.

Capsicum—рѣшительно дѣйствующее средство противъ лихорадки, въ которой потъ является очень долго, иногда четырнадцать часовъ спустя послѣ озноба безъ жару, или когда жаръ предшествуетъ ознобу. Жажда во время озноба сильна. Во время жара внутри и снаружи сильное жженіе; слизистыя, жгучія поносистыя испражненія; ослизеніе во рту, въ горлѣ и желудкѣ; всякій шумъ невыносимъ.

Кромѣ того есть, конечно, еще очень много средствъ противъ различныхъ формъ лихорадокъ, но здѣсь невозможно привести всѣ.

8. ПРИЛИВЪ КРОВИ.

Приливъ крови въ извѣстной степени совершается и въ здоровомъ состояніи къ разнымъ органамъ во время ихъ усиленной дѣятельности. Напримѣръ, приливъ къ желудку во время пищеваренія, къ мышцамъ во время движенія, къ мозгу при напряженной умственной работѣ, къ легкимъ во время продолжительнаго говоренія, на бѣгу и т. д. Болѣзненный же приливъ зависитъ отъ ненормальнаго распредѣленія крови, отъ застоя ея въ тончайшихъ сосудахъ разныхъ органовъ, что со временемъ подаетъ поводъ къ

заваламъ и опухолямъ, или къ воспаленію и его слѣдствіямъ, или къ кровотеченіямъ и водянистымъ отложеніямъ, выпотамъ. Причина такого прилива заключается или въ самой крови, или въ нервной системѣ, или же происходитъ отъ болѣзненнаго состоянія какого-нибудь органа,—какъ напримѣръ, сердца, печени, легкихъ,—или отъ самыхъ тканей, если они слишкомъ слабы, слишкомъ легко растяжимы. Приливы бываютъ *механическіе*, когда происходятъ отъ внѣшняго или внутренняго нажима, давленія; *активные*, сопровождающіеся возвышенною жизнедѣятельностью крови, жаромъ, волненіемъ, біеніемъ, болью и пораженіемъ всей артеріальной системы (носящей красную кровь), и *пассивные*, съ упадкомъ жизненной силы крови, съ пороками въ составѣ, блѣдностью, водяностью крови, съ расслабленіемъ и страданіемъ венной системы (носящей темную кровь). Относящихся сюда указаній на средства надобно искать частію въ слѣдующей статьѣ, о полнокровіи, частію же по органамъ, которые страдаютъ.

КРОВОТЕЧЕНІЯ, см. по органамъ.

9. ПОЛНОКРОВІЕ.

Кровь готовится изъ питательныхъ соковъ, доставляемыхъ пищею желудку и всему

пищеварительному снаряду. Сама она въ свою очередь служить пищею и строительнымъ матеріаломъ для всѣхъ тканей организма. Полнокровіе состоитъ не въ избыткѣ *количества* крови, а въ измѣненіи ея состава отъ избытка въ ней отжившихъ частей, продуктовъ обмѣна веществъ, остатковъ отъ питанія и строенія тканей, остатковъ, которымъ слѣдовало освѣжиться въ соприкосновеніи съ воздухомъ, въ легкихъ, быть выдохнутыми въ видѣ углекислоты или выведенными изъ организма черезъ кожу, мочевые пути и т. д. Черезъ эту задержку вся масса крови пріобрѣтаетъ свойства болѣе венной, темной, нежели красной, артеріальной. Отсюда и состояніе это называется *венозностью*. Ясно, что такого состоянія невозможно измѣнить кровопусканіемъ, какъ это воображали дѣлать въ старину и какъ наследственная рутина иногда дѣлаетъ до-сихъ-поръ. Кровопусканіе имѣло бы смыслъ только въ такомъ случаѣ, если бы черезъ него выводились только отжившіе продукты обмѣна веществъ,— все то негодное, чему слѣдовало быть выкинутымъ. Простая же убавка количества не измѣняетъ состава: онъ остается такимъ же дурнымъ, какъ былъ. Если же и измѣняется при повторительныхъ кровоизвлеченіяхъ, пополняясь черезъ всасывающіе сосуды жидкостями изъ всѣхъ тканей организма, то это измѣненіе уже никакъ не можетъ быть выгоднымъ для здоровья, потому что оно, оставляя въ крови негодныя

части, прибавляетъ только воды. Потерявшіе много крови, какъ извѣстно, оканчиваютъ водяною. Если при этомъ принять еще въ соображеніе, что такъ называемое полнокровіе всегда зависитъ отъ какого-нибудь мѣстнаго страданія, мѣстнаго застоя, отъ переполненія одного или нѣсколькихъ органовъ, большею частію вовсе недоступныхъ ланцету и пиявкамъ, которые извлекаютъ кровь изъ подкожныхъ венъ, изъ периферіи (поверхности) тѣла, не касаясь настоящаго мѣста страданія, то, нельзя не подивиться, какъ такое громадное заблужденіе могло продержаться въ продолженіи нѣсколькихъ вѣковъ; какъ могли разумные люди, увлекаясь временнымъ обманчивымъ облегченіемъ своихъ больныхъ, проливать рѣки крови и не видѣть послѣдствій. Положимъ, что старина найдетъ свое оправданіе въ невѣдѣніи, въ отсутствіи и дѣтствѣ научной фізіологіи и патологіи. Но какъ теперь, во второй половинѣ девятнадцатаго вѣка, могутъ еще встрѣчаться врачи-партизаны кровопролитія, это уже рѣшительно непостижимо, непостижимо тѣмъ болѣе, что страданія отъ такъ называемаго малокровія очень часто бываютъ совершенно подобны симптомамъ полнокровія. Венозность бываетъ иногда преходящая, иногда и хроническая и присоединяется ко многимъ болѣзнямъ, особенно къ страданіямъ живота и сердца. Бываетъ и наслѣдственная. Происходитъ отъ излишества въ пищѣ и питъѣ, сидячей жизни, недо

статочнаго движенія и испражнений. Обнаруживается темно-желтымъ цвѣтомъ кожи, краснотою въ лицѣ, напряженіемъ венъ, багровыми пятнами на ногахъ, ножнымъ пѣтомъ, приливами къ головѣ (головною болью, головокруженіемъ), къ сердцу (сердцебіеніемъ), къ легкимъ (одышкою), припуханіемъ подъ ложечкой, запоромъ, геморроидальными страданіями, усталостью, тяжестью въ членахъ, ипохондріей. Ожесточается отъ спиртныхъ напитковъ, трудноваримой пищи, продолжительнаго сидѣнья, бездѣйствія, нравственныхъ раздраженій, словомъ, отъ всего, что замедляетъ кровообращеніе. Въ такомъ состояніи можно состарѣться безъ особенно тяжкихъ страданій. Но при удобномъ случаѣ и пренебреженіи діетой могутъ развиваться и болѣзненные перерожденія органовъ, особенно брюшныхъ. Гомеопатія, по вышеизложеннымъ причинамъ, не допускаетъ кровопизвлеченій и, владѣя болѣе надежными средствами, не подвергается опасности принять малокровіе за полнокровіе.

Главные средства противъ приливовъ къ разнымъ органамъ, при общемъ жарѣ *Acon.*; при жарѣ въ головѣ *Bellad.* и *Calc.*; при страданіяхъ живота, запорѣ, дурномъ расположеніи духа *Nux-vom.*; при чрезвычайной чувствительности, мигрени, отсутствіи аппетита, страданіи слизистыхъ оболочекъ, катаррѣ желудка *Sepia*; въ хроническомъ состояніи *Nitri-ac.* и въ особенности *Sulph.*

При брюшномъ полнокровіи въ особенности *Bellad.*, *Carb.-veg.*, *Nux.-vom.*, *Sepia*, *Sulphur*. Когда есть запоръ и опухоль органовъ, печени и селезенки: *Bry.*, *Lycop.*, *Nux.-vom.*, *Sulphur*: при ясно геморроидальномъ состояніи и язвахъ: *Graphit.* и *Sulphur*.

Лекарства въ этихъ случаяхъ даются въ рѣдкихъ приѣмахъ, но въ продолженіи долгаго времени и при соотвѣтствующей діетѣ.

10. УДАРЪ, ПАРАЛИЧЪ И ОНѢМѢНІЕ.

Ударъ или апоплексія, зависитъ отъ того же ненормальнаго состава и неправильнаго движенія крови. Онъ успѣшно лечится гомеопатическими средствами, но требуетъ очень скорой помощи и большой осмотрительности и искусства со стороны врача, потому что неудачный выборъ лекарствъ и промедленіе могутъ имѣть опасныя послѣдствія.

По уложеніи больного въ приличное положеніе и по удаленіи стѣсняющей одежды въ большей части случаевъ можетъ быть полезно дать нѣсколько часто повторенныхъ приѣмовъ *Arn.*

Полезно также положить на голову компрессъ съ арниковою примочкой.

Очень пожилымъ людямъ, особенно когда дыханіе храпливое и опасность угрожаетъ легкимъ,

бываетъ приличенъ *Baryt.* При совершенной безчувственности, расширеніи зрачковъ, красномъ, вздутомъ лицѣ и невозможности глотать, предпочитается *Bell.* и *Opium.*

Но капитальное средство, недавно открытое и уже во многихъ важныхъ случаяхъ оправдавшееся—*Gelsemium nitidum.* По токсическимъ свойствамъ своимъ это растеніе причиняетъ у здороваго всѣ явленія полной апopleksii и паралича и поэтому въ данныхъ случаяхъ болѣзни самымъ удовлетворительнымъ образомъ уничтожаетъ подобныя явленія.

Характеристическіе симптомы, могущіе служить указаніями при употребленіи *Gelsemin'a*:

Общая слабость, дрожаніе рукъ и ногъ; всѣ мускулы какъ-бы распущены и перестаютъ повиноваться; ледяной холодъ въ конечностяхъ; жаръ въ головѣ и лицѣ; тупая головная боль съ тяжестью и давленіемъ въ вискахъ, во лбу и въ затылкѣ, усыпленіемъ, помраченіемъ зрѣнія, отяжелѣніемъ головы какъ отъ опьяненія; ощущеніе какъ-будто мозгъ въ головѣ тяжелъ; мозгъ какъ-будто связанъ; жестокая давящая боль во лбу и въ темени; боль какъ-будто мозгъ раздавленъ, головокруженіе, обморокъ; затрудненное дыханіе; замедленіе пульса и сердцебіенія; усиленное біеніе шейныхъ артерій; одурѣніе; потеря связи въ мысляхъ, неспособность остановить вниманіе на предметѣ; шумъ въ ушахъ и притупленіе слуха; потеря зрѣнія; расширеніе зрачковъ; мускулы

лица скорчены, особенно около рта; кровянистая слюна; онѣмѣніе и неповоротливость языка; напрасныя усилія выговорить слово; судорожное сжатіе горла; обильная водянистая моча.

Многія параличныя явленія, производимыя *Gelsemin'*омъ доказываютъ, что это лекарство можетъ быть пригодно не только для устраненія собственно приступа апоплексіи или кровяного удара, но соотвѣтствуетъ также такъ называемому нервному удару и можетъ быть пригодно для леченія послѣдствій того и другаго, то есть такъ называемыхъ параличныхъ состояній.

Величина приѣма въ апоплексіи, не выше 3-го разведенія и въ частыхъ повтореніяхъ, — черезъ часъ, полчаса и чаще, если нужно. Но въ послѣдственныхъ параличныхъ состояніяхъ, кажется, лучше дѣйствуютъ среднія и высшія разведенія.

Противъ остающихся послѣ удара общихъ онѣмѣній разныхъ частей, можно также съ успѣхомъ дѣйствовать продолжительнымъ употребленіемъ *Rhus*, и затѣмъ *Coccul.* и *Causticum*. Но и тутъ, кажется, первое мѣсто скоро займетъ *Gelseminum*.

Касательно различныхъ частей, пораженныхъ параличемъ, можно принять въ соображеніе еще слѣдующія указанія:

При параличѣ **ЛИЧНЫХЪ** мускуловъ: *Bell.*, *Caust.*, *Graph.*

— **ВѢКЪ**: *Sepia*, *Spig.*, *Stram.*

— **ЯЗЫКА**: *Bell.*, *Caust.*, *Lach.*, *Muriat-ac.*

При параличѣ верхнихъ конечностей: *Cocc.*,
Ferr., *N-vom.*, *Rhus.*

— нижнихъ конечностей: *Bry.*, *Plumb.*,
Sec.-corn., *Veratr.*, *Zinc.*

— мочеваго пузыря: *Bell.*, *Camph.*, *Canth.*
Puls., *N-vom.*

При леченіи паралича вслѣдствіе ревматизма и ломоты слѣдуетъ сообразить сказанное объ этихъ болѣзняхъ вообще. Противъ параличныхъ состояній вслѣдствіе скрывшихся отдѣленій и сыпей иногда помогаютъ *Sulph.* и *Dulc.*, а противъ онѣмѣній вслѣдствіе простуды—*Rhus.*

11. МАЛОКРОВІЕ И БЛѢДНАЯ НЕМОЧЬ.

Хотя даже большинство патологовъ обыкновенно говорить, что въ состояніяхъ, называемыхъ малокровіемъ, крови дѣйствительно бываетъ мало, однакожъ это не значить, чтобы кровеносные сосуды (жилы) были пусты или мало наполнены. Здѣсь точно такъ же, какъ и при полнокровіи болѣзненное состояніе зависитъ отъ состава крови,—меньшаго количества красныхъ кровяныхъ шариковъ и преобладанія бѣлыхъ (несозрѣвшихъ),—отъ недостатка въ ней питательныхъ веществъ; фибрина, желѣза, отчего она и бываетъ жиже, легче и блѣднѣе. Въ хроническомъ состояніи изъ этого развивается блѣдная немочь и водяность

крови, водяная болѣзнь. Малокровіе проявляется: блѣдностью слизистыхъ оболочекъ своеобразною блѣдной кожи; тусклыми, временными вспышками румянца; зябкостью или, наоборотъ, постояннымъ ощущеніемъ жара; холодѣніемъ рукъ и ногъ; малымъ, мягкимъ пульсомъ; слабостью, вялостью мышцъ и оттого усталостью, безсиліемъ, сонливостью, неспособностью ходить; сердцебіеніемъ, одышкой, особенно при восхожденіи на лѣстницу или высоту; отсутствіемъ аппетита, отвращеніемъ отъ мяснаго; позывами на кислое, болью въ желудкѣ; разными первыми страданіями, головною болью, судорогами, чрезвычайною чувствительностью и плаксивостью. Самымъ вѣрнымъ признакомъ служить распознаваемый стетоскопомъ особенный волчковый шумъ (*Nonnengeräusch, bruit de diable*) въ шейныхъ венахъ. У женщинъ, во время мѣсячнаго, вмѣсто здоровой крови отходить водянистая, мяснымъ обмывкамъ подобная жидкость или мѣсячное и совсѣмъ замѣняется бѣлыми. Все причиняющее убытки питанію и образованію здоровой крови можетъ произвести малокровіе и блѣдную немочь. Къ такимъ причинамъ принадлежать въ особенности потеря крови, трата соковъ, недостатокъ и дурное качество пищи; недостатокъ чистаго воздуха, свѣта, теплоты, движенія; слишкомъ быстрый ростъ, чрезвычайное напряженіе силъ, злоупотребленіе лекарствъ, душевныя волненія, горе; болѣзни сердца и желудка. Золотушное сложеніе и туберкулезное расположе-

ніе обыкновенно сопровождаются малокровіемъ. При пользованіи этого состоянія должно въ особенности обращать вниманіе на діету и соотвѣтствующее питаніе, безъ чего леченіе не можетъ принести никакой пользы.

Хотя издавна уже обобщенное старую медицинской понятіе о тожествѣ малокровія съ недостаткомъ желѣза въ крови и неоспоримо, однакожь непосредственное введеніе желѣза дачею его въ большихъ приѣмахъ и въ видѣ минеральной воды рѣдко достигаетъ цѣли. Это происходитъ оттого, что блѣдная немочь, напримѣръ, очень часто происходитъ отъ страданія нервной системы и оттого, что при малокровіи вообще желѣза въ крови мало, потому что пищевые и кроветворящіе снаряды организма неспособны извлекать желѣза изъ пищи какъ слѣдуетъ. Простая механическая прибавка въ этомъ случаѣ играетъ въ отношеніи къ кроветворящимъ органамъ ту же роль, какъ неудобоваримая пища въ отношеніи къ разслабленному желудку. Оттого оно, вмѣсто пользы, и приноситъ очень часто вредъ, нервное раздраженіе и боли; усиливаетъ неправильность движенія крови, сердцебіеніе; причиняетъ страданіе дыхательныхъ органовъ и т. д.

Для пополненія недостающаго желѣза въ крови гомеопатія не вливаетъ его прямо въ томъ количествѣ, какое было бы желательно, а старается пробудить въ организмѣ способность къ самодѣльной выработкѣ желѣза, способность

къ извлеченію его изъ обыкновенной пищи. Лекарства тутъ служатъ только возбуждателями реакціи. Такимъ возбуждателемъ служить и желѣзо (*Ferrum*), но въ дозахъ сравнительно очень малыхъ, какъ дѣятель не химическій, а динамическій, въ особенности тогда, когда пищевареніе уже исправлено и когда слабосиліе носитъ характеръ раздраженія (головокруженіе, шумъ въ ушахъ, сердцебіеніе, одышка), при бѣлахъ, въ кровотеченіяхъ. Большинство гомеопатовъ въ этомъ случаѣ употребляетъ желѣзные препараты низшихъ дѣленій, 3 — 1 и даже тинктуру въ количествахъ 2—5 капель. При золотушномъ сложеніи, ожирѣніи, опухоли железъ, страданіи костей, хроническомъ ослизеніи желудка очень часто бываетъ пригодна *Calc.* При истощеніи отъ потери соковъ и послѣ трудныхъ болѣзней *Chin.* При преобладаніи расстройства пищеваренія, въ слабѣйшихъ степеняхъ болѣзни или въ началѣ ея, *Pulsat.* При преобладаніи нервныхъ и судорожныхъ страданій *Ignat.* или *Plat.* При упадкѣ питанія *Natr.-mur.* и *Sulph.* При истощеніи вслѣдствіе половыхъ излишествъ *Sepia*, а послѣ тифа или при туберкулахъ *Phosph.*

12. ЗОЛОТУХА.

Золотуха есть болѣзненное состояніе соковъ и не только передается дѣтямъ по наслѣдству,

но еще болѣе того порождается неправильнымъ содержаніемъ и несоотвѣтствующимъ питаніемъ. Проявленія этой болѣзни въ высшей степени разнообразны и часто ведутъ къ самымъ опаснымъ и разрушительнымъ слѣдствіямъ. Лечение кромѣ примѣненія соотвѣтствующаго діететическаго содержанія, какъ самаго необходимаго условія, требуетъ самаго внимательнаго наблюденія и искуснаго выбора соотвѣтствующихъ каждому данному случаю средствъ. Здѣсь поэтому могутъ быть даны только нѣкоторыя самыя общія указанія.

Кромѣ принадлежащаго этой же болѣзни страданія железъ, о которомъ говорено выше, самыя обыкновенныя явленія: толстый животъ, слабыя ноги, опухоль носа и губъ, блѣсоватый цвѣтъ кожи, неправильное пищевареніе, расположеніе къ поносу, жадность къ пищѣ, особенныя позывы на мѣлъ, известъ, уголь и т. д. Дѣти трудно начинаютъ ходить; сложеніе костей вообще слабо, расположено къ размягченію и костоѣдѣ.

Кромѣ тщательнаго діететическаго содержанія на питательной и легкой мясной пищѣ съ воздержаніемъ отъ излишняго кормленія картофелемъ, хлѣбомъ и вообще мучною пищею; при содержаніи въ чистомъ воздухѣ, въ чистотѣ посредствомъ частаго купанья и при упражненіи всѣхъ мышцъ движеніемъ, полезными средствами могутъ быть: *Calc.*, *Merc.*, *Sil.* и *Sulph.*

Calcareae соотвѣтствуетъ въ особенности при слабости ногъ, искривленіи костей, когда дѣти

долго не начинаютъ ходить, животъ толстъ, а прочія части худы; при расположеніи къ поносу, твердыхъ опухоляхъ железъ, медленномъ прорѣзаніи зубовъ, опухоли носа и губъ, тощемъ и морщинистомъ лицѣ, большой головѣ и медленномъ заростаніи темени.

Mercurius—при опухоли и нагноеніи железъ, течіи изъ ушей, воспаленіи глазъ, паршѣ на головѣ, расположеніи къ обильной испаринѣ, зеленоватому или слизистому поносу, хроническому насморку, опухоли костей и костоѣдѣ.

Silicea—при костоѣдѣ, рахитизмѣ, воспаленіи суставовъ, хроманіи отъ вертлужнаго страданія, нагноеніи железъ, вонючемъ истеченіи изъ ушей и изъ носу.

Sulphur—въ особенности въ началѣ леченья и при сыпи на кожѣ, лишаяхъ, паршѣ, отвердѣніи железъ и воспаленіи глазъ.

Кромѣ того въ разныхъ состояніяхъ этой болѣзни полезными могутъ быть: *Ars.*, *Baryt.*, *Bell.*, *Brom.*, *Нер.*, *Jod.*, *Rhus.*, *Staph.*

13. РАХИТИЗМЪ, АНГЛІЙСКАЯ БОЛѢЗНЬ.

Эта болѣзнь есть не что иное, какъ видоизмѣненіе золотухи и отличается только тѣмъ, что страданіе, вмѣсто мягкихъ частей и железъ, сосредоточивается въ костяхъ. Образуются искривле-

нія костей, размягченіе и опухоль концевъ костей, особенно малыхъ берцовыхъ, отчего походка становится неровною, шаткою, а иногда и совсѣмъ невозможно ходить. При сильномъ развитіи болѣзни бываетъ искривленіе позвоночнаго столба, опухоль, размягченіе и костоѣда въ позвонкахъ. Главное средство противъ этой болѣзни *Calc.* и въ особенности *Calcareæ phosphorica*. Относительно діеты соблюдается то же, что сказано по поводу золотухи.

14. ЗОБЪ.

Зобъ или опухоль околоторанной щитовидной железы, рѣдко сопровождается чувствительнымъ разстройствомъ и только при весьма значительномъ увеличеніи объема можетъ причинить затрудненіе дыханія давленіемъ на горло. Большею частію удаленіе зоба требуется ради наружнаго вида. Главныя средства противъ зоба *Spongia* и *Jod.*, которыя однакожь нужно употреблять довольно долго.

При значительномъ затрудненіи дыханія, одышкѣ, хриплостѣ, щекотаніи въ горлѣ и катарральномъ состояніи, часто очень полезно *Нер.*, въ нѣкоторыхъ упорныхъ случаяхъ помогаютъ также *Calcareæ*, *Silicea* и *Natr.-mur.* Можетъ быть также *Fluor.-ac.*

Должно остерегаться іода и іодистыхъ препаратовъ въ большихъ приемахъ, потому что это можетъ имѣть весьма опасныя послѣдствія, особенно для расположенныхъ къ страданію легкихъ. Замѣчено, что туберкулезное расположеніе легкихъ при образованіи зоба часто ограничивается, а съ насильственнымъ уничтоженіемъ его (посредствомъ мазей и втираній), напротивъ, усиленно развивается.

15. ЧАХОТКА.

До сихъ-поръ противъ чахотки вполнѣ развитой, къ сожалѣнію, еще не найдено вѣрныхъ средствъ, хотя уже есть нѣкоторыя очевидно благотвѣтельно дѣйствующія противъ туберкулезнаго состоянія и хотя есть уже возможность остановить и, можетъ-быть, даже уничтожить эту страшную болѣзнь на первой степени ея развитія.

Противъ первыхъ признаковъ чахотки могутъ быть употреблены тѣ же средства, которыя указаны противъ охриплости, хроническаго катарра и кровохарканія. Важнѣйшими средствами можно считать: *Calc.*, *Bry.*, *Droser.*, *Ferr.*, *Jod.*, *Kali*, *Merc.*, *Phosph.*, *Stann.* и *Sulph.* Когда болѣзнь обнаруживается вслѣдствіе воспаленія легкихъ и имѣетъ, какъ обыкновенно въ этихъ случаяхъ, очень быстрый исходъ (скоротечная чахотка), то лучшія средства *Phos.* и *Sulph.* Когда она про-

исходитъ вслѣдствіе значительной потери крови и другихъ соковъ, продолжительнаго нагноенія и истощенія вообще, то въ особенности соотвѣтствуютъ *Ferr.*, *Calc.* и *Chin.*

При очень значительномъ отдѣленіи гноевидной мокроты, полезны бываютъ: *Merc.*, *Stann.* и *Kali-carb.* При сильномъ кровохарканіи: *Arn.*, *Bellad.*, *Ferr.*, *Kreosot.*, *Phosph.* и *Nitr-acid.* При изнурительномъ потѣ или поносѣ: *Ars.*, *Calc.*, *Merc.*, *Ferr.*

При лихорадочныхъ припадкахъ и изнурительной лихорадкѣ: *Ars.*, *Bry.*, *Calc.*, *Ferr.* и *Sulph.*

16. ЦЫНГА И КРОВЯНЫЯ ПЯТНА.

Цынга или скорбутъ, повидимому, состоитъ въ особенномъ водянистомъ состояніи крови и часто происходитъ отъ исключительнаго употребленія соленой и вяленой пищи, отчего встрѣчается преимущественно на корабляхъ и на взморьяхъ, бываетъ однакоже и безъ этихъ причинъ. Цынга отличается въ особенности синеватой опухлостью и кровоточивостью десенъ, багровыми пятнами въ родѣ подтековъ на тѣлѣ и различными кровотечениями. Къ этому присоединяются боль въ членахъ, общая слабость и безсиліе, разстроенное пищевареніе и въ сильныхъ степеняхъ даже лихорадочныя явленія. Цынга находится въ весьма близкомъ сродствѣ съ такъ называемыми

верлгофовыми кровавыми пятнами. Обѣ болѣзни, очевидно, состоятъ въ одинаковомъ измѣненіи крови, только проявляются различно: одна преимущественно на кожѣ, другая на деснахъ.

Главные средства противъ этихъ болѣзней — *Phosphorus*, *Staphys.* и *Merc.*, показанныя всегда, когда десны распухли, кровоточивы, кровь идетъ изо рта, носа, горла, груди; на тѣлѣ, въ особенности на рукахъ и ногахъ, являются пятна и полосы. Когда десны очень повреждены, изъязвлены, сильно пахнутъ и кромѣ того есть признаки гниlostнаго разложенія крови, то бываютъ также приличны *Kreos.* и *Sulph.-acid.* При водяныхъ отекахъ, нагноеніи и признакахъ антонова огня *Arsen.* Когда основное страданіе большею частью устранено, но отъ потери крови больной очень истощенъ, то должно дать *Chin.*

17. ВОДЯНАЯ.

Эта болѣзнь всегда составляетъ только признакъ и послѣдствіе (или произведеніе) другой, глубже лежащей болѣзни. Она бываетъ легкая (подкожная, отекъ) и трудная, внутри разныхъ полостей тѣла; можетъ появляться быстро, вслѣдствіе острыхъ, скоротечныхъ мѣстныхъ и общихъ воспаленій, напр. послѣ скарлатины (подкожная водянка), воспаленія шудятъ (отекъ), воспаленія оболочекъ мозга (острая головная водянка у дѣ-

тей); происходит и отъ длительныхъ страданій съ измѣненіемъ состава разныхъ внутреннихъ органовъ, — отъ болѣзней сердца, печени, селезенки, почекъ, яичниковъ, брюшныхъ железъ, суставовъ и разныхъ сукровичныхъ оболочекъ (под-реберной плевры, околосердечной сумки, брюшины). Легкая подкожная водянка и простые отеки лечатся довольно удобно, но всѣ прочіе виды изліянія воды въ полостяхъ тѣла рѣдко бываютъ излечимы, потому именно, что зависать отъ излечимости или неизлечимости пораженія и измѣненія въ составѣ того органа, отъ котораго происходятъ, и потому что водяная въ этихъ случаяхъ обыкновенно составляетъ дурной конецъ главной болѣзни. Если есть еще возможность поправить главный больной органъ, то и водяная излечима, а нѣтъ, такъ нѣтъ. Вотъ почему всеобщаго дѣйствительнаго лекарства отъ водяной быть не можетъ и вотъ почему великое множество хваляемыхъ (обыкновенно мочегонныхъ) лекарствъ въ большей части случаевъ оказывается бесполезнымъ. При леченіи водяной болѣзни частью можно имѣть въ виду только временно облегчить, — что называется протянуть больного, найти средство приостановить выдѣлку воды. Просто гнать воду черезъ мочевые пути мочегонными или еще хуже искусственнымъ выпусканіемъ, прободеніемъ живота, значить убирать одни произведенія болѣзни и усиливать выдѣлку ихъ. Основательно облегченія, стало-быть, можно

ожидать только отъ средствъ, останавливающихъ производство. Но и тутъ можетъ помочь только такое средство, которое способно дѣйствовать на главную болѣзнь. Понятно, стало-быть, что въ домашнемъ лечебникѣ, котораго главнѣе назначеніе состоитъ въ *предупрежденіи* важныхъ болѣзней, мы не можемъ дать удовлетворительнаго наставленія лечить разные виды водяной. Мы укажемъ только на свойства нѣкоторыхъ извѣстныхъ средствъ, могущихъ принести пользу при правильномъ назначеніи. — *Arsenic.* при страданіи печени и почекъ; при общемъ оводеніи крови, упадкѣ силъ и истощеніи; при зябкости и сѣромъ цвѣтѣ кожи; при удушающемъ стѣсненіи въ груди, палящей жаждѣ, краснотѣ и сухости языка, слабомъ жилогіеніи, изнурительной лихорадкѣ, тоскѣ по ночамъ; при водянкѣ вслѣдствіе перемежающейся лихорадки и отравленія хиной. — *China* при общемъ оводеніи крови, особенно послѣ потери соковъ; при страданіи печени, селезенки и матки; при томительномъ сухомъ кашлѣ съ одышкою и задержаніемъ мочи. — *Apis* при отечныхъ опухоляхъ; при грудной водянкѣ; при острой головной водянкѣ. — *Calcareea* при подкожной водянкѣ послѣ скарлатины у золотушныхъ. — *Mercurius* въ острыхъ случаяхъ послѣ простуды и сыпей; въ длительныхъ, когда временно наступаетъ воспалительное состояніе съ болью, опухолью, жаромъ, лихорадкой, обильнымъ потомъ и поносомъ; при водянкѣ шулять, матки и яич-

ника.—*Rhus* при грудной и подкожной водянкѣ послѣ скарлатины и другихъ сыпей.—*Sulphur.* въ длительныхъ случаяхъ, особенно въ брюшной водянкѣ и какъ вспомогательное средство для возбужденія реакціи.

Кромѣ того бываютъ показаны:

въ **головной** водянкѣ: *Arsen.*, *Bryon.*, *Helleborus.*, *Merc.*

— **грудной**, при изліяніи во всей полости груди: *Digit.*, *Squill.*; при страданіи сердца: *Arsen.*, *Digit.*, *Kali-carb.*, *Spigel.*; при отекахъ легкихъ: *Arsen.*, *Phosph.*, *Tart.-emet.*

— **брюшной**: *Arsen.*, *Helleb.*, также *Bryon.*, *Jod.*, *Lycor.*, *Sulph.*, рѣже *Chin.* и *Ferr.*

— **подкожной**: *Arsen.*, *Chin.*, *Ferr.*, *Helleb.*, *Sulph.*

Вспомогательныя средства вообще должны всегда сообразоваться съ главною болѣзнью, отъ которой водяная происходитъ. Видимыя причины, поддерживающія болѣзнь, резюмѣтся, прежде всего должны быть устранены, напримѣръ, у пьяницъ очень часто встрѣчаемые отеки только тогда могутъ исчезнуть, когда больной отстанетъ отъ водки. При общемъ ослабленіи питанія очень хорошее вспомогательное средство — молоко, парное или кипяченое, смотря потому, какое лучше выносить желудокъ. Сухая діета, то есть, воздержаніе отъ питья, нѣкоторыми хваляемое, при отдѣленіи мочи въ водяной обыкновенно недостаточномъ, не можетъ принести никакой пользы. Напротивъ,

слѣдуетъ заботиться объ увеличеніи количества мочи и испарины, усиленіи дѣятельности кожи и мочевого снаряда. Это всего лучше достигается съ одной стороны движеніемъ (если больной можетъ ходить), сухимъ треніемъ кожи суконкою, обвертываніемъ нагрѣтыми окуреными шерстяными одѣялами. Для окуриванія можно употребить можжевельныя ягоды. Съ другой стороны, для дѣйствія на мочу лучше и безопаснѣе всѣхъ лекарственныхъ мочегонныхъ обильное питье горячей воды, слабаго чаю или легкаго бѣлаго пива. Вода накапливается въ полостяхъ тѣла не оттого, что больной много воды выпиваетъ, а оттого, что вслѣдствіе болѣзни органовъ пасока отлагается отъ крови и жидкости тѣла поступаютъ не туда, куда надо, испаряются и выдѣляются неправильно.

18. СУДОРОГИ И КОНВУЛЬСІИ.

Нѣкоторые болѣзненныя состоянія нервной системы обнаруживаются непроизвольнымъ или неправильнымъ движеніемъ отдѣльныхъ мускуловъ и цѣлыхъ членовъ, въ видѣ подергиваній, конвульсій, сведеній, корчи или судорогъ. Эти явленія могутъ происходить вслѣдствіе весьма различныхъ болѣзней и отъ различныхъ причинъ, каковы чрезвычайная раздражительность нервной системы, выпотѣніе и воспаленіе въ мозгу, механическое сдавленіе или поврежденіе отдѣльныхъ

нервныхъ вѣтвей, недостаточное питаніе нервной массы испорченною или водянистою кровью и т. д. Поэтому какъ значеніе и опасность судорогъ сообразно обстоятельствамъ бываютъ различны, такъ и самое леченіе требуетъ различныхъ средствъ.

Дѣтскій возрастъ по причинѣ впечатлительности нервной системы особенно расположенъ къ судорогамъ отъ разныхъ причинъ, — отъ прорѣзыванія зубовъ, отъ глистовъ, расстройства пищеваренія, рвоты, испуга, страха и т. д.

Судороги у взрослыхъ (кромѣ падучей, виттовой пляски и столбняка), въ особенности у чувствительныхъ и истерическихъ женщинъ, большею частію неопасны и во время самыхъ припадковъ не требуютъ помощи. **Истерическія** судороги, напримѣръ, могутъ требовать только уменьшенія нервной раздражительности вообще. Въ очень сильныхъ припадкахъ, однакожъ, можно употребить *Hyosc.*, *Platin.* или *Stramon.*

Противъ судорогъ вслѣдствіе **испуга** и у взрослыхъ, можно съ успѣхомъ употребить *Opium*, а иногда и *Ignatia*.

Судороги при атрофіи мозга требуютъ *Phosph.*; при отека мозга *Arsen.*

Противъ расположенія къ судорогамъ въ ногахъ, въ икрахъ, иногда очень несноснымъ, особенно по ночамъ, очень успѣшно дѣйствуютъ *Sulphur* и *Veratrum*.

Къ противусудорожнымъ вообще принадлежать также: *Bell.*, *Cham.*, *Cocc.*, *Ignat.*, *Nux.-vom.*, *Stram.*, *Cupr.*, *Moschus*.

19. ЕПИЛЕПСІЯ, ПАДУЧАЯ БОЛѢЗНЬ.

Хотя леченіе этой болѣзни одно изъ труднѣйшихъ и требуетъ величайшаго вниманія и наблюдательности со стороны врача, чтобы открыть и устранить многообразныя причины и расположенія, изъ которыхъ она развивается, однакожь го-меопатія тѣмъ не менѣе имѣетъ средства противъ этихъ конвульсій.

Первое правило: во время самаго припадка не должно давать никакого лекарства и озаботиться только объ удобномъ положеніи больного, чтобы не упалъ или не ударился, и чтобы одежда не тѣснила никакой части тѣла. Лекарство дается тотчасъ по минованіи припадка, потому что леченіе имѣетъ цѣлю не сократить или умѣрить этотъ припадокъ, а уничтожить всю болѣзнь предупреденіемъ слѣдующаго.

Ignatia главное средство противъ недавней эпилепсiи, происшедшей отъ испуга или инаго сильнаго душевнаго волненія. Соотвѣтствуетъ въ особенности молодымъ, чувствительнымъ, раздражительнымъ, пугливымъ людямъ съ быстро измѣняющимися состояніями духа и переходами въ крайности, какъ въ веселіи, такъ и въ скорби.

Оно же прилично пожилымъ людямъ въ половомъ отношеніи неудовлетвореннымъ.

Opium—въ подобныхъ же случаяхъ какъ *Ign.*, особенно, когда припадки сопровождаются продолжительнымъ тяжелымъ усыпленіемъ и краснотой и вздутостью лица; медленнымъ, храплымъ дыханіемъ; медленнымъ, часто перемежающимся пульсомъ и подергиваніями въ лицѣ.

Belladonna также прекрасное средство противъ недавно приключившейся эпилепсіи и соотвѣтствуетъ въ особенности полнокровнымъ, расположеннымъ къ приливамъ въ голову; при безчувственномъ состояніи или внезапномъ вскакиваніи со сна съ крикомъ и страхомъ; при возобновленіи припадковъ отъ прикосновенія; при судоргахъ въ глоткѣ, закатываніи или неподвижности глазъ съ расширенными зрачками; при полномъ, твердомъ и скоромъ пульсѣ.

Cuprum — когда подергиванія начинаются съ пальцевъ на рукахъ и ногахъ, большіе персты скорчиваются; когда есть слюнотеченіе, обильное отдѣленіе мочи и періодическое возвращеніе припадковъ черезъ мѣсяць.

Lachesis — когда припадкамъ предшествуетъ безгласіе, головокруженіе, холодніе ногъ, біеніе сердца, отрыжка и пученье отъ вѣтровъ, а за припадкомъ слѣдуетъ накопленіе слюны во рту и въ горлѣ, частый позывъ на мочу или непроизвольное отдѣленіе ея и глубокій сонъ.

Противъ хронической эпилепсіи хорошія сред-

ства: *Sulphur* и *Calcarea*. — *Sulphur* когда припадку предшествуетъ ощущеніе, какъ-будто мышъ пробѣгаетъ внутри по мускуламъ, снизу вверхъ. *Calcarea* (также какъ и *Op.*) въ особенности, когда припадки являются преимущественно ночью.

Кромѣ того рекомендуются еще: *Agaric.*, *Artemisia*, *Camph.*, *Coccul.*, *Hyosc.*, *Plumb.*, *Stramon.*, а въ послѣднее время, говорятъ, съ успѣхомъ употребляли *Bufo*.

У дѣтей эпилептическіе припадки часто бываютъ слѣдствіемъ глистовъ, противъ которыхъ тогда и слѣдуетъ дѣйствовать.

20. ВИТТОВА ПЛЯСКА.

Эта форма конвульсій требуетъ точно такого же изслѣдованія, какъ и эпилепсія, и также можетъ требовать очень различныхъ лекарствъ. Здѣсь мы приведемъ только соотвѣтствующія самымъ обыкновеннымъ случаямъ и наиболѣе испытанныя.

Ignatia соотвѣтствуетъ виттовой пляскѣ при всѣхъ тѣхъ же обстоятельствахъ, какъ и въ эпилепсіи, въ особенности легкимъ степенямъ этой болѣзни и когда она обнаруживается постояннымъ общимъ безпокойствомъ мускуловъ; при появленіи припадковъ послѣ обѣда и успокоеніи въ лежачемъ положеніи на спинѣ; при шаткой

походкѣ, спотыканіи и паденіи, когда хоть самыя мелкія вещи попадутся подъ ноги.

Stramonium весьма важное средство противъ совершенно развившейся виттовой пляски, когда судорожныя движенія очень сильны, и когда являются перекрестно, — въ лѣвой рукѣ и правой ногѣ, и на оборотъ, — или круговыя движенія руками, движеніе какъ при сученіи нитокъ, быстрое движеніе головы или бѣганье и скачки; когда этими припадками иногда перемежаются судороги въ туловищѣ, перегибаніе спины или столбнякъ, или судороги въ глоткѣ и невозможность пить воду; когда послѣ такихъ припадковъ наступаетъ спокойное состояніе съ чрезвычайнымъ изнеможеніемъ или съ бредомъ, или пѣніемъ, смѣхомъ, плачемъ и т. д.

Hyoscyamus соотвѣтствуетъ подобнымъ же случаямъ, въ особенности когда больной выворачиваетъ всѣ члены и мечется, какъ-будто нарочно непристойно кобянится, и когда даже въ промежуткахъ между припадками проявляется торопливость, суетливость, болтливость или тупоуміе и глупость.

Рекомендуютъ также: *Agaric.*, *Calc.*, *Coccul.*, *Cupr.*, *Nux.-v.*, *Sec.-corn.*, *Stram.* и *Zinc.*

21. СТОЛБНЯКЪ И КОРЧА ЧЕЛЮСТЕЙ.

Столбнякъ (tetanus) всегда бываетъ припадкомъ или слѣдствіемъ другой болѣзни, большею частію слѣдствіемъ раны или отравленія. Кромѣ того, что можетъ соотвѣтствовать самой болѣзни и ея причинѣ, противъ столбняка оказываются полезными: *Angustura*, *Arnic.*, *Belladonna*, *Camphora*, *Cicuta-vir.*, *Ipecacuanha*, *Moschus*, *Nux.-v.*, *Opium*, *Platina*, *Secale-cornutum* и *Stramonium*.

То же самое должно сказать и о судорожной корчѣ въ челюстяхъ (*trismus*). Средства, большею частію соотвѣтствующія: *Bell.*, *Camph.*, *Hyosc.*, *Ignat.* и *Veratr.*

22. ОБМОРОКЪ.

Обмороки, особенно у чувствительныхъ и слабыхъ женщинъ, большею частью не имѣютъ никакого опаснаго значенія. Нужно только ослабить стѣсняющую одежду и дать удобное, спокойное положеніе. Если обморокъ очень глубоокъ и продолжителенъ, то брызнуть въ лицо водою мелкими брызгами, тереть ладони и подошвы щеткою и давать нюхать одеколонъ или камфоровый спиртъ. Слишкомъ большія количества сильно пахнущихъ веществъ, каковы: нашатырный

спиртъ, оленорожный спиртъ и т. д., совершенно излишни и часто даже вредны.

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ обмороки могутъ потребовать однакожъ и леченія, особенно когда расположеніе къ нимъ очень сильно или когда послѣ каждого обморока остаются страданія.

Когда обморокъ причинемъ испугомъ или страхомъ, можно употребить: *Coffea* или *Opium*.

При чрезвычайной слабости вслѣдствіе кровотеченій, нагноенія, кормленія грудью, поноса и изнурительныхъ болѣзней—*China*.

Истерическимъ или страждущимъ блѣдною немощью дѣвушкамъ—*Pulsat.* и *Ferr*.

Противъ обморока вслѣдствіе жестокой боли—*Acon.* и *Veratr*.

Противъ обморока вслѣдствіе отвращенія при видѣ крови, ранъ и т. п.—*Ipec*.

Когда расположеніе къ обморокамъ зависитъ отъ органическихъ страданій сердца или легкихъ, то во многихъ случаяхъ полезно дѣйствуетъ *Bell*.

Въ глубокихъ обморокахъ можно давать нюхать эти средства, если трудно ввести въ ротъ.

Если послѣ обморока обнаруживается рвота, то ея ничѣмъ не должно останавливать. Точно также и сонъ послѣ обморока благодѣтеленъ и всего лучше подкрѣпляетъ.

23. БЕЗСОННИЦА, СТРАДАНИЯ ВО ВРЕМЯ СНА.

Безсонница и беспокойный сонъ суть почти всегда слѣдствія другихъ болѣзненныхъ состояній, которыя должно дознать. Даже въ тѣхъ рѣдкихъ случаяхъ, когда безсонница составляетъ единственное видимое проявленіе нездоровья, можно почти всегда отыскать ея причину въ привычкахъ или образѣ жизни страждущаго. Самыя обыкновенныя причины: неумѣренное умственное занятіе, долгое сидѣнье по ночамъ, употребленіе кофе или чая, поздніе ужины, обремененіе желудка, нравственныя волненія, страсти и т. д. Первое условіе поправленія состоянія — устраненіе этихъ причинъ, потомъ соотвѣтствующее движеніе и, главное, учрежденіе правила и извѣстныхъ часовъ, когда ложиться спать, потому что въ этомъ случаѣ правильная привычка можетъ быть самымъ лучшимъ лекарствомъ. Сверхъ того могутъ, однакожь, быть употреблены и лекарства.

Если безсонница происходитъ вслѣдствіе частыхъ **нравственныхъ волненій**, то всего полезнѣе за часъ передъ уложеніемъ въ постель принять *Aconit.* или *Opium.*

Когда уже развилось общее и постоянное нервное **раздраженіе**, то еще лучше дѣйствуетъ *Coffea.*

Когда безсонница происходитъ отъ скорби,

горя, заботы и тревожныхъ мыслей —
Ignat.

Когда она происходитъ отъ умственныхъ
нзпращеній — *N.-vom.*

Противъ безсонницы у стариковъ лучше
всего дѣйствуютъ *Opium* и *Conium*, а у дѣтей
Acon. и *Coffea* или *Cham.* и *Jalapra*, когда без-
покойство происходитъ отъ пученья живота и
разстройства пищеваренія.

Противъ безсонницы, вслѣдствіе обремененія
желудка или поздняго ужина, хорошо дѣй-
ствуетъ *Pulsat.*; также *Ars.*, если притомъ есть
тоска, біеніе сердца и внутренній жаръ, какъ-
будто кипятко въ жилахъ.

При большой сонливости и невозможности за-
снуть, вздрагиваніи въ минуту засыпанія, страш-
ныхъ видѣнійхъ, стопахъ, метанія и сухомъ жа-
рѣ показана *Bell.*

При неодолимой сонливости днемъ, послѣ обѣ-
да и подъ вечеръ и безсонницѣ по ночамъ съ
безпокойствомъ, стрекотаніемъ въ тѣлѣ и невоз-
можностью заснуть иначе какъ лежа на спинѣ и,
полусидя — *Sulphur.*

При слишкомъ глубокою тяжеломъ снѣ
съ одурѣніемъ при пробужденіи: *Bell.*, *Op.*, *Strat-*
mon., *Tart.-emet.*

При слишкомъ чуткомъ: *Cham.*, *Lachesis*,
Ranunculus sceleratus.

— пугливомъ: *Acon.*, *Arsen.*, *Bell.*, *Phosph.*,
Rhus.

- При **безпокойномъ** съ метаніемъ: *Ars., Bell., Cham., Chin., Phosph., Rhus.*
- **неподерѣпляющемъ**: *Alum., Chin., Lyc., Phos., Sulph., Zinc.*
- **прерывистомъ**: *Ars., Bell., Dig., Lach., Merc., N.-vom., Puls.*
- **обильныхъ грезахъ**: *Bell., Bry., Chin., N.-vom., Phos., Puls., Sulph.*
- **вздрагиваніи** и **испугѣ** во снѣ: *Bell., Bry., Cupr., Hyosc., Ipec., Op., Puls., Sulph.*
- **говорѣ** и **крикахъ** во снѣ: *Arsen., Bell., Cham., Jalappa, Ign., N.-vom., Puls., Zinc.*
- **подергиваніи** въ **лицѣ** и **закатываніи** глазъ во снѣ: *Bell., Cham., Cocc., Hyosc., Ipec., Ignat., Veratr.*
- **кошмарѣ**: (что въ деревняхъ называютъ „домовой давить“): *Acon., Nitr., N.-vom., Op., Puls., Sep., Sulph.*
- **судорогахъ** въ **икрахъ**: *Cupr., Sec.-corn., Sulph., Veratr.*
- **скрежетаніи** зубами: *Arsen., Bell., Cina, Helleb.*
- **храпѣ**: *China, Ignat., N.-vom., Op., Stram.*
- **хожденіи** во снѣ или **лунатизмѣ**: *Bry., Op., Phos., Sil.*
- **зарываніи** головою въ подушку: *Bell., Helleb.*

Иногда, въ особенности у дѣтей, оказывается также непомѣрная сонливость, родъ **спячеи**, противъ которой, смотря по обстоятельствамъ,

можно употребить *Bell.*, *Lach.*, *Op.*, *Tart.-emet.*, *Hyosc.* Такое состояніе можетъ происходить также въслѣдствіе трудныхъ болѣзней, каковы нервная горячка, воспаленіе мозга и т. д. Оно можетъ также и безъ всякой видимой болѣзни продолжаться долго и упорно и тогда зависеть отъ скрытыхъ, большею частію опасныхъ причинъ, которыя требуютъ тщательнаго изслѣдованія.

ГЛАВА III.

§ XIV.

ДУШЕВНЫЯ БОЛѢЗНИ.

Хотя эти состоянія, въ полномъ своемъ развитіи, не могутъ подлежать пользованію по домашнему лечебнику, однакожь мы считаемъ нужнымъ дать здѣсь нѣсколько указаній, потому что они могутъ являться временно и въ сопровожденіи другихъ, физическихъ страданій, которыя ими могутъ быть особенно характеризованы, а въ особенности потому, что своевременное употребленіе соотвѣствующихъ средствъ можетъ предупредить важныя разстройства и уничтожить душевную болѣзнь въ самомъ началѣ.

Всякая душевная болѣзнь сопровождается и разстройствомъ физическимъ, иногда-же просто коренится въ матеріальной болѣзни какого-нибудь органа, чаще всего печени и селезенки; иногда

порчѣ соковъ, малокровіи мозга и т. д. Часто повторяющіяся, продолжительныя или чрезвычайно сильныя нравственныя потрясенія, въ свою очередь, кромѣ измѣненій въ нравственной сферѣ, обыкновенно влекутъ за собою физическія болзни. Досада, напримѣръ, можетъ причинить разлитіе желчи; испугъ можетъ остановить пищевареніе; сильное огорченіе нерѣдко даетъ ударъ и т. д. Поэтому весьма важно знать средства, которыми подобныя послѣдствія могутъ быть предотвращены.

Послѣдствіямъ **испуга** соотвѣтствуютъ въ особенности: *Acon.* и *Op.* Раздраженію отъ **досады**, **негодованія** и **гнѣва**: *Cham.*, *Coloc.*, *Nux-vom.*, *Staph.* Тихому горю; *Ignat.*, *Phos.-ac.*, *Staph.*: **оторченію** съ чувствомъ униженія: *Bellad.*, *Coloc.*, *Ignat.*, *Plat.*, *Staph.*, или *Arsen.*, *Cham.*, *Phos.-ac.* Излишнему волненію отъ **радо-сти**: *Acon.*, *Coff.*, *Op.*, *Puls*; **тоска**: *Ars.*, *Aur.*, *Caps.*, *Merc.*, *Phos.-ac.*, *Staph.*

Болѣе или менѣе постояннымъ болѣзненнымъ душевнымъ состояніямъ, безъ видимыхъ причинъ, соотвѣтствуютъ:

Въ **угнетенномъ** состояніи или **меланхо-ліи**: съ чрезвычайною тоской и отчаяніемъ *Arsen.* и *Laches.*; съ глубокимъ горемъ и равнодушіемъ *Ignat.*; съ плаксивостью *Pulsat.*; съ равнодушіемъ къ окружающему, религіознымъ настроеніемъ и отчаяніемъ *Sulph.*; съ тоскою и безпокойствомъ *Nux-vom.*; со страхомъ и отчаяніемъ, пугливостью,

отсутствіемъ сознанія, нѣніемъ, свистаньемъ и безстыдными рѣчами *Veratr.*

Въ состояніи **возбужденія**, экзальтаціи, при **бѣшенствѣ** и **видѣніяхъ**, съ крикомъ, заговариваньемъ и судорогами *Bellad.*, съ половымъ возбужденіемъ *Canth.*, *Plat.*; съ буйствомъ, бессонницей, бредомъ, видѣніями, судорогами, дрожаніемъ *Hyosc.*; со спячкой въ перемежку съ бессонницей, нугающими видѣніями, одною неотступною мыслью *Opium*; съ видѣніями, болтливостью, конвульсіями, подергиваніями, глупыми выходками, смѣхомъ, нѣніемъ *Stramon.*

Въ состояніяхъ **умопомешательства** бываютъ пригодны: *Phos.-ac.*, *Stram.*, *Sulph.*, *Hyosc.*, *Opium*, *Phosph.*, *Veratr.* При религіозной маніи въ особенности *Arsen.*, *Aur.*, *Bellad.*, *Pulsat.*, *Selen.*, *Sulph.*, *Veratr.* При половомъ возбужденіи и нимфоманіи *Phosph.*, *Phosph.-ac.*, *Plat.*, *Sulph.*

При **слабости памяти** бываютъ пригодны: *Anacard.*, *Helleb.*, *Nux-mosch.*, *Oleand.*, *Phos.-ac.*, *Rhus.*

Во всякомъ случаѣ нужно обратить вниманіе, какъ на ближайшія причины, такъ и на физическое состояніе.

ГЛАВА IV.

§ XV.

БОЛѢЗНИ БЕРЕМЕННЫХЪ И РОЖЕНИЦЪ.

Здѣсь не мѣсто излагать обстоятельное руководство для содержанія беременных и леченія всѣхъ болѣзней, какими могутъ сопровождаться роды и ихъ послѣдствія. Мы предлагаемъ только указаніе средствъ противъ самыхъ обыкновенныхъ страданій, встрѣчающихся въ этихъ состояніяхъ женщины. А прежде всего всякая беременная должна убѣдиться, что никакая беременность, при самыхъ благопріятныхъ обстоятельствахъ, не можетъ миновать разныхъ неудобствъ и частію страданій, которыя совершенно естественны и составляютъ принадлежность этого состоянія, а не собственно болѣзни и, слѣдовательно, не всегда требуютъ леченья*). Противъ этихъ неудобствъ и нѣкоторыхъ неизбѣжныхъ лишеній самое лучшее средство терпѣніе, а многихъ страданій можно избѣгнуть разумнымъ, заботливымъ діететическимъ содержаніемъ въ отношеніи къ пище, одеждѣ, сну и движенію.

*) Все это, разумѣется, не исключаетъ леченія хронической болѣзни во время беременности. Напротивъ, въ это время разумнымъ леченіемъ можно исправить много и вмѣстѣ съ тѣмъ устранить или по крайней мѣрѣ ограничить наследственную передачу.

Самое обыкновенное страданіе въ первое время беременности **тошнота** и **рвота**. Когда при этомъ есть и иное разстройство пищеваренія, отсутствіе аппетита, изжога, судороги въ желудкѣ и т. д., то наиболѣе приличны бываютъ *Ipecac.* и *N-vom.* Послѣднее въ особенности тогда, когда страданія являются рано утромъ, на тощакъ, и соединяются съ запоромъ. Но иногда рвота является безъ всякихъ сопровождающихся страданій и при самомъ исправномъ аппетитѣ. Въ такомъ случаѣ соотвѣтствуетъ *Kreosot.*

Противъ **запора** кромѣ *Bry* и *N-vom.*, хорошее средство въ этомъ состояніи *Sep.*, однакожъ нужно сверхъ того предупреждать запоры соотвѣствующимъ діететическимъ содержаніемъ. Такъ, беременная, при расположеніи къ запорамъ, должна вообще избѣгать пучащей и трудноваримой пищи и большихъ количествъ. Мясная пища, скорѣе насыщая, меньше растительной отлагаетъ въ кишкахъ твердыхъ остатковъ, подлежащихъ изверженію, слѣдовательно мясная пища во всякомъ случаѣ меньше растительной затрудняетъ испражненіе. Наконецъ, беременная въ особенности должна постановить себѣ за правило всегда хорошенько пережевать пищу, не глотать слишкомъ поспѣшно и лучше ѣсть чаще, чѣмъ много за-разъ.

Отъ **поноса** у беременныхъ чаще всего помогаютъ: *Phos.-ac.* и *Veratr.*

Отъ **колики** и **рѣзи** въ животѣ: *Puls.* и *Coloc.*

Отъ **затрудненнаго мочеиспусканія**,

отъ задержанія и слишкомъ частыхъ позывовъ: *Conium* и *Pulsat.* Когда задержаніе доходитъ до весьма тревожной степени: *Cantharis.* Сверхъ того въ послѣднемъ случаѣ можно, какъ палъятивное средство употребить теплую припарку изъ льнянаго сѣмени, накладываемую на мѣсто мочевого пузыря.

Отъ **зубной боли** во время беременности чаще всего помогаютъ: *Bellad., Cham., Puls., Sep., Calc.*

Отъ **головной боли, головокруженія и прилива** въ голову: *Bell., N.-vom.*

Отъ желтыхъ и коричневыхъ **пятенъ** на лицѣ: *Sep.*

Противъ **растяженія и напряженія жилъ** на голеняхъ, когда оно очень значительно и причиняетъ общую опухоль, можно употребить *Lycop., Puls., Sulph.* или *Ars., Arn., Hamamelis, Silic., Thuja.,* а снаружи плотное (однакожь, разумѣется, не слишкомъ крѣпкое) бинтованіе. При томъ беременная съ такимъ расположеніемъ должна какъ можно меньше стоять и сидѣть и не сидѣть такъ, чтобы ноги висѣли.

Противъ случающихся иногда **прихотей** и ненатуральныхъ желаній, если они относятся къ вещамъ очевидно вреднымъ или представляютъ явное болѣзненное **извращеніе вкуса**, сверхъ разумнаго сопротивленія воли можно употребить *Platina.*

Кровотеченіе у беременной всегда недобрый знакъ, потому что или предшествуетъ, или сопровождаетъ **преждевременные роды** и вы-

КИДЪ. Если у беременной вслѣдствіе, паденія, ушиба или потрясенія является кровотеченіе или хотя только потугамъ подобная боль внизу живота, то тотчасъ же должно давать *Arnica*. въ частыхъ пріемахъ, предписавъ горизонтальное положеніе и удаленіе всего, что могло бы причинить какое-нибудь физическое или нравственное безпокойство. Если же причиною кровотеченія былъ испугъ, гнѣвъ или иное душевное волненіе, то можно употребить *Acon.* или *Coff.* Если этихъ средствъ недостаточно, кровь идетъ сильно, сопровождается рѣзью около пупка, давленіемъ внизъ или толчками и судорогами во всемъ тѣлѣ, то давать *Ires.*, или, если рѣзь является периодически, приступами, съ побужденіемъ на низъ и на мочу, съ ознобомъ и безпокойствомъ—*Chamomilla*.

Когда окажутся настоящія потуги съ весьма значительною потерей крови большими сгустками, съ позывами на низъ, поносомъ, тошнотою или рвотой, то прилична *Sabina*, которая и въ этомъ случаѣ еще можетъ остановить и предупредить выкиды. Это средство также и послѣ выкида, если не успѣли предупредить его, очень полезно противъ продолжающагося кровотеченія и разслабленія.

Когда кровотеченіе послѣ выкида очень сильно, кровь черна, вязка, со сгустками, больная очень слаба и имѣетъ желтоватый или сѣроватый цвѣтъ лица, то приличенъ *Crocus*.

Въ самыхъ опасныхъ случаяхъ, угрожающихъ

совершеннымъ истеченіемъ, съ обмороками, дурнотой, головокруженіемъ, блѣдностью и холодѣніемъ лица и конечностей, часто еще помогаетъ *China*.

Противъ **расположенія къ выкиду**, которое у слабыхъ и нервныхъ, раздражительныхъ женщинъ въ первыхъ мѣсяцахъ беременности встрѣчается очень часто и вовсе не зависитъ отъ однихъ механическихъ причинъ, лучшія средства *Serpi* и *Platina*, Такъ какъ выкидъ во второй разъ случается обыкновенно около того же самого времени и расположеніе къ выкиду тѣмъ болѣе усиливается, чѣмъ чаще повторяется, то сверхъ леченія тотчасъ послѣ выкида, за нѣсколько недѣль до ожидаемаго новаго, нужно давать эти средства черезъ каждые два, три дня по приему, а именно: *Serpi* въ особенности тогда, когда можно предположить значительное полнокровіе, завалы въ брюшныхъ органахъ и страданія печени, *Platina* при чрезвычайной нервной раздражительности, слабости и истерическомъ расположеніи. Изъ такого расположенія къ кровотеченію и выкиду уже само собою слѣдуетъ, что беременная съ перваго же мѣсяца должна совершенно избѣгать всякаго сильнаго движенія или потрясенія, въ особенности же танцевъ и зашнуровыванья. Послѣднее и въ такомъ случаѣ, если не причинить выкида, остается не безъ вреднаго вліянія на развитіе плода и на исходъ родовъ.

Во время родовъ чаще всего врачебной помощи требуютъ **потуги**. Хотя боль составляетъ

существенную принадлежность потугъ и не можетъ быть названа болѣзнию, однакожь эта боль бываетъ иногда такъ велика, или роженица бываетъ такъ раздражительна, чувствительна, что для предупрежденія лихорадки, конвульсій или тому подобныхъ явленій, полезно бываетъ употребить успокоивающія средства. Большой части подобныхъ случаевъ соотвѣтствуетъ *Coff.*, или *Aconit.*, когда кровеносная система очень раздражена, есть приливъ въ голову и бѣненіе сердца.

Когда роды не подвигаются по **недостаточности потугъ**, то главное средство *Pulsatilla*. Когда потуги сильны, болѣзненны, но по причинѣ слишкомъ большихъ перемежекъ не приводятъ къ должному результату, то хорошо дѣйствуетъ *Bell*. Когда потуги по причинѣ чрезвычайной слабости или недѣятельности матки совершенно прекращаются, причемъ обыкновенно угрожаетъ значительное кровотеченіе, то давать *Secale-cornut.* Каждые полчаса или каждые четверть часа по приему. Если же при отсутствіи потугъ окажется обморокъ, дрожаніе, безчувственность или судороги—дать *Opium*.

Когда **послѣ родовъ кровотеченіе** не прекращается по причинѣ вялости и недѣятельности матки, неспособной къ достаточному сокращенію, то опять соотвѣтствуетъ *Fuls.* или, когда кровотеченіе очень сильно—*Sabina*.

Прочія неправильности родовъ, въ особенности зависящія отъ неправильнаго положенія ребенка

или неблагопріятнаго сложенія таза и требующія хирургической помощи акушера, здѣсь не могутъ быть разсматриваемы. Затѣмъ только касательно **послѣда**, что слишкомъ поспѣшное насильственное извлеченіе его крайне вредно, причиняетъ сильныя послѣродовыя боли, опущеніе и выворотъ матки, воспаленіе и т. д. Противъ замедленія отхода послѣда, если нѣтъ никакихъ особенно угрожающихъ признаковъ, требующихъ извлеченія руками, во всякомъ случаѣ можно сперва употребить *Putsat.* или *Sec-corn.*

Въ послѣродовомъ состояніи, т. е. со времени родовъ и до окончанія очищенія прежде всего должно заботиться о тѣлесномъ и душевномъ спокойствіи. Дѣятельность кожи, испарина, въ это время бываетъ усилена и требуетъ тщательнаго охраненія отъ простуды, однакожъ не должна быть еще болѣе усиливаема слишкомъ теплымъ укутываньемъ и непомѣрнымъ употребленіемъ чая и т. п.

Запоръ тотчасъ послѣ родовъ есть состояніе правильное и можетъ продолжаться нѣсколько дней безъ всякаго вреднаго вліянія, если же сдѣлается обременительнымъ, то можно употребить *Bry.* или *N-vom.*

Противъ **поноса** или расположенія къ нему въ этомъ состояніи самое лучшее средство *Phos-acid.*

Когда слѣдствіе родовъ или потребовавшейся хирургической помощи половыя части значительно **растянуты** или **помяты**, то можно употребить

обмываніе по нѣскольку разъ въ день разжиженною тинктурою *Arn.* (1 часть тинктуры на 8 частей воды).

Противъ **послеродовыхъ болей** также главное средство *Arn.* (внутрь), особенно послѣ трудныхъ родовъ или механическаго удаленія послѣда, при терзающихъ, ноющихъ или ломящихъ боляхъ въ поясницѣ и бедрахъ, по внутреннимъ сторонамъ ляжекъ и до перстовъ, съ постояннымъ безпокойствомъ въ ногахъ и ощущеніемъ какъ-будто мясо отдѣляется отъ костей. Противъ послеродовыхъ болей, послѣ очень легкаго и скорого разрѣшенія и при замедленномъ сокращеніи матки соотвѣтствующія средства: *Puls.* и *Secale corn.*

Молочная лихорадка есть правильное реактивное слѣдствіе пробужденія грудныхъ железъ къ новой должности, отдѣленію молока, и обыкновенно не требуетъ леченія. Если же лихорадочныя явленія, ознобъ и жаръ очень сильны, то нѣсколько приемовъ *Bell.* скоро умѣряютъ и успокаиваютъ ихъ. Но лихорадка у роженицъ чаще бываетъ слѣдствіемъ вынесенныхъ страданій, страха, безпокойства и поврежденія частей. Въ такомъ случаѣ самыя лучшія средства сперва *Acon.*, а потомъ *Arn.*

Когда **отдѣленіе молока** замедляется или оказывается недостаточнымъ и замедленія этого нельзя приписать ни общей слабости сложенія, ни порочному образованію груди и сосковъ, то кромѣ соотвѣтствующей питательной пищи ис-

правленію отдѣленія содѣйствуютъ *Agnus castus* и *Pulsatilla*. Когда молоко послѣ правильнаго отдѣленія вдругъ **скроется**, то также ближе всего прилична *Puls.* Когда же молоко скроется вслѣдствіе душевнаго волненія, то лучше дѣйствуетъ *Bryonia*.

Противъ **течи молока** не во-время, что бываетъ болѣе слѣдствіемъ слабости молочныхъ протоковъ, чѣмъ слѣдствіемъ обилія молока, лучшее средство *Calcarea*.

Когда по **отнятіи** ребенка отъ груди обнаруживается страданіе груди, опухоль, краснота, отвердѣніе и боль, то главныя средства *Bell.* и *Bry.* При этомъ необходимо на нѣсколько дней воздержаніе отъ слишкомъ питательной пищи и сохраненіе груди въ теплѣ. О болѣзни сосковъ и восналеніи груди выше уже говорено.

Когда **молоко дурнаго качества**, слишкомъ жидкое или скоро свертывается, то *Borax* иногда можетъ исправить его,—если нѣтъ глубокихъ разстройствъ организма, вообще препятствующихъ кормленію.

Въ послѣродовомъ состояніи, нерѣдко вслѣдствіе нервной раздражительности, случается **бессонница** или по-крайней-мѣрѣ тревожный, страшными сновидѣніями наполненный сонъ. Въ первомъ случаѣ помогаетъ *Coffea*, въ послѣднемъ *Bell.* Когда это возбужденіе такъ усиливается, что сопровождается слезами, отчаяніемъ и страхомъ смерти, то хорошо дѣйствуетъ *Platina* и *Sepia*.

Когда обнаруживаются несоразмѣрное **утомление** и **слабость** тѣла послѣ родовъ или во время кормленія, то соотвѣтствуютъ *China* и *Calcareä*.

Противъ **судорогъ** и **конвульсій** прежде всего можно давать *Bell.*, а затѣмъ, глядя по обстоятельствамъ, обратиться къ инымъ противусудорожнымъ средствамъ, которыхъ примѣненіе въ такихъ опасныхъ случаяхъ не можетъ быть здѣсь предусмотрѣно и представляется искусству врача. (См. судороги и конвульсії.)

Противъ **бѣлой опухоли**, болѣзни очень упорной и опасной, самымъ дѣйствительнымъ средствомъ до-сихъ-поръ оказался *Arsenicum*, котораго одного однакожь не можетъ быть достаточно, особенно если въ то же время есть воспаление матки или другіе разрушительные процессы.

Родильную лихорадку слѣдуетъ отличать отъ такъ называемой молочной, потому что она представляетъ существенную и довольно опасную болѣзнь, отъ которой многія роженицы умираютъ. Она обнаруживается рѣдко раньше третьяго и позже десятаго дня по разрѣшеніи; бываетъ причинена простудой, скрытіемъ молока или послѣродоваго очищенія, разстройствомъ желудка и душевными волненіями, но можетъ произойти и безъ видимыхъ внѣшнихъ поводовъ, вслѣдствіе болѣзненнаго состоянія соковъ. Первые припадки — лихорадочныя явленія, боль и чувствительность

нижней части живота къ прикосновенію съ расположеніемъ къ поносу и разстройствомъ или совершеннымъ задержаніемъ послѣродоваго очищенія и молока. Важнѣйшія средства, въ началѣ часто уничтожающія всю болѣзнь: *Acon.* и *Bell.* *Aconit.* показанъ, когда есть дрожь или сильный ознобъ и вслѣдъ затѣмъ жаръ, тяжесть въ головѣ, чувствительность живота, жажда и сухость кожи. Когда боль въ животѣ ожесточается, ограничивается опредѣленнымъ мѣстомъ, которое не выноситъ прикосновенія, очищеніе и молоко скрываются,—признаки **воспаленія матки**,—то послѣ нѣсколькихъ приѣмовъ *Acon.* дать *Bell.* То и другое средство втораго или третьяго разведенія дается черезъ часъ по приему. Когда первая буря подавлена и опасность воспаленія уничтожена, то лучшее средство для возобновленія отдѣленія молока и очищенія—*Puls.*

Противъ **выпаденія волосъ** послѣ родовъ лучшія средства *Calcarea* и *China*. Последнее можно употреблять и наружно, въ помадѣ.

§ XVI.

ДѢТСКІЯ БОЛѢЗНИ.

Болѣзни, поражающія новорожденныхъ и дѣтей перваго возраста, бываютъ частію такія, которыя у взрослыхъ рѣдко или и вовсе не встрѣчаются, стало-быть особенно свойственные дѣтямъ,

частію же такія, которыя у дѣтей, сравнительно со взрослыми, значительно видоизмѣняются. Вообще не слѣдуетъ упускать изъ виду, что болѣзни у дѣтей очень часто проявляются совершенно иначе, нежели у взрослыхъ, и что нѣкоторыя явленія, у тѣхъ нормальныя, у этихъ принадлежатъ къ ненормальнымъ, и наоборотъ. Поэтому для распознаванія извѣстныхъ болѣзненныхъ состояній весьма важно умѣнье правильно оцѣнить болѣзненные явленія.

У грудныхъ дѣтей и до пяти-лѣтняго возраста, а иногда и далѣе, **крикъ** составляетъ первый и почти единственный признакъ начинающейся болѣзни; онъ замѣняетъ всѣ болѣе отчетливыя жалобы позднѣйшихъ возрастовъ и, слѣдовательно долженъ побуждать насъ къ изслѣдованію причинъ его. Самый родъ крика у грудныхъ дѣтей нерѣдко бываетъ очень характерный и указываетъ на мѣсто страданія. Такъ *глухой*, какъ-бы задущенный крикъ, при которомъ только по временамъ выдаются отдѣльные рѣзкіе *взвизгиванья*, указываетъ на воспаленіе легкихъ и вѣтвей дыхательнаго горла; также вообще неполный крикъ съ рѣзкими нотами только во время *вдыханія*, всегда доказываетъ болѣзненное состояніе гортани. *Хриплый* крикъ указываетъ на катарральное состояніе; *громкій, звонкій*—на страданіе живота. Слѣдуетъ замѣчать притомъ, постоянный ли крикъ или прерывистый; произволенъ ли вызывается только прикосновеніемъ и движеніемъ.

Напр., дитя, страдающее болью въ ухѣ или во рту, можетъ кричать въ продолженіи нѣсколькихъ часовъ къ ряду; при болѣзни груди оно только по временамъ издаетъ короткій, сжатый вопль съ выраженіемъ страха; при боли головы оно вскрикиваетъ также только по временамъ, но очень пронзительно и звонко; при боли въ животѣ громкій крикъ бываетъ продолжительно постоянный, съ широко открытымъ ртомъ, какъ-бы для того, чтобы придать звуку, какъ можно больше полноты. При боли въ большихъ суставахъ дитя вскрикиваетъ только тогда, когда этотъ суставъ случайно или съ умысломъ тронуть или пошевеливать.

При крикѣ у очень маленькихъ дѣтей рѣдко замѣтны слезы. Отдѣленіе слезъ въ слезныхъ железахъ начинается не ранѣе 3 или 4 мѣсяца и потомъ, во время трудныхъ болѣзней обыкновенно останавливается. Точно также отдѣленіе слюны начинается со 2 или 3 мѣсяца; около 5 и 6, во время прорѣзанія зубовъ, бываетъ самое сильное и потомъ, около году, опять исчезаетъ. Видимая *испарина* у самыхъ маленькихъ также встрѣчается лишь рѣдко, какъ исключеніе; позже дѣти потѣютъ больше головою и во время сна.

Кишечныя испражненія должны представлять свѣтло-желтую, равномѣрно смѣшанную кашицеобразную массу, отходящую ежедневную отъ 2 до 3 разъ. Только въ первые дни цвѣтъ бываетъ необходимо черноватый отъ примѣси меконія, или во время утробной жизни накопленныхъ въ кишкѣ

слизей. Дѣтское испражненіе, оставленное на нѣкоторое время на воздухѣ, пахнетъ кисло и нерѣдко зеленѣетъ. Тотчасъ по испражненіи здоровое не должно ни кисло пахнуть, ни имѣть зеленого цвѣта. У дѣтей постарше, принимающихъ уже нѣкоторую часть твердой пищи, испражненія принимаютъ буроватый и бурый цвѣтъ, становятся гуще, но не должны быть совершенно плотны и тверды, и число испражнений ограничивается уже 1 или 2.

Отдѣленіе мочи у грудныхъ дѣтей сравнительно очень обильно, отъ жидкой пищи. Въ первые мѣсяцы ребенокъ мочится отъ 12 до 24 разъ въ сутки. Моча только на 5-мъ мѣсяцѣ принимаетъ характерный мочевой запахъ, а до того бываетъ довольно безцвѣтная и безъ запаху.

Объективныя явленія *лихорадочнаго* состоянія, правда, такъ же какъ и у взрослыхъ состоятъ въ возвышенной температурѣ кожи, въ ускореніи біеній пульса и движенія дыханія, однакожъ въ особенности у грудныхъ дѣтей обнаруживаются нѣсколько иначе.

Возвышенному *жару* въ тѣлѣ у грудныхъ дѣтей очень рѣдко предшествуетъ холодъ. Мѣсто холода иногда заступаетъ блѣдность лица и губъ, синева около губъ и ногтей и ослабленіе мускуловъ. Нормальная теплота тѣла въ дѣтскомъ возрастѣ составляетъ отъ 1-го до 7-го дня 30° (по стоградусному), отъ 4-го мѣсяца до 14 лѣтъ 37°. Температура тѣла всего удобнѣе изслѣдуется

вложеніемъ термометра подъ-мышку. Возвышенный жаръ (свыше 39^0) всего яснѣе опредѣляется на туловищѣ, рѣдко на конечностяхъ и головѣ. Онъ рѣдко сопровождается потомъ. Около страждущихъ частей жаръ часто бываетъ значительнѣе чѣмъ въ отдаленныхъ. Жаръ этотъ рѣдко бываетъ постояннъ; онъ измѣняется и въ разное время сутокъ совсѣмъ прекращается.

Біеніе пульса, натурально, также имѣетъ весьма важное значеніе. Нужно при этомъ не упускать изъ виду, что уже въ нормальномъ состояніи пульсъ значительно измѣняется въ разныхъ возрастахъ. Для соображенія этихъ обстоятельствъ приводимъ слѣдующія фізіологическія данныя.

Нормальное число біеній пульса въ минуту:

вскорѣ по рожденіи	140—208 ударовъ.
съ 8 дня до 2 мѣсяцевъ	96—130
2 мѣс. до 21 —	96—120
2 лѣтъ до 5 лѣтъ	92—108
5 — 8 —	84—100
8 — 12 —	76— 96

Кромѣ того нужно еще замѣтить, что пульсъ ускоряется также отъ возвышенной окружающей температуры, отъ акта пищеваренія, отъ движенія, нетерпѣнія, страха, крику, кашля. Это ускореніе у грудныхъ дѣтей можетъ доставить отъ 15 до 30 ударовъ въ минуту.

Къ вечеру пульсъ въ здоровомъ состояніи обыкновенно замедляется; къ утру возвращается

къ обыкновенной силѣ. Во время сна пульсъ упадаетъ на 15—20 ударовъ.

Вообще можно принять, что у ребенка есть *мисорадоочный* жаръ, какъ скоро пульсъ ускоряется свыше 130—140 ударовъ въ минуту.

Вмѣстѣ съ жибобіеніемъ въ болѣзненномъ состояніи большею частью учащается и движеніе *дыханія*. Число вдыханій у грудныхъ дѣтей относится къ числу ударовъ пульса какъ 1 къ 4; на второмъ году, какъ 1 къ 5 и 6. Въ первомъ полугодіи число вдыханій представляетъ сумму отъ 24 до 42 въ минуту; отъ 7 мѣсяцевъ до 2½ лѣтъ: 34—36; отъ 2 до 5 лѣтъ: 20—32; отъ 6 до 10 лѣтъ: 20—28; въ послѣдующіе годы: отъ 12 до 28.

На *дѣланіе* зубовъ въ дѣтскихъ болѣзняхъ сваливается такъ много разныхъ вещей и оно бываетъ причиною столькихъ недоразумѣній, что совершенно необходимо обратить вниманіе на нѣкоторыя общія данныя по этому предмету.

Образованіе первыхъ зубовъ обнимаетъ 20, такъ называемыхъ молочныхъ зубовъ, а именно: въ каждой челюсти по 4 рѣзца, по 2 глазныхъ и по 4 коренныхъ. У новорожденныхъ десны очень тверды и образуютъ острый край на челюстной кости, иногда имѣющій бугроватости и большею частію бѣловатый цвѣтъ. Впослѣдствіи они постепенно полнѣютъ и становятся мягче до совершеннаго прорѣзанія зубовъ. Молочные зубы обыкновенно появляются въ слѣдующихъ пяти группахъ съ неравномѣрно продолжительными перемежками:

- 1) отъ 4 до 8 мѣсяцевъ 2 среднихъ рѣзца вверху;
- 2) — 8 — 11 — 4 — — внизу;
- 3) — 2 — 14 — 4 боковыхъ коренныхъ и
2 рѣзца внизу.
- 4) — 18 — 20 — 4 главныхъ вверху и
внизу.
- 5) — 28 — 34 — 4 остальныхъ боковыхъ
коренныхъ вверху и
внизу.

Этотъ порядокъ, конечно, не всегда постояненъ, однакожъ въ этомъ отношеніи исключенія еще не даютъ права заключать о болѣзненномъ состояніи.

Къ концу 4 года, а иногда между 5 и 6 — является по 2 новыхъ коренныхъ зуба въ каждой челюсти. Эти — принадлежать уже къ постояннымъ. На 7 году наступаетъ смѣна зубовъ. Постоянные зубы появляются въ слѣдующемъ порядкѣ:

отъ 5 до 6 лѣтъ первые боковые коренные,

- » 7 — 8 » средніе рѣзцы,
- » 8 — 9 » боковые рѣзцы,
- » 9 — 10 » первая смѣна коренныхъ,
- » 10 — 11 » глазные,
- » 11 — 12 » вторые боковые,
- » 12 — 13 » коренные,
- » 13 — 14 » задніе коренные.

Очень раннее появленіе зубовъ можетъ случиться какъ у крѣпкихъ, такъ и у слабыхъ по сложенію дѣтей и вовсе не составляетъ особеннаго признака болѣзни. Позднее появленіе ихъ

означаетъ медленное развитіе тѣла вообще или болѣзненное направленіе питанія, но также не всегда служить вѣрнымъ признакомъ. Очень запоздалые зубы большею частію встрѣчаются у рахитическихъ.

Что касается до прорѣзыванія зубовъ, какъ причины болѣзни, то въ этомъ отношеніи, конечно въ старину, было наговорено очень много преувеличеній. Несомнѣнные и видимыя сопровождающія страданія суть: опухоль, краснота и чувствительность десенъ и вслѣдствіе этого безпокойство, крикъ, затрудненное сосаніе и усиленное отдѣленіе слюны. Нельзя отрицать, конечно, что во время этихъ явленій, при возвышеніи общаго раздраженія, очень часто появляются также лихорадочныя, судорожныя и гастрическія расстройства и что въ этомъ состояніи всякое стороннее болѣзнеродное вліяніе легко можетъ найтись доступъ.

О нормальномъ *ростѣ* можно замѣтить слѣдующее: средняя мѣра длины новорожденнаго ребенка составляетъ 20 дюймовъ, а вѣсъ отъ 7 до 8 фунтовъ. Самый скорый ростъ совершается въ первое время жизни: въ первый годъ дитя вырастаетъ почти на 7 дюймовъ; во 2-й годъ оно растетъ только на половину противъ перваго, на третій — на одну треть. Отъ 4 и 5 лѣтъ до 16, ростъ становится правильнымъ и составляетъ около 2 дюймовъ въ годъ. Отъ 16 до 17 лѣтъ ростъ прибавляется на 1½ дюйма, а въ слѣдую-

щихъ двухъ годахъ только по 1 дюйму. Затѣмъ на 19 ростъ обыкновенно прекращается, иногда однакожъ продолжается и до 25 лѣтъ. Бѣдная пища и хроническія болѣзни, особенно золотуха и рахитизмъ замедляютъ ростъ; воспалительныя болѣзни напротивъ ускоряютъ его. Очень скоро растущія дѣти обыкновенно худѣютъ и имѣютъ слабые мускулы; нерѣдко и грудная коробка остается узкою, длинною. Поэтому во время роста въ особенности слѣдуетъ обращать вниманіе на питательность пищи.

Фонтанелей (темячекъ) на черепѣ у новорожденного бываетъ 4. Одно всѣмъ извѣстное *темячко* собственно на темени, 2 по сторонамъ и одно, самое малое, въ затылочной части. Они не должны быть ни впалыми, ни выпуклыми. Изъ нихъ переднее зарастаетъ обыкновенно позже всѣхъ, на 15 мѣсяцѣ.

Этихъ общихъ указаній будетъ достаточно, для того, чтобы въ случаѣ нужды отличать ненормальное, болѣзненное состояніе ребенка отъ нормального, здороваго.

БОЛѢЗНИ НОВОРОЖДЕННЫХЪ.

Мнимо-мертво-рожденныхъ, что обыкновенно случается вслѣдствіе чрезвычайно трудныхъ родовъ, сопровождающихся родовспомогательно операціею, или вслѣдствіе захлестнув-

шейся около шеи пуповины, нужно, по освобожденіи отъ препятствій, прежде всего стараться оживить вызывомъ дыхательнаго движенія. Для этого нужно тереть спину, бока и грудь такимъ образомъ, чтобы грудная коробка (ребра) двигалась соотвѣтственно вдыханію и выдыханію. Можно прибѣгать и къ непосредственному вдуванію воздуха. Покидать опытовъ оживленія не слѣдуетъ ни въ какомъ случаѣ прежде появленія несомнѣнныхъ признаковъ смерти: иногда опыты оживленія удавались послѣ нѣсколькихъ часовъ, повидимому безуспѣшно потраченныхъ трудовъ. Вмѣстѣ съ механическими опытами расширенія груди, полезно будетъ давать по нѣскольку капель воды, въ которой растворенъ *Tartarus emeticus* въ маломъ количествѣ. Если окажется дыханіе, то треніе нужно все-таки продолжать до тѣхъ-поръ, пока ребенокъ станетъ кричать. Если затѣмъ лицо остается багровымъ, то дать приѣмъ *Op.* и поставить клистирь изъ воды съ прибавкою масла.

На пуповинѣ, отвязанная часть которой въ 3 — 4 дня при обыкновенномъ порядкѣ должна съежиться, засохнуть и чрезъ нагноеніе отдѣлиться сама собою, иногда возникаетъ чрезмѣрное **воспаленіе и нагноеніе**, которыя могутъ сообщиться самому пупку и распространиться на покровы живота въ видѣ **рожи**. Въ такомъ случаѣ больное мѣсто надобно по нѣскольку разъ въ день смазывать слабымъ растворомъ тинктуры *Arnici*

(2 капли на столовую ложку воды) и обвязать животъ очень мягкимъ бинтомъ.

Противъ **подтековъ, опухолей** и **помятій** головы, случающихся при трудныхъ родахъ, можно употребить такую же примочку *Arn.*, если помятіе такъ значительно, что долго не прошло бы само собою. Когда такая опухоль продолжаетъ развиваться и есть признаки, что она содержитъ въ себѣ жидкость, кровь или гной, то давать *Sil.* два раза въ день. Если и при этомъ силы ребенка очень упадаютъ, исчезнетъ аппетитъ, является поносъ, то кромѣ *Sil.* можно употребить *China*.

Опухоль и отвердѣніе грудныхъ сосочковъ у новорожденныхъ происходитъ обыкновенно отъ механической причины, отъ неосторожнаго давленія, очень рѣдко отъ другихъ причинъ. Въ первомъ случаѣ единственное средство *Arnica*, наружно (4 капли тентуры на столовую ложку воды); если же есть другая, внутренняя причина и въ особенности если краснота широко распространяется, то нужно бываетъ употребить *Bellad.* Если опухоль велика, мягка и заключаетъ въ себѣ гной, то нужно давать *Нер.-sulph.* вмѣстѣ съ тѣмъ, натурально, нужно заботиться объ устраненіи всякаго нажима и о защищающей перевязкѣ.

Обопрѣлость въ большей части случаевъ не составляетъ болѣзни и есть простое слѣдствіе раздраженія кожи треніемъ, сыростью или потомъ

отъ слишкомъ теплаго укутыванья. Оно случается преимущественно у полныхъ, толстыхъ дѣтей подъ мышками, въ пахахъ и около промежности. Лучшее предохранительное средство—опрятность. Толстымъ и сильно потѣющимъ дѣтямъ можно также дѣлать присыпку картофельною мукою или рисовой пудрой, не отнюдь но плауномъ или иными лекарственными веществами. Если же, несмотря ни на какую присыпку, ни на тщательное содержаніе въ чистотѣ, обопрѣлость всетаки обнаруживается, то самымъ дѣйствительнымъ лекарствомъ будетъ *Cham.* Если ромашка уже была употреблена въ большомъ количествѣ, въ видѣ чая или ванны, какъ это еще случается довольно часто, то приличнѣе будетъ *Лусор.* Когда обопрѣлость дошла уже до отдѣленія гноевидной, дурно пахнущей жидкости и ребенокъ ослабѣваетъ, нужно употребить *Merc.* Въ то же время мать или кормилица должна избѣгать употребленія всякой острой, слишкомъ соленой, кислой и жирной пищи и заботиться о содержаніи своего тѣла въ чистотѣ. Если въ пять дней *Merc.* не произведетъ желаннаго дѣйствія, дать одинъ приемъ *Нер.* и опять продолжать *Merc.* Этихъ средствъ будетъ достаточно въ самыхъ упорныхъ случаяхъ и даже тогда, когда можно предполагать наслѣдственное сифилитическое худосочіе.

У грудныхъ дѣтей нерѣдко случается **задержаніе мочи**, которое обнаруживается тѣмъ, что ребенокъ передъ испущеніемъ бываетъ очень без-

покою, кричитъ, сучитъ ногами, а иногда накопленіе мочи видимо растягиваетъ пузырь и дѣлаетъ его чувствительнымъ къ прикосновенію. Въ большей части случаевъ достаточно бываетъ нѣсколькихъ пріемовъ *Puls*. Если же пузырь очевидно раздраженъ и чувствителенъ къ прикосновенію, или же есть жаръ, судорожныя подергиванія или даже признаки воспаленія, то предварительно дать *Acon*.

Противъ **непроизвольнаго испущенія мочи** по ночамъ, у большихъ дѣтей, хорошія средства: *Bell.*, *Cina* и *Pulsat*.

Запоръ у грудныхъ дѣтей легко устраняется промывательнымъ тепловатою водою съ ложкою масла. Если же это окажется недостаточно, то можно употребить *N.-vom.*, *Bry* или *Op*. Упорное, расположеніе къ запору часто успѣшно побѣждается посредствомъ *Lycop*.

Противъ **пученья** и **рѣзи** въ животѣ у дѣтей самое лучшее средство *Cham*. Если же ромашка уже была употреблена въ большомъ количествѣ, то можно дать *Coff*, а при запорѣ *N.-vom*. При чрезвычайномъ безпокойствѣ, метаньѣ, крикахъ, потягиваніи ногъ и водянистыхъ испражненіяхъ лучшее средство *Jalappa*. При этихъ страданіяхъ вообще нужно обращать вниманіе на состояніе матери или кормилицы, потому что если онѣ сами страдаютъ разстройствомъ желудка, то передаютъ его ребенку въ молоко. Порча молока нерѣдко происходитъ также отъ

душевныхъ волненій, особенно испуга и досады, и также вредить ребенку. Въ такомъ случаѣ мало лечить ребенка, нужно самой кормилицѣ, кромѣ устраненія вредящихъ причинъ, назначить соотвѣтствующее причинамъ лекарство: противъ послѣдствіи **досады** или **гнѣва** *Cham.* или *Coff.*; противъ **испуга** *Acon.* и *Op.*; противъ **скорби** или **глубокаго горя** *Ignat.*

Рвота у грудныхъ дѣтей встрѣчается очень часто и бываетъ совершенно безопасна, когда часть молока извергается вслѣдствіе слишкомъ жаднаго глотанія или отъ неловкаго держанья ребенка на рукахъ, — отъ потрясенія тотчасъ послѣ кормленія или отъ механическаго нажатія желудка. Но она становится вреднымъ для питанія и ясно болѣзненнымъ явленіемъ, когда повторяется постоянно и происходитъ отъ слабости пищеваренія и болѣзненнаго раздраженія желудка. Въ такомъ случаѣ обратное изверженіе молока обыкновенно сопровождается отрыжкой, икотой, безпокойствомъ, крикомъ и другими признаками тошноты и болѣзненныхъ ощущеній; извергаемое рвотою часто кисло пахнетъ, имѣетъ творожистый видъ или смѣшано со слезю: испражненія низомъ неправильны; моча темна; ребенокъ становится вялымъ и слабымъ. Въ такомъ положеніи прилична *Ipec.*, особенно если испражненія низомъ водянисты. Когда этого нѣтъ и другіе сопровождающіе припадки не очень рѣшительны, то еще скорѣе помогаетъ *Aethusa*. Въ упорныхъ

случаяхъ при чрезвычайномъ худѣніи и слабости помогаютъ *Ars.* и *Kreos.*

Когда рвота происходитъ отъ потрясенія желудка кашлемъ, то дать нѣсколько приемовъ *Tart.-emet.* или *Ferr.*, особенно если извергается много слизи.

У дѣтей, содержимыхъ на искусственномъ кормленіи, рвота часто происходитъ отъ несоотвѣтствующей пищи, отъ слишкомъ жирнаго, тяжелаго или несвѣжаго молока, отъ записанія соски, отъ несвоевременнаго кормленія и т. д., и въ такомъ случаѣ, разумѣется, требуетъ только устраненія причинъ.

Икота у дѣтей, появляющаяся часто тотчасъ послѣ кормленія, иногда бываетъ такъ постоянна и упорна, что требуетъ пособія, и легко уничтожается посредствомъ *Ignat.*

Противъ **поноса**, которымъ чаще всего страдаютъ грудныя дѣти, дѣйствительнѣйшія средства *Cham.*, *Ipec.*, *Merc.*, *Rheum.*, *Sulphur* и *Calcarea-acetica*. (Подробныя указанія см. выше въ статьѣ **поносъ**). Вслѣдствіе очень продолжительнаго поноса, къ которому присоединяется рвота и другіе признаки разстроеннаго пищеваренія, обыкновенно обнаруживается такъ называемая **атрофія** (сухотка), болѣзнь, происходящая отъ недостаточнаго питанія организма и отличающаяся чрезвычайнымъ худѣніемъ тѣла, слабостью, бессонницей, осунувшимся, старческимъ видомъ лица и изнурительною лихорадкой. Глав-

ное дѣло въ такомъ случаѣ принять мѣры къ соотвѣствующему крѣпительному питанію: искусственно или плохую грудью вскормленныхъ дѣтей въ этомъ состояніи иногда спасаетъ здоровая кормилица. Въ то же время необходима *Calcareæ acet.* Если же это средство, въ большей части случаевъ совершенно достаточное, окажется неэффективнымъ, то иногда еще помогаетъ *Arsen.* Когда у такихъ дѣтей являются судороги, вслѣдствіе недостаточнаго питанія мозга водянистою кровью, то развѣ только *China* еще спасетъ. Иногда подобныя судороги являются у дѣтей вообще здоровыхъ послѣ кратковременнаго, но очень сильнаго поноса или холерыны. Въ этомъ случаѣ *China* также прекрасное средство къ восстановленію силъ и поправленію разстроеннаго питанія.

Судороги вообще не рѣдкое явленіе у новорожденныхъ и грудныхъ дѣтей. Въ первые дни по рожденіи, вслѣдствіе процесса нагноенія пуповины, легко можетъ случиться такъ называемый **родимчикъ**, родъ столбняка. Для предупрежденія этого явленія и другихъ вредныхъ послѣдствій, всегда нужно оберегать пупокъ до окончательнаго заживленія и употреблять для этого въ случаѣ надобности *Arn.* Если же судорожные припадки уже оказались, то приличнѣйшимъ средствомъ будетъ *Bell.* Когда судороги произошли отъ измѣненія молока кормилицы вслѣдствіе сильнаго испуга, и другихъ причинъ нѣтъ, то должно

предпочесть *Opium*. Если же ни то, ни другое средство не помогаетъ и припадки угрожаютъ большою опасностью, то можно еще испытать *Zinc.*, *Angust.* или *Stramon.* (О прочихъ родахъ судорогъ выше уже было сказано).

Главное средство противъ судорогъ во время образованія и **прорѣзыванія зубовъ** *Zincum*, которое въ большой части случаевъ оказывается специфическимъ и дѣйствуетъ съ чудесною быстротою, но должно быть дано въ довольно сильныхъ и часто повторенныхъ приемахъ. Когда раздраженіе десенъ составляетъ очевидную причину припадковъ и сопровождается сухимъ жаромъ, крпотою лица и полости рта, съ безпокойнымъ пугливымъ сномъ и вскакиваніями съ просонья, то успѣшно дѣйствуетъ также *Belladonna*.

Въ легкихъ судорогахъ у грудныхъ дѣтей, при поносѣ вслѣдствіе простуды, съ рѣзью, рвотой, безпокойствомъ, постояннымъ крикомъ, блѣдностью лица, полукрытыми или закатившимися глазами, самое лучшее средство *Chamomilla*. Если же ромашка или другое подобное средство уже было употреблено въ большомъ количествѣ, то дать *Acon.* и потомъ *Ipec.* въ повторенныхъ приемахъ.

Когда судороги причинены **испугомъ** и сопровождаются общимъ дрожаніемъ тѣла, метаньемъ руками и ногами и громкимъ крикомъ, то въ особенности приличны *Opium* и *Ignatia*.

Когда судороги являются у слабыхъ или раз-

дражительныхъ дѣтей **безъ видимой причины**, то до отысканія настоящаго страданія можно употребить *Coffea*.

Противъ судорогъ у дѣтей вслѣдствіе поноса и продолжительной или **истощающей** болѣзни цѣлительно дѣйствуетъ *China*.

Главное средство противъ судорогъ **отъ глистовъ** *Cina*. Но кромѣ дѣйствительнаго отхожденія глистовъ нужно, чтобы замѣтны были и прочія явленія, блѣдность лица, синева подъ глазами, зудъ въ носу и въ заднемъ проходѣ, тошнота, скопленіе слюны и пр.

Насморокъ и кашель сравнительно не очень часто поражаютъ новорожденныхъ. Только заложеніе носа иногда бываетъ значительнымъ препятствіемъ кормленію. Нѣсколько пріемовъ *N-vom*. и намазываніе носа внутри и снаружи миндальнымъ масломъ, быстро устраняютъ это затрудненіе. Если притомъ носъ наполненъ густою вязкою слизью и ребенокъ со сна внезапно вздрагиваетъ, какъ-будто задыхается, то помогаетъ *Sambuc*. Противъ кашля всего лучше *Acon*.

Воспаленіе глазъ у новорожденныхъ случается нерѣдко въ первые дни или недѣли, отъ неосторожнаго допущенія свѣта, пыли или механическаго раздраженія. Оно обнаруживается свѣтобоязнію, краснотою, опухолью и отдѣленіемъ густой слизи на краяхъ вѣкъ. Не говоря уже объ устраненіи сказанныхъ причинъ, воспаленные глаза слѣдуетъ тщательно очищать отъ слизи осто-

рожнымъ обтираніемъ мягкою губкою съ тепло-
ватою водою. При первыхъ признакахъ болѣзни,
прежде всего полезно дать нѣсколько приѣмовъ
Асеп.; если же есть уже значительное отдѣленіе
слизи, то главное средство *Ignat.*, за которымъ,
если не поможетъ, дать *Нер.* Если же, несмотря
на эти средства, болѣзнь не скоро уничтожается,
то это служитъ признакомъ, что она происходитъ
отъ болѣе глубокихъ причинъ, которыя слѣдуетъ
открыть и опредѣлить, чтобы сообразно съ ними
выбрать средства и предупредить опасное раз-
стройство глаза и угрожающую слѣпоту.

Изъ **накожныхъ болѣзней** у грудныхъ
дѣтей встрѣчаются преимущественно слѣдующія:
Такъ называемая **щетинка**,—мелкіе угревидные
прыщики на лицѣ, около ушей и на другихъ ча-
стяхъ тѣла. Происходитъ отъ засоренія каналь-
цевъ, заключающихся въ кожѣ сальныхъ железъ.
Они иногда значительно припухаютъ, воспаляются
и переходятъ въ нагноеніе. Противъ этого доста-
точно обыкновеннаго очищенія кожи, обмыванія
съ мыломъ и, если нужно, съ пшеничными отру-
бями. Точно также не требуютъ лекарственнаго
пособія струповидныя чешуйки на темени, состо-
ящія изъ выдѣляемаго кожею сала, пота и внѣш-
нихъ нечистотъ и легко сходящія отъ обмыванія
мыломъ и смазыванія масломъ. Насильственное
соскабливаніе и счесываніе гребнемъ не годится,
потому что давленіемъ можно повредить неза-
росшее темя.

Болѣе важное и дѣйствительно уже болѣзненное явленіе представляетъ такъ называемая **пузырчатая сыпь** (*Pemphigus*). Это наполненные свѣтлою жидкостью пузырьки, величиною иногда съ горошину и болѣе. Они появляются въ болѣе или менѣе значительномъ числѣ безъ опредѣленнаго порядка, на всѣхъ частяхъ тѣла, особенно на рукахъ и ногахъ; лопаются и оставляютъ садно или обращаются въ струпь. Зудъ, жженіе и прилипаніе саднящихъ мѣстъ къ бѣлѣю причиняютъ безпокойство и бессонницу, а иногда лихорадку и исхуданіе. Тщательное очищеніе кожи купаньемъ, присыпка саднящихъ мѣстъ картофельною мукою и *Rhus* въ нѣсколько дней уничтожаютъ эту болѣзнь. Если же она окажется упорною, то давать *Merc.*

Жаровая или потовая сыпь есть ни что иное, какъ слѣдствіе слишкомъ теплаго укутыванья и сильной испарины. Она также уничтожается купаньемъ; если же причиняетъ значительное безпокойство, то можно ускорить дѣло нѣсколькими приемами *Acon.*

Бессонница, безпокойство и крикъ дѣтей по ночамъ въ особенности бываютъ тягостны для матерей, кормилицъ и нянекъ. Эти явленія почти всегда бываютъ болѣзненнаго происхожденія, потому что ребенку, особенно на первыхъ порахъ, для должнаго развитія нужно много сна. Здоровый ребенокъ въ первыя недѣли спитъ почти постоянно, исключая времени кормленья и ку-

панья: шести-мѣсячному нужно отъ 16 до 18 часовъ сна въ сутки. Поэтому нужно внимательно отыскивать причину безсонницы и устранять ее. Чаще всего безпокойный сонъ бываетъ слѣдствіемъ неправильнаго или слишкомъ обильнаго кормленья и происходящаго отъ того затрудненія въ пищевареніи. Дѣти, которымъ давали много ромашки, валеріаны или чаю, или дурное молоко, или слишкомъ много каши, и тѣ, которыхъ матери и кормилицы пьютъ много кофе или вина или употребляютъ несоотвѣтствующую пищу, всегда страдаютъ безсонницей. Безпокойство можетъ происходить также отъ слишкомъ крѣпкаго пеленанія, высокаго изголовья, отъ жару на перяныхъ подушкахъ, отъ нечистаго воздуха, нечистоты и страданія кожи. Когда виною безсонницы разстройство пищеваренія и есть пученье живота, признаки рѣзи и поносъ, то скоро помогаетъ *Cham.* Когда желудокъ въ порядкѣ и страданіе происходитъ, повидимому, отъ болѣзненнаго нервнаго раздраженія, то превосходное средство *Coffea.* Когда есть жаръ и краснота въ лицѣ и ребенокъ ночью часто пробуждается съ крикомъ, помогаетъ *Bell.* Когда безпокойство продолжается и днемъ, можно дать *Acon.* Когда по ночамъ обнаруживается сильная жажда, жадное сосанье и сухость губъ и рта, то должно предпочесть *Bry.* Когда же безсонница является безъ всякихъ сопровождающихъ болѣзненныхъ признаковъ; когда ребенокъ слишкомъ много и не во-время гуляетъ

но притомъ спокоенъ и веселъ, играетъ и смѣется, то для предупрежденія послѣдствій недостаточнаго сна, можно давать *Huosc.* или *Rapinc-bulb.*

Въ высшей степени вредно сильно качать и трясти ребенка въ видахъ успокоенія; этимъ средствомъ достигается только оглушеніе и родъ одурѣнія, вслѣдствіе непрерывнаго сотрясенія мозга. Еще того хуже и непростительнѣе отъ бессонницы давать дѣтямъ отваръ мака или опій въ большихъ количествахъ, или позволять кормилицѣ пить значительное количество вина, водки или крѣпкаго пива: отъ этого ребенокъ не успокоивается, а также впадаетъ въ вредное его нѣжному мозгу опьяненіе.

Все здѣсь сказанное о бессонницѣ относится также къ крику ребенка. Прежде всего, разумѣется, нужно стараться открыть причину крика, потому что до году ребенокъ никогда не кричитъ безъ причины, просто отъ злости. Если же причины нельзя найти и устранить, то ужъ лучше дать ребенку кричать, чѣмъ употреблять варварскія насильственные средства оглушенія, угрожающія мозгу поврежденіемъ и расслабленіемъ.

§ XVII.

МЕХАНИЧЕСКІЯ ПОВРЕЖДЕНІЯ.

УШИБЫ, РАНЫ, ВЫВИХИ.

Во всѣхъ механическихъ поврежденіяхъ *Arn.* внутрь и снаружи даетъ самые блестящіе результаты. Цѣлительная сила ея простирается не только на поврежденія мягкихъ частей, но и на растяженіе и помятіе связокъ суставовъ при вывихахъ. **Подтеки, синяки и волдыри** или **опухолы отъ ушибовъ** быстро уничтожаются примочкою *Arn.* (1 часть тинктуры на 4 части воды, если кожа не прорвана). При всякомъ сколько-нибудь значительномъ поврежденіи въ то же время нужно давать *Arn.* внутрь въ обыкновенныхъ разведеніяхъ, потому что она соотвѣтствуетъ всѣмъ слѣдствіямъ ушиба, — сотрясенію нервной системы, головной боли, головокруженію, одурѣнію, рвотѣ (отъ ушиба головы), одышкѣ, кашлю, кровохарканію (отъ ушиба груди) и т. д., *Arn.* также самое дѣйствительное средство отъ послѣдствій операціи надъ зубами. По всему этому у большинства гомеопатовъ *Arnica* до-сихъ-поръ составляетъ единственное средство отъ всѣхъ механическихъ поврежденій. Но она имѣетъ и невыгоды, неоднократно уже указанныя многими практиками, а именно: часто причиняетъ рожи-

стое воспаленіе, особенно около разорванныхъ, открытыхъ и кровоточивыхъ ранъ. Во избѣжаніе этого воспаленія совѣтуютъ пониже разводить примочку. Но тогда оказывается другое неудобство: слишкомъ слабая примочка не останавливаетъ кровотеченія. Лѣтъ тридцать тому назадъ нѣкоторые гомеопаты уже указывали на различные другія средства, взаимно арники *).

Были предложены *Hypericum* (звѣробой), *Helianthus* (подсолнечникъ) и въ особенности *Calendula* (ноготки). Въ дѣйствительности *Calend.* Дерикеръ долговременнымъ личнымъ опытомъ убѣдился и потому теперь уже можетъ положительно рекомендовать это средство для всѣхъ свѣжихъ, открытыхъ, кровоточивыхъ ранъ, какъ самую лучшую заживляющую примочку особенно на такихъ частяхъ, которыя неудобно забинтовывать наглухо (см. ниже). Берется одна часть тинктуры на 5—6—8 частей воды. Чѣмъ сильнѣе кровотеченіе, тѣмъ крѣпче долженъ быть растворъ. *Calend.* тотчасъ же унимаетъ боль и очень быстро заживляетъ безъ нагноенія, если нѣтъ особеннаго худосочія, и никогда не производитъ рожистаго воспаленія.

При поврежденіяхъ **КРОВОТОЧИВЫХЪ** одно

*) См. Журн. «Гомеоп. Леченія», 1862, ст. Дерикера, «Леченіе ранъ и механическихъ поврежденій», стр. 91. Тамъ же объ огнестрѣльныхъ ранахъ.

изъ важнѣйшихъ условій предупрежденія нагноенія и уменьшенія неизбежно зародившагося состоитъ въ *устраненіи доступа воздуха*. Поэтому чистая разрѣзанная или разрубленная рана, по сжатіи краевъ, можетъ быть просто заклепа и заживаетъ тѣмъ скорѣе, чѣмъ меньше выпущено крови. Для этого, соединивъ и зажавъ края, стоитъ только наложить примочку *Arnica*. (1 часть на 4—6 ч. воды) на ватѣ, прикрыть слоемъ сухой ваты, забинтовать и не снимать перевязки до совершеннаго заживленія, когда повязка сама отстанетъ. При этомъ способѣ нагноенія не бываетъ. Можно также плотно наложить и обвязать рану бинтомъ, смоченнымъ простымъ столярнымъ клеемъ. Можетъ быть употребленъ также столярный (мебельный) лакъ, который сохнетъ еще быстрѣе клея. Такая перевязка вовсе не перемѣняется: какъ скоро рана совершенно заживетъ, клей (или лакъ) самъ отстанетъ и перевязка снимется. Само собою разумѣется, что при этомъ способѣ нужно быть напередъ убѣжденнымъ, что рана чиста, ничѣмъ не засорена: въ противномъ случаѣ можетъ образоваться воспаленіе и нагноеніе, происходящія отъ присутствія инороднаго тѣла.

Calendula заимствована изъ народной медицины*).

*) См. Дерикеръ, Сборникъ народно-врачебныхъ средствъ, сахарями въ Россіи употребляемыхъ. Спб. 1866.

Не мѣшало бы также собрать побольше фактовъ относительно заживляющей силы *Telephii* (*Sedum Telephium*, заячья капуста, заячья трава, узикъ, скрипунъ, живая трава, воронье масло, расходникъ). Перегнанная вода изъ этой травы изстари была извѣстна подъ названіемъ *живой воды* и содержалась и въ аптекахъ подъ именемъ *Aqua telephii*, но потомъ забыта, какъ и многое иное хорошее, выброшенное за бортъ вмѣстѣ съ мусоромъ.

Травматическая (ранная) лихорадка, или раздраженіе всей кровеносной системы при значительномъ пораненіи, всего лучше унимается *Аconi'*омъ. Этой лихорадкѣ соотвѣтствуетъ также *Arnica*, въ особенности, если поврежденія сопровождались сильнымъ потрясеніемъ головного и спинного мозга.

У людей, имѣющихъ болѣзненную кожу, расположенную къ нагноенію отъ малѣйшаго поврежденія, *Нер.-sulph.* много помогаетъ скорому заживленію. Значительныя раны, въ которыхъ нагноеніе есть неизбѣжный процессъ и средство застоя, лечатся какъ язвы, нарывы и нагноенія вообще.

При **ВЫВИХАХЪ**, разумѣется, прежде всего должно озаботиться о вправленіи смѣщеннаго сустава, но и тутъ можно предварительно давать *Arn.*, которая вслучаѣ образовавшейся уже опухоли облегчаетъ операцію, потому, что успокоиваетъ боль и уменьшаетъ приливъ.

Противъ растяженія **связокъ**, а также противъ застарѣлыхъ слѣдствій помятій или вывиха, обнаруживающихся страданіемъ поврежденнаго члена послѣ напряженій или перемѣнъ погоды лучше всего помогаетъ *Rhus*.

Когда ушиблена какая-нибудь **железа**, грудная или шулята и т. п., кромѣ *Arn.* отлично дѣйствуетъ *Conium*.

Противъ поврежденія **костей** и **надкостной плевы** превосходное средство *Symphytum officinale*, которая и при переломахъ, требующихъ правильной повязки, ускоряетъ сращеніе. При помятіяхъ, сопряженныхъ съ поврежденіемъ надкостной плевы, съ успѣхомъ прикладывается также примочка изъ *inct. Symph.*, которая готовится такъ же, какъ и арниковая.

§ XVIII.

ОТРАВЛЕНІЯ.

Первая и важнѣйшая задача при всякомъ сколько-нибудь значительномъ отравленіи состоитъ въ немедленномъ принятіи мѣръ къ удаленію яда изъ организма посредствомъ возбужденія рвоты или посредствомъ нейтрализованія (превращенія въ безвредное вещество) противуядами. Рвота совершенно необходима, когда ядъ попалъ въ желудокъ, и всего лучше возбуждается большими

количествами тепловатой воды, или молока и щекотаніемъ въ глоткѣ перомъ или пальцемъ. Если же этого недостаточно, то въ воду можно прибавить немножко мыла или коровьяго масла; но при этомъ уже нужно имѣть въ виду родъ яда, чтобы вмѣсто вывода яда не усилить его растворимости и вреднаго дѣйствія.

Иногда рвота и выведеніе ядовъ достигается посредствомъ тѣхъ самыхъ веществъ, которыя служатъ противуядіями и нейтрализующими средствами.

ХИМИЧЕСКІЕ АНТИДОТЫ.

Какъ противуядія употребляются противъ:

Аконита: танинъ или танинъ содержащій отваръ, эфиръ, вино, ромъ съ горячею водою, крѣпкій кофе, камфора; винный спиртъ или нашатырный спиртъ для втиранія въ спину; животный уголь.

Алкоголя (виннаго спирта) слизистое питье и разведенный нашатырный спиртъ (8 капель на стаканъ сахарной воды).

Атропина, одурника (*Bellad.*), дурмана (*Stramon.*) и бѣлены (*Hyoscyam.*): дубильную кислоту содержащія вещества и растительная кислота; холодныя обливанія; клистиры съ уксусомъ; іодистаго потассія 1 скруп. и іода 2 грана на 6—8

унцій жидкости, черезъ полчаса по столовой ложкѣ; нашатырный спиртъ, кофе, вино, эфиръ и камфора. Рекомендуются также подкожныя впрыскиванія морфія, Dr Garrod нашелъ, что небольшое количество животнаго угля (*Carbo-anim.*), прибавленное къ вытяжкѣ *Acon.*, *Bellad.*, *Hyosc.* или *Stramon.*, уничтожаетъ ихъ специфическое дѣйствіе на организмъ.

Барита: глауберова соль или сѣрнокислая магнезія, а за неимѣніемъ этого — сода, яичный бѣлокъ, молоко.

Бѣлены (см. Атропина).

Грибовъ ядовитыхъ (мухомора и проч.): разведенный нашатырный спиртъ, вода съ уксусомъ или эфиромъ, кофе.

Дигиталина: растительныя кислоты, уксусъ, настой чернильных орѣшковъ, эфиръ, камфора, опій.

Дурмана (см. Атропина).

Жироваго (колбаснаго и сырнаго) яда: уксусъ, лимонъ, щелочи, холодныя обливанія.

Извести, ѣдкой, хлорной: растительныя масла.

Іода и іодистаго потассія: крахмалъ въ большомъ количествѣ, сахарная вода, магнезія.

Кали ѣдкаго и углекислаго: растительная кислота, лимонный сокъ, уксусъ.

Кали хромокислаго: углекислая магнезія или *Natrum carb. acidulum*. Шнейдеръ рекомендуетъ жидкую кашицу изъ сахарной патоки съ желѣзнымъ порошкомъ.

Камфоры: кофе и холодныя обливанія.

Квасцовъ: мыльная вода.

Коніина: танинъ, уксусъ, клистиры съ камфорнымъ уксусомъ.

Ляписа, адскаго камня: поваренная соль, бѣлокъ и слизистое питье.

Мышьяка: *Ferrum hydricoaceticum* съ водою (*Liquor ferri hydrico-acetici*), а за неимѣніемъ этого: водная окись желѣза (охра, растворенная въ водѣ), магнезія, известковое молоко съ сахаромъ, бѣлокъ. Когда ядъ давно уже проглочень, полезны клистиры изъ водной окиси желѣза.

Мѣди и мѣдной зелени, или окиси: яичный бѣлокъ, сахарная вода, желѣзисто-синеродистое кали (*Kali ferro hydrocyanicum*), кашница изъ 7 частей желѣзныхъ опилокъ и 4 частей сѣрнаго цвѣта, или желѣзный порошокъ въ сахарной патоцѣ.

Одурника (см. Атропина).

Олова и его соединеній: яичный бѣлокъ, сахарная вода и молоко.

Опія и морфія: кофе, уксусъ, холодныя обливанія, настой чернильных орѣшковъ, танинъ, рвотныя (*Ipecac.*, *Cupr.-sulph.*, *Zinc.-sulph.*).

Ртути (сулемы, каломеля и др.): кашница изъ желѣзнаго порошка и сѣрнаго цвѣта, смѣсь изъ желѣзныхъ опилокъ съ листовымъ серебромъ и медомъ, мука, намѣшанная съ водою, яичный бѣлокъ, сахарная вода, молоко.

Рыбнаго яда: разведенный нашатырный спиртъ, древесный уголь, кофе.

Свинца: сѣрнокаслая магнезія (горькая соль) съ водою и бѣлкомъ, поваренная соль.

Синильной кислоты и ціанистаго кали: разведенный нашатырный спиртъ для вдыханія и потомъ кофе. Хлоръ (смѣшиваютъ 1 часть концентрированной хлорной воды съ 4 частями обыкновенной воды и прикладываютъ намоченную въ этомъ губку къ носу и рту и обмываютъ лобъ и виски). Холодная обливанія

Спорыньи (*Secale cornutum*, *Ergotin*): цинковый или мѣдный купоросъ, опій, ипекакуана, таннинъ.

Сюръмы и рвотнаго камня: отваръ чернильныхъ орѣшковъ, дубильная кислота.

Сѣрной кислоты (купороснаго масла) и **соляной кислоты:** магнезія, мѣлъ, сода и слизистое питье.

Селитряной (азотной) **кислоты** (крѣпкой водкой): магнезія, мѣлъ, мыльная вода, молоко, маслянистое и слизистое питье.

Фосфора: размазня изъ муки, слизистое питье (отнюдь не масло) и магнезія; по Шнейдеру, растворъ хлорной извести (8 грамм. *Calc. hypochlor.* на 300 грамм. воды и 10 капель *Acid. hypochlor.*),

Хинина: *) въ началѣ рвотныя; когда же угнетательное вліяніе на первую систему уже проявилось, то ароматическое питье, кофе, вино, амміакъ, холодныя обливанія (я синанизмы, безъ которыхъ можно обойтись).

Хлора: алкоголь на сахарѣ, водка, осторожное нюханье сѣроводорода или воды, содержащей анилинъ.

Цинковыхъ солей (бѣлаго купороса крмы): магнезія (*lac magnesia*), дубильное вещество, сода, бѣлокъ, молоко.

Чилибухи (*Nux-vomica*, *Strichnin*, также *Bru-sin*): дубильная кислота, отваръ чернильных орѣшковъ, животный уголь съ водою; умѣренные дозы *Opium* или *Morphium*; *Bromium*; кофе, молоко.

Предлагаютъ также растворъ іодистаго кали и іода, хлорную воду (на людяхъ еще не испытано) вдыханіе хлороформа, камфору внутрь, табачный настой, скипидаръ и сѣрный эфиръ.

Шпанской мушки: камфора и слизистое питье.

Щавелевой кислоты: магнезія, мѣль.

*) Хотя до-сихъ-поръ еще есть медики, утверждающіе, что хининомъ отравить нельзя, однакожъ, по свидѣтельству Русскаго Медицинскаго календаря (*Russischer Medicinalkalender*, 1868. St. Petersburg, p. 111), съ тѣхъ поръ, какъ вошло въ обычай давать большія дозы этого противохорадошнаго (отъ $\frac{1}{2}$ и до 1 драхмы) отравленія стали оказываться часто. Изъ того-же календаря мы заимствуемъ и приведенныя про-товудія.

Щелочей (поташа, соды, амміака, извести, щелока (уксусъ или лимонный сокъ въ водѣ).

* * При употребленіи всякаго противудія, разумѣется, должно наблюдать, чтобы его дано было достаточное количество (напр. для нейтрализованія одной части мышьяка, нужно отъ 27 до 30 частей водной окиси желѣза), и чтобы притомъ ядъ вмѣстѣ съ антидотомъ выводился рвотою.

ГОМЕОПАТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОТРАВЛЕННЫХЪ.

По удаленіи яда, какъ бы скоро оно ни совершилось, всегда остаются болѣе или менѣе значительныя страданія, которыми выражается его специфическое дѣйствіе на организмъ и которыя уже не поддаются дѣйствію химическихъ антидотовъ. Противъ этихъ динамическихъ страданій можно дѣйствовать гомеопатическими средствами тѣмъ успѣшнѣе, что подробная опредѣленность свойствъ лекарственныхъ веществъ даетъ возможность приискать динамическіе антидоты и средства, въ точности соотвѣтствующія каждому данному случаю. Здѣсь, конечно, въ этомъ отношеніи могутъ быть сдѣланы только самыя общія указанія.

Страданія желудка, кишечнаго канала и вообще пищеваренія требуютъ большею частію *Ирес.*

или *Ars.* — *Ipec.* въ особенности при продолжающейся тошнотѣ, рвотѣ, отрыжкѣ, отсутствіи аппетита и стѣсненіи подъ ложечкой; *Ars.* при жгучей или рѣжущей боли въ животѣ, истощающемъ поносѣ, жаждѣ, изжогѣ ощущеніи жара въ глоткѣ, желудкѣ и животѣ.

Когда животъ вздутъ и больно отъ прикосновенія къ животу и къ правому подреберью, то прилична *Bell.*

Когда поносъ обнаруживается къ особенности послѣ холоднаго питья и сопровождается тоской, тошнотой, холоднымъ потомъ и блѣдностью лица, то давать *Veratr.*

Когда, по устраненіи другихъ припадковъ, остается дурной вкусъ во рту, отсутствіе аппетита, отвращеніе отъ пищи, особенно отъ жирной и сладкой, то помогаетъ *Puls.*

Когда послѣдствія ограничиваются преимущественно страданіями головы, — голова болитъ, кружится, въ ушахъ шумъ, зрѣніе слабо, въ глазахъ мелькаетъ, внѣшній шумъ нестерпимъ, то прилична *Bell.*, если только самое страданіе не есть слѣдствіе отравленія одурникомъ; въ послѣднемъ случаѣ приличенъ *Hyosc.*

Противъ послѣдствій отравленія опиѣмъ помогаетъ *Ipec.*

Противъ отравленія дурманомъ — (*Datura Stramonium*) *N.-vom.*

Противъ отравленія челибухой — *Cocc.*

Когда остается чрезвычайная раздражитель-

ность нервовъ, безсонница, біеніе сердца, страхъ, робость, то большею частью соотвѣтствуютъ *Acon.*, *Coff.* или *N.-vom.*

Противъ послѣдствій отравленія **металлами**, большею частью хорошо дѣйствуютъ *Sulph.* и *Нер.* только при отравленіи **свинцомъ** должно предпочесть *Op.* и *N.-vom.*

Противъ **щелочныхъ** ядовъ въ особенности дѣйствителенъ *Carb.-v.*

Противъ веществъ, содержащихъ въ себѣ **си-
нильную кислоту**—*Camphora.*

Противъ отравленія **сѣрною кислотой** помогаетъ *Puls.*

Когда отъ **острыхъ** или **ѣдкихъ** ядовъ во рту и глоткѣ остаются саднящія, болящія мѣста или язвины, то соотвѣствуютъ въ особенности *Нер.* и *Merc.*

Послѣдствіямъ отравленія **мышьякомъ** большею частью соотвѣствуютъ *Ipec.* и *Ferr.*

Иоду—*Bell* и *Ars.*

Фосфору—*N.-vom.*

Ртути—*Нер.* и *Jod.*

Винному спирту—*Nux.-vom.*

Камфорѣ—*Op.*

При отравленіи вредными испареніями, **газами**: угаромъ, окисью углерода, азотомъ и т. д. больного прежде всего нужно вынести на чистый воздухъ брызгать въ лицо холодною водою или уксусомъ, держать подъ носомъ хлорную известь, сильно тереть все тѣло суконками или щеткой и ста-

раться возбудить дыхательныя движенія груди. Противъ остающихся страданій лучше всего дѣйствуютъ *Coff.*, *Op.* и *Bell.*

Противъ **ужаленія** ядовитою мухой, которая переноситъ ядъ отъ животныхъ, пораженныхъ антоновымъ огнемъ селезенки (сибирскою язвою), и производитъ злокачественные нарывы, лучшее средство *Ars.* (специфическое средство противъ сибирской язвы).

При уязвленіи ядовитыми **змѣями**, или укушеніи **бѣшеною собакой** употребляютъ поспѣшное обмываніе нашатырнымъ спиртомъ, прижиганіе ляписомъ или раскаленнымъ желѣзомъ для предупрежденія далекаго всасыванія яда. Самое дѣйствительное прижиганіе—жаръ на разстояніи. Для этого держать раскаленное желѣзо или уголь надъ раной во сколько возможно близкомъ разстояніи и довольно долго (до появленія лихорадочной дрожи) однако же такъ, чтобы не прикасаться и не причинить жженаго струпа на ранѣ. Лекарствами могутъ служить: *Bell.*, *Canth.*, *Hyosc.*, *Laches.*, *Merc.*, *Stramon.* и *Hydrophobin.*

ГОМЕОПАТИЧЕСКІЕ АНТИДОТЫ.

****** Могутъ быть употреблены частію для руководства въ діетѣ, частію же для уничтоженія послѣдствій злоупотребленія разныхъ лекарствъ въ большихъ приемахъ; для уничтоженія дѣйствія

средствъ, назначенныхъ неумѣстно, по ошибкѣ, и наконецъ для того, чтобы умѣрить ожесточенія, иногда производимыя дѣйствительно необходимыми и вѣрно-выбранными средствами.

* * Въ случаѣ неизвѣстности антидота или не-
дѣйствительности показанныхъ для уничтоженія
дѣйствія болѣе или менѣе массивныхъ дозъ ка-
кого-нибудь лекарственнаго вещества, можно съ
успѣхомъ употребить то же самое вещество въ
высокомъ разведеніи.

Aconitum — растительныя кислоты, уксусъ, вино.
Coff.

Aethusa synapium — кислоты.

Agaricus — камфора, кофе, табакъ. Уксусъ усили-
ваетъ припадки.

Agnus castus — Camph.

Antimonium crudum — камфора, кофе. Нер.-sulph.,
Merc.

Argentum — Merc.

Argentum nitricum — Acid.-nitri. Merc.-corr., Natr.-
mur.

Arnica — уксусъ, камфора.

Arsenicum — Camph., Jod., Ipecac., Ferr.

Aurum muriaticum — Jod., Merc.

Baryta muriatica — Natr.-sulph., Magnes.-sulph.,
Alumina.

Belladonna — лимонъ, уксусъ, Opium, Camphora,
Gelsemin?

Bismuthum — Calc., N.-vom.

Borax — кофе. — Вино и уксусъ ожесточаютъ.

Bromum — противъ большихъ приемовъ амміакъ, камфора, магнезія. По Balard'у бромъ—противуядіе стрихнина и вератрина.

Bryonia — Rhus., Chamom. Противъ большихъ приемовъ отваръ чернильныхъ орѣшковъ.

Calcareo carbonica—Nitri-acid., нюханье камфоры или Spirit. nitri dulcis; противъ большихъ количествъ, напримѣръ известъ содержащей воды — укусъ, лимонъ, жирныя растительныя масла.

Calcareo acetica—также.

Camphora — Op., Nitri spir. dulcis; противъ большихъ количествъ — теплая вода для возбужденія рвоты, потомъ хлорная вода, опій. Винный спиртъ, укусъ и кофе усиливають дѣйствіе камфоры. Камфора антидотъ большей части растительныхъ лекарствъ. Она возобновляетъ воспримчивость къ лекарствамъ, но собственное дѣйствіе ея непродолжительно.

Cannabis—кислота, камфора.

Cantharis — камфора, укусъ, винный спиртъ. Растительное масло ожесточаетъ дѣйствіе большихъ количествъ.

Capsicum—камфора.

Carbo vegetabilis—камфора.

Causticum — Nux-vom., Spirit. nitri dulcis.—Кофе и Phosph. ожесточаютъ.

Chamomilla—Pulsat.

Chelidonium—камфора.

China—Arsen., Ipecac.

Cicuta—кофе, чай, кислоты, камфора.

Cina—Иpecac., Chinin.

Clematis—камфора.

Cocculus—камфора, Nux-vom., Jod. — Кофе и табакъ ожесточаютъ.

Coffea—Aconit.; для большихъ приемовъ Op.

Colchicum—Nux-vom., Coccul.; для большихъ приемовъ уксусъ и медъ или Ammon. caust, 8 капель на бутылку сахарной воды.

Colysynthis — кофе, камфора; для большихъ приемовъ предварительно молоко.

Conium—растительныя кислоты, вино, spirit. nitri dulcis нюхать.

Crocus—Aconit.

Cuprum—Belladonna.

Digitalis—Nux-vom., Op.

Drosera—камфора.

Dulcamara—Caffea, Kali carb.

Euphorbium—камфора, лимонъ, Opium.

Euphrasia—Belladonna, камфора.

Ferrum—Нер. sulph., магнитъ.

Gelseminium—можетъ-быть Belladonna.

Graphites—Nux-vom., Arsen., вино.

Helleborus—камфора, медъ съ уксусомъ.

Hepar sulphuris—Bellad., Pulsat.; противъ большихъ дозъ хлористый натръ, хлориновая известь, жирныя масла, уксусъ, растительныя кислоты.

Hyosciamus—уксусъ, лимонъ.

Jalappa—Иpecac? Rheum?

Ignatia—кофе.

- Jodium*—Merc., Arsen., Bell., Phosph., Camph.
Ipecacuanha—China, Arsen., Bell., Opium.
Kali carbonicum—Camph., Coff., Spir. nitri dulc.
 противъ большихъ приемовъ уксусъ, масло.
Kreosot—Ammon., Chlor. Уксусъ ожесточаетъ.
Lachesis—Arsen., Bellad., Phos.-ac.
Laurocerasus—Camph., Op., Coff., Ipecac.
Lycopodium—Camph., Coff.
Magnesia carbonica—Calc.-carb., Natr.-mur.
Mangauum aceticum—Coff., Merc.
Marum verum—Camph., Coff.
Mercurius—Nitr.-ac., Phosph.-ac., Aur.-mur., Bellad., Carbo-v., China, Jod., Hep.-s., N.-vom., Phosph., Plumb., Sulph., Silic.
Mezereum—Merc., Camph. кислоты.
Millefolium—Camph.
Moschus—Camph., Coff.
Muriatis acidum—Arsen., Camph., Nitr. spirit.
Nitri acidum—Camph., Hep. sulph., Sulph., Merc.? Jod.?
Nux moschata—Camph., тминъ.
Nux-vomica — кофе, вино, Opium., Bell., Puls.
 Coccul.
Opium—кофе съ лимономъ или уксусомъ, Assa foetida, Ipecac.
Petroleum—Cannabis, Nux-vom.
Phosphorus—вино, Nux-vom., Camph., Coff., Merc? Jod.?
Phosphori acidum—Camph., Coff.; противъ большихъ количествъ — известь или магнезія въ водѣ, бѣлокъ, молоко, развед. сѣрная кислота.

Platina — Spirit. nitri dulcis, Pulsat.

Plumbum — Sulph., Sulph.-ac., Hep.-sulph., Alumen,
и въ особ. Ор. и Nux-vom.; также лимонадь.

Pulsatilla — уксусъ, Chamom., Nux-vom.

Ranunculus bulbosus — Camph., Puls., Rhus. — Ви-
но, уксусъ, медъ и сахаръ ожесточаютъ.

Rheum — Camph., Cham., Nux-vom.

Rhododendron — Camph.; Rhus, Clematis.

Rhus — Bryon., Camph., Sulph., кофе.

Ruta — Camph.

Sabadilla — Camph.

Sabina — Camph., Opium.

Sambucus — Arsen., Camph.

Sassaparilla — Camph.

Secale cornutum — Camph., Opium.

Sepia — Spirit, nitri dulcis, винный уксусъ.

Silicea — Camph., Hep.-sulph.

Spigelia — Camph.

Spongia — Camph.

Stannum — Puls.

Staphysagria — Camph.

Stramonium — уксусъ, лимонъ, Nux-vom.

Sulphur — Aconit., Camph., China, Pulsat.

Sulphuris acidum — известь, магнезія въ водѣ, Puls.

Tabacum — Nux-vom.

Thuja — Chamom., Coccul., Merc.

Valeriana — Camph., Coff.

Veratrum — Camph., Coff., Brom.

Zincum — Camph., Hep., Sulph.

СПИСОКЪ ЛЕКАРСТВЪ

ПРЕДЛОЖЕННЫХЪ ВЪ ЭТОЙ КНИГѢ, СЪ ОБЪЯСНЕНІЕМЪ
СОКРАЩЕНІЙ (*).

Acon. 3. *Aconitum*, Аконить, Борецъ.

Aeth.-synar. 3. *Aethusa synapium*, Этуза цина-
піумъ, Зноуха.

Agaric. 3. *Agaricus muscarius*, Агарикусъ, Му-
хоморъ.

Agn.-cast. 3. *Agnus castus*, Агнусъ кастусъ,
Прутнякъ.

Anac. 3. *Anacardium*, Анакардіумъ, Слоновая
вошь.

Antim. 3. *Antimonium crudum*, Антимоній,
Сюрма.

Apis, 3. *Apis mellifera*, Аписъ, Пчелиный ядъ.

Arg. 3. *Argentum*, Аргентумъ, Серебро.

(*) Латинскія наименованія, прописанныя русскими бук-
вами, мы здѣсь выставляемъ вслѣдствіе многократныхъ тре-
бованій читателей. Всякій легко пойметъ, къ чему это при-
годно, но въ самой книгѣ, какъ нѣкоторые требуютъ, сдѣ-
лать этого невозможно: заняло бы слишкомъ много мѣста и
произвежо-бы испещреніе дикими словами.

- Arg.-nitr. 3. *Argentum nitricum*, Аргентумъ нитрикумъ, Ляписъ.
- Arn. 3. *Arnica*, Арника, Баранья трава.
- Ars. 6. *Arsenicum*, Арсеникъ, Мышьякъ.
- Artem. 3. *Artemisia vulg.* Артемизія, Чернобилъникъ.
- Aspar. 3. *Asparagus*, Аспарагусъ, Споржа.
- Atrop. 6. *Atropin*, Атропинъ.
- Aur.-m. 3. *Aurum muriaticum*, Аурумъ муріатикумъ, Солянокислѣе золото.
- Baryt.-m. 3. *Baryta muriatica*, Барита муріатика, Солянокислый баритъ.
- Bell. 3. *Belladonna*, Белладонна, Сонная одурь.
- Verb. 3. *Berberis*, Барборисъ.
- Bism. 3. *Bismuthum*, Бисмутъ.
- Bor. 3. *Borax*, Бораксъ, Бура.
- Bov. 3. *Bovista*, Бовиста Дождевикъ.
- Brom. 3. *Bromium*, Бромъ.
- Bry. 3. *Bryonia alba*, Бріонія, Переступень.
- Cact. 3. *Cactus grandiflora*, Кактусъ.
- Calc. 3. *Calcareea carbonica*, Калькарія карбоника, Улѣкислая извѣсть.
- Calc.-acet. 3. *Calcareea acetica*. Калькарія ацетика, Уксуснокислая извѣсть.
- Calc.-phos. 3. *Calcareea phosphorica*. Фосфорнокислая извѣсть.
- Camph. 3. *Camphora*, Камфора.
- Cann.-ind. 1. *Cannabis indica*, Каннабисъ индѣка, Конопля индѣйская.
- Canth. 6. *Cantharis*, Кантарисъ, Шпанская мушка.

- Caps. 6. *Capsicum*, Капсикумъ, Стручковый перецъ.
- Carb.-an. 3. *Carbo-animalis*, Карбо-анималисъ, Животный уголь.
- Carb.-v. 3. *Carbo vegetabilis*, Карбо вегетабилисъ, Растительный уголь.
- Caust. 9. *Causticum*, Каустикъ.
- Cham. 3. *Chamomilla*, Хамомила, Ромашка.
- Chel. 3. *Chelidonium*, Хелидоній, Чистотѣль.
- Chin. 3. *China*, Хина.
- Cic. 3. *Cicuta virosa*, Цикута, Омегъ.
- Cin. 1. *Cina*, Цина, Цыцваръ.
- Cinnab. 3. *Cinnabaris*, Киноварь.
- Clem. 3. *Clematis*, Клематисъ, Бородавникъ.
- Cocc. 3. *Cocculus*, Коккулусъ, Кукольвань.
- Coff. 2. *Coffea*, Кофе.
- Colch. 3. *Colchicum*, Кольхикъ, Зимовикъ.
- Coloc. 3. *Colocynthis*, Колоцинтъ.
- Con. 6. *Conium maculatum*, Коній, Омегъ большой.
- Cop. 3. *Copaiva balsamum*, Бальзамъ копаевый.
- Croc. 3. *Crocus*, Крокусъ, Шафранъ.
- Cupr.-ac. 3. *Cuprum aceticum*, Купрумъ, Мѣдь.
- Dig. 3. *Digitalis* Дигиталисъ, Наперсточная трава.
- Dros. 1. *Drosera*, Дрозера, Царевы очи.
- Dulc. 3. *Dulcamara*, Дулькамара, Насленъ.
- Euphorb. 3. *Euphorbium*, Евфорбія, Молочай.
- Euphr. 2. *Euphrasia*, Ефразія, Глазница.
- Ferr. 1. *Ferrum*, Феррумъ, Жѣлѣзо.
- Ferr.-m. 1. *Ferrum muriaticum*, Феррумъ муріатикумъ, Жѣлѣзо солянокислое.

- Fil. 1. *Filix mas*, Филіксъ, Папоротникъ.
 Fluor-ac. 6. *Acidum fluoricum*, Плавиковая кислота.
 Gelsem. 3. *Celseminum*, Гельземинъ, Желтый жасминъ.
 Glon. 6. *Glonoin*, Глоноинъ, Нитроглицеринъ.
 Graph. 3. *Graphites*, Графитъ.
 Hamam. 3. *Hamomelis virginica*, Хамамелисъ.
 Hell. 3. *Helleborus niger*, Геллеборусъ, Чемерица.
 Her. 2. *Hepar sulphuris calcareum*, Генаръ сульфурисъ, Сырная печень.
 Hydros.-ac. 6. *Acidum Hydrocyanicum*, Синильная кислота.
 Hyosc. 6. *Hyoscyamus niger*, Гіосціамусъ, Блѣна.
 Jalap. 3. *Jalappa*, Ялаппа.
 Ign. 3. *Ignatia amara*, Игнація.
 Jod. 3. *Jodium*, Іодъ.
 Ipec. 3. *Ipecacuanha*, Ипекакуана.
 Kali-bichr. 3. *Kali-bichromicum*, Кали бихромикумъ, Кислое хромокислое кали.
 Kali-carb. 3. *Kali-carbonicum*, Углекислое кали.
 Kali-chlor. 3. *Kali-chloricum*, Кали хлорикумъ, Хлорокислое кали.
 Kali-jod. 3. *Kali hydrjodicum*, Іодистый кали.
 Kreos. 6. *Kreosotum*, Креозотъ.
 Lach. 6. *Lachesis*, Лахезисъ, Змѣиный ядъ.
 Laur. 3. *Laurocerasus*, Лавроцеразусъ, Лавровишня.
 Led. 3. *Ledum palustre*, Баумъ.
 Lobel. 3. *Lobelia*, Лобелія.

- Лус. 3. *Luscorodium*, Ликоподій, Плаунъ.
 Magn.-с. 3. *Magnesia carbonica*, Магnezія.
 Mang.-ас. 3. *Manganum aceticum*, Манганумъ,
 Марганецъ.
 Mar.-ver. 3. *Marum verum*, Марумъ, Кошачья
 мята.
 Merc. 3. *Mercurius solubilis*, Меркуріусъ солю-
 бились, Ртуть растворимая.
 Merc.-cor. 3. *Mercurius corrosivus*, Меркуріусъ
 коррозивусъ, Сuleма.
 Merc.-bijod. 6. *Mercurius bijodatus*, Двуіодистая
 ртуть.
 Merc.-cyan. 3. *Mercurius cyanatus*. Цианистая
 ртуть.
 Merc.-dulg. 3. *Mercurius dulcis*, Каломель.
 Merc.-jod. 3. *Mercurius jodatus*, Іодистая ртуть.
 Merc. p. rub. 3. *Mercurius praecipitatus ruber*,
 Красная осадочная ртуть.
 Mez. 6. *Mezereum*, Мезереумъ, Волчье лыко.
 Millef. 1. *Millefolium*, Милльфолій, Тысячелистникъ
 Mosch. 2. *Moschus*, Мошусъ, Мускусъ.
 Mur.-ас. 3. *Muriatis acidum*, Ацидумъ муріати-
 кумъ, Соляная кислота.
 Natr.-m. 6. *Natrum muriaticum*, Натрумъ му-
 ріатикумъ, Поваренная соль.
 Nitr. 3. *Nitrum*, Нитрумъ, Селитра.
 Nitr.-ас. 3. *Nitri acidum*, Нитри ацидумъ,
 Азотная кислота.
 N.-mosch. 3. *Nux moschata*, Нуксъ мошата, Мус-
 катный орехъ.

N.-vom. 3 и 12. *Nux-vomica*, Нуксъ вомика,
Чилибуха.

Op. 3. *Opium*, Ошій.

Petr. 6. *Petroleum*, Петролеумъ, Нефть.

Petros. 3. *Petroselinum*, Петроселинумъ, Петрушка.

Phos. 2. *Phosphorus*, Фосфоръ.

Phos.-ac. 3. *Phosphori-acidum*, Фосфори ацидумъ, Фосфорная кислота.

Plat. 3. *Platina*, Платина.

Plumb. 3. *Plumbum aceticum*, Плумбумъ ацетикумъ, Уксуснокислый свинецъ.

Puls. 3. *Pulsatilla*, Пульсатилла, Вътренница.

Rana bufo 3. Рана буфо, Жабій ядъ.

Ran-bulb. 3. *Ranunculus bulbosus*, Ранункуль, Жабинецъ.

Rheum 3. *Rheum*, Реумъ, Ревень.

Rhod. 3. *Rhododendron*, Рододендронъ.

Rhus 3. *Rhus toxicodendron*, Русъ, Сумахъ.

Ruta 3. *Ruta graveolens*, Рута.

Sabad. 3. *Sabadilla*, Сабадилла.

Sabin. 3. *Sabina*, Сабина, Казацкій можжевельникъ.

Samb. 3. *Sambucus*, Самбукусъ, Бузина.

Sang. 3. *Sanguinaria*, Сангвинарія, Кротовикъ.

Sassap. 3. *Sassaparilla*, Сассанарель.

Sec-corn. 3. *Secale cornutum*, Секале корнутумъ, Спорынья.

Seneg. 1. *Senega*, Сенегъ.

Sep. 6. *Sepia*, Сепія.

Sil. 6. *Silicea*, Силицея, Кремнеземъ.

Spig. 3. *Spigelia*, Спигелія, Глистница.

Spong. 1. *Spongia*, Спонгія, Губка.

Stann. 3. *Stannum*, Станнумъ, Олово.

Staph. 6. *Staphysagria*, Стафисагрія, Соколка.

Stram. 6. *Stramonium*, Страмоніумъ, Дурманъ.

Stront. 3. *Strontiana*, Стронцій.

Sulph. 3 и 6. *Sulphur*, Сulfуръ, Сѣра.

Sulph.-ac. 3. *Sulphuris acidum*, Сulfурисъ аци-
думъ, Сѣрная кислота.

Symph. 3. *Symphitum*, Симфитумъ, Живокоствъ.

Tabac. 3. *Tabacum*, Табакъ.

Tart.-em. 3. *Tartarus emeticus*, Тартарусъ эме-
тикусъ, Рвотный камень.

Tereb. 3. *Terebenthina oleum*, Скипидаръ.

Therid. 3. *Theridion*, Теридіонъ.

Thuj. 3. *Thuja occidentalis*, Туя.

Uva ursi 3. Ува урсѣ, Толокнянникъ.

Valer. 3. *Valeriana*, Валеріана.

Veratr. 3. *Veratrum album*, Вератрумъ, Че-
мерица бѣлая.

Viol.-tric. 3. *Viola tricolor*, Віола триколовъ,
Троечный цвѣтъ.

Zinc. 3. *Zincum*, Цинкъ.

ПРЕПАРАТЫ

ГОМЕОПАТИЧЕСКИХЪ ЛЕКАРСТВЪ.

Гомеопатическія лекарства въ аптекахъ приготавливаются въ видѣ *порошковъ* (всѣ металлы, земли и нѣкоторыя растительныя и животныя вещества), *капель* или жидкости (всѣ растительныя вещества, начиная съ тинктуръ, легко растворимыя соли и щелочи и всѣ прочія лекарства, начиная съ тѣхъ дѣлений, въ которыхъ они становятся растворимыми въ алкогольъ) и въ видѣ *крупинокъ* или мелкихъ шариковъ.

Тинктуры изъ растительныхъ и другихъ удоборастворимыхъ веществъ приготавливаются на винномъ спиртѣ высшей очистки. Соли и щелочи, неудоборастворимыя въ спиртѣ, предварительно растворяются въ водѣ или въ спиртѣ, разбавленномъ водою. Изъ веществъ, въ грубомъ видѣ совершенно нерастворимыхъ, приготавливаются порошки посредствомъ *растиранія* съ молочнымъ сахаромъ. Эти порошки въ третьемъ дѣленіи, какъ бы твердо ни было вещество въ грубомъ видѣ, растворяются сперва въ водѣ или спиртѣ, разбавлен-

номъ водою и наконецъ въ чистомъ спиртѣ. Такимъ образомъ всѣ лекарства, не исключая металловъ, получаютъ въ разведеніяхъ (капляхъ) на спиртѣ, начиная съ 4—6 дѣленія. Крупинки приготавливаются смачиваніемъ молочно-сахарныхъ шариковъ готовыми разведеніями лекарствъ капельножидкаго вида.

Для растиранія и разведенія лекарствъ существуютъ двѣ пропорціи: *децимальная* (десятичная) и *центимальная* (сотенная). Для первой берется одинъ гранъ сухаго вещества на 9 грановъ молочнаго сахару (или 1 капля крѣпкой тинктуры на 9 капель чистаго спирта), что даетъ первое десятичное дѣленіе (или разведеніе) X. 1. Одинъ гранъ или капля перваго дѣленія на 9 гр. сахару или капель спирта даетъ второе дѣленіе, X. 2. Одинъ гранъ или капля втораго дѣленія на 9 гр. сахару или капель спирта, даетъ третье децимальное дѣленіе, X. 3. и т. д.

По второй пропорціи берется 1 гр. вещества или капля тинктуры на 99 гр. сахару или капель спирта, и разведенія въ томъ же порядкѣ приготавливаются до тридцатаго. Самая употребительная — сотенная пропорція. Десятичныя дѣленія приготавливаются обыкновенно только до 6-го, потому что второе десятичное уже равняется 1-му сотенному, четвертое 2-му сотенному, шестое 3-му сотенному. Приготовление растворовъ солей зависитъ отъ тѣхъ, каждому веществу особо свойственныхъ, пропорцій, въ какихъ они насыщаютъ

воду безъ остатка, а потому въ первомъ дѣленіи этихъ прицаратовъ не всегда возможно удержать децимальную или центимальную пропорцію. Напримѣръ, поваренная соль растворяется въ тройномъ количествѣ воды, а квасцы въ пропорціи 1:19 (почти 5 на 95), слѣдовательно первое дѣленіе квасцовъ и представляетъ именно эту пропорцію, а не 0,1 и не $\frac{1}{100}$. Последнее, впрочемъ, приблизительно получится, когда будетъ взято 5 капель перваго воднаго раствора на 90 капель спирту.

Когда прописываютъ лекарство первыхъ дѣлений въ порошокъ, то отмѣчаютъ знакомъ *trit.* (растираніе) или *pulv.* (порошокъ). Капли обозначаются знакомъ *dilut.* (раств.) или *gtt.* (капли); крупинки знакомъ *glob.* (крупинки).

Въ нижеслѣдующемъ спискѣ показаны первые препараты всѣхъ лекарствъ и отмѣчены тѣ виды или дѣленія, въ которыхъ лекарство, по причинѣ легкаго измѣненія, бываютъ ненадежны. Вещества, въ первыхъ дѣленіяхъ трудно и недолго сохраняющіяся, въ дальнѣйшихъ дѣленіяхъ или разведеніяхъ на спиртъ, сохраняются долѣе. Если же такія лекарства требуются непременно первыхъ дѣлений, то они должны быть употреблены въ свѣжемъ видѣ, тотчасъ по приготовленіи.

Лекарства, получаемыя посредствомъ тинктуръ и растворовъ, имѣются въ видѣ капель, а также и въ видѣ крупинокъ всѣхъ дѣлений, начиная съ 1-го.

Получаемыя черезъ тритурацію, имѣются пер-

выхъ дѣленій только въ видѣ порошка; въ жидкомъ видѣ, начиная съ 4-го дѣленія, а въ крупинкахъ съ 5 и 6 дѣленія.

Употребительныя сотенныя дѣленія лекарствъ 1, 2, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 24, 30 Ганеманъ обозначалъ

3-е знакомъ $\overline{\text{I}}$ (милліонное).

6-е » $\overline{\text{II}}$ (билліонное).

9-е » $\overline{\text{III}}$ (триллионное).

12-е » $\overline{\text{IV}}$ (квадриллионное).

15-е » $\overline{\text{V}}$ (квинтиллионное).

18-е » $\overline{\text{VI}}$ (секстиллионное).

24-е » $\overline{\text{VIII}}$ (октиллионное).

30-е » $\overline{\text{X}}$ (дециллионное).

На пріемъ всегда полагается одна капля жидкости или одинъ гранъ порошка. (Для порошковъ имѣется костяная ложечка приблизительно въ одинъ гранъ вмѣстимости). Только низшихъ дѣленій (1: 2) и децимальныхъ въ жидкомъ видѣ иногда назначаютъ по 2—3 капли на пріемъ.

Крупинки мелкія назначаются обыкновенно до 5 штукъ на пріемъ.

Absynthium — тинктура (и разведенія на спиртъ, какъ всѣ тинктуры).

Acalypha indica — тинктура.

Achillea eupatoria — тинктура.

Aconitum — тинктура.

Actea racemosa — тинктура.

Actea spicata — тинктура.

Aethusa synapium — тинктура.

Agaricus muscarius — тинктура.

- Agave americana*—тинктура.
Agnus castus—тинктура.
Alisma plantago—тинктура.
Allium cepa—тинктура.
Allium sativum—тинктура.
Aloe saccotrina—тинктура.
Alumen—водный растворъ въ пропорціи и затѣмъ дальнѣйшія разведенія на спиртѣ. Могутъ быть приготовлены и растиранія въ порошокѣ..
Alumina—первыя 3 растиранія въ порошокѣ.
Ambra grisea—первыя 3 растиранія въ порошокѣ
Amygdales amarae—тоже.
Ammonium carbonicum—первый растворъ въ водѣ (1:9), разведенія на спиртѣ.
Ammonium causticum—разведенія на спиртѣ.
Первое не долго сохраняется.
Ammonium muriaticum—водный растворъ (1:9) и разведенія на спиртѣ.
Ammonium phosphoricum—тоже.
Anacardium—тинктура.
Anagallis—тинктура.
Androsace lactea—тинктура.
Angustura—тинктура.
Anisum stellatum—тинктура.
Anthrakali—первыя 3 растиранія въ порошокѣ.
Antimonium crudum—тоже.
Antimonium sulphuratum—тоже.
Apis mellifera—тинктура.
Apocynum androsemitifolium—тинктура.
Apocynum cannabinum—тинктура.

Aquilegia—тинктура.

Aranea diadema—тинктура.

Argentum—первыя 3 растиранія въ порошокъ.

Argentum nitricum—растворъ въ водѣ (5:95) и разведенія на спиртѣ. По причинѣ быстраго измѣненія этой соли на воздухѣ растиранія не годятся.

Aristolochia clematitis—тинктура.

Armoracia rusticana—тинктура.

Arnica—тинктура.

Arsenicum—растворъ въ водѣ (1:99) и разведенія на спиртѣ. Могутъ быть приготовлены и растиранія. Въмѣсто *Arsen.* на рецептахъ это вещество иногда обозначается другими синонимами, напр. *Metall. alb.*

Arsenicum hydrogenisatum—тинктурѣ равняется насыщенная газомъ вода; разведенія на спиртѣ. Быстро измѣняется.

Artemisia vulgaris—тинктура.

Arum maculatum—тинктура.

Arum (Caladium) seguinum—тинктура.

Arundo mauritanica—тинктура.

Asa foetida—тинктура.

Asarum europaeum—тинктура.

Asclepias tuberosum—тинктура.

Asparagus—тинктура.

Astacus fluviatilis—тинктура.

Asterias rubens—первыя 3 растиранія въ порошокъ.

Athamanta oreoselinum—тинктура.

Atropinum sulphuricum — первыя 3 растиранія въ порошокъ, а также въ растворъ. Третье дѣйствіе дѣйствуетъ очень сильно, можетъ вызвать лекарственные припадки и потому безъ крайней нужды не должно быть назначаемо.

Aurum foliatum — первыя 3 растиранія въ порошокъ.

Aurum muriaticum — растворъ.

Aurum natronatum — тоже. Растираніе очень скоро разлагается.

Aurum sulphuricum — первыя 3 растиранія въ порошокъ.

Badiaga — тинктура. Могутъ быть приготовлены и растиранія.

Baptisia tinctoria — тинктура.

Baryta acetica — растворъ въ 1 ч. спирта на 3 ч. воды и затѣмъ разведенія на спиртъ.

Baryta carbonica — первыя 3 растиранія въ порошокъ.

Baryta muriatica — растворъ.

Belladonna — тинктура.

Benzois acidum — растворъ.

Berberis — тинктура.

Betula alba — тинктура.

Bismuthum — первыя 3 растиранія въ порошокъ (скоро измѣняются).

Borax — первыя 3 растиранія въ порошокъ. Въ водѣ растворяется.

Bovista — тинктура. Приготавливаются также растиранія въ порошокъ.

Branca ursina—тинктура.

Brayera anthelmintica (kusso)—тинктура.

Bromium — водный растворъ. Первые дѣленія быстро разлагаются.

Bromuretum hydrargiri—водный растворъ и разведенія на спиртѣ.

Bryonia—тинктура.

Bufo—тинктура.

Bursa pastoris—тинктура.

Bunafa—тинктура.

Cactus—тинктура.

Cadmium sulphuricum—растворъ, а также первые 3 растиранія въ порошокъ.

Cainca—тинктура.

Calcareæ aceticæ—растворъ, а также первые 3 растиранія въ порошокъ.

Calcareæ carbonicæ—первые 3 растиранія въ порошокъ.

Calcareæ causticæ — тинктура на 1 ч. спирта и 3 ч. воды и разведенія на спиртѣ. Первые разведенія быстро измѣняются.

Calcareæ iodatæ—водный растворъ и разведенія на спиртѣ. Легко разлагается. Растиранія вовсе не годятся.

Calcareæ phosphoricæ—первые 3 растиранія въ порошокъ.

Calendula—тинктура.

Camphora—тинктура.

Cannabis sativa. et indica—тинктура.

Cantharis—тинктура.

Capsicum—тинктура.

Carbo animalis—первыя 3 растиранія въ порошокъ.

Carbo vegetabilis—тоже.

Carduus benedictus—тинктура.

Carduus marianus—тинктура.

Cascarilla—тинктура.

Castor equi—первыя 3 растиранія въ порошокъ.

Castoreum—тинктура.

Causticum—первое разведеніе на разбавленномъ водою, дальнѣйшія на чистомъ спиртѣ.

Cedron—тинктура.

Cerasus—тинктура.

Chamomilla—тинктура.

Chelidonium—тинктура.

Chenopodium—тинктура.

China—тинктура.

Chininum sulphuricum—растворъ, а также первыя 3 растиранія въ порошокъ.

Chininum hydrocyanicum—тоже.

Chininum muriaticum—тоже.

Chininum arsenicosum—тоже.

Chininum phosphoricum—тоже.

Chloroformium—разведенія на спиртѣ.

Chlorum—насыщенная газомъ вода; первыя три разведенія на водѣ, дальнѣйшія на спиртѣ.
Первыя быстро измѣняются.

Cicuta virosa—тинктура.

Cimex—первыя 3 растиранія въ порошокъ.

Cina—тинктура.

Cinchoninum sulphuricum—первыя 3 растиранія въ порошокѣ.

Cinnabaris—тоже.

Cistus canadensis—тинктура.

Clematis—тинктура.

Clematis vitalba—тинктура.

Coca—тинктура.

Coccionella—тинктура.

Cocculus—тинктура.

Coccus cacti—тинктура.

Cochlearia—тинктура.

Codein—растиранія въ порошокѣ.

Coffea—тинктура.

Colchicum—тинктура.

Colocynthis—тинктура.

Conium—тинктура.

Convallaria majalis—тинктура.

Copaivae balsamum—разведенія на спиртѣ.

Corallium rubrum—первыя 3 растиранія въ порошокѣ.

Cornus circinata—тинктура.

Cotyledon umbilicus—тинктура.

Crocus—тинктура.

Crotalus horridus—первыя 3 раст. въ порошокѣ.

Croton tiglium—тинктура.

Cubeba—тинктура.

Cuprum metallicum—первыя 3 растиранія въ порошокѣ.

Cuprum aceticum—водный растворъ и разведенія на спиртѣ).

Cuprum arsenicosum—первыя 3 растиранія въ порошокъ.

Cuprum carbonicum—тоже.

Cuprum sulphuricum—водный растворъ (1: 10) и разведеніе на спиртъ.

Curare—первыя 3 растиранія. въ порошокъ.

Cyclamen—тинктура.

Cynoglossum—тинктура.

Daphne indica—тинктура.

Dictamnus—тинктура.

Digitalis—тинктура.

Drosera—тинктура.

Dulcamara—тинктура.

Elaps corallinus—первыя 3 растир. въ порошокъ.

Equisetum—тинктура.

Ergotin—растворъ и разводъ на спиртъ.

Encalptus globulus—тинктура.

Eugenia jambos—тинктура.

Euphorbium—тинктура.

Euphrasia—тинктура.

Evouymus—тинктура.

Fel tauri—растворъ.

Ferrum metallicum—первыя 3 растиранія въ порошокъ.

Ferrum aceticum—получается въ видѣ жидкости, которой берется 1 ч. на 1½ ч. водою разбавленнаго спирта для образованія *Tinct. ferri acetici*, и дальнѣйшія разведенія на спиртъ. Первоначальная жидкость также выпаривается до-суха для приготовленія растираній.

Ferrum iodatum—растворъ въ спиртъ.

- Ferrum magneticum*—3 растиранія въ птросеѣ.
Ferrum muriaticum—растворъ въ слабомъ спир-
тѣ и разведенія.
Ferrum sulphuricum—водный растворъ (скоро
измѣняющійся) и разведенія на спиртѣ.
Elix mas—тинктура.
Fluoris asidum—растворъ 1 оѣленія въ водѣ,
2 въ спиртѣ съ водою, 3 и далѣе на спиртѣ
Formica—тинктура.
Fragra—тинктура.
Fucus vesiculosus—тинктура.
Fumaria officinalis—тинктура.
Gelseminium—тинктура.
Genista—тинктура,
Gentiana—тинктура.
Geranium robertianum—тинктура.
Ginseng—тинктура.
Glechoma hederacea—тинктура.
Glonoinum—растворъ.
Granatum—тинктура.
Graphites—первыя 3 растиранія въ порошокъ
Guaco—тинктура.
Guajacum—тинктура.
Guaraea—тинктура.
Gummi ammoniacum—тинктура.
Gummi gutti—тинктура.
Haematoxylum—тинктура.
Hamamelis—тинктура.
Hecla lava—растиранія.
Helianthus—тинктура.

Heliotropium—тинктура.

Helleborus—тинктура.

Hepar sulphuris calcareum—первыя 3 растира-
нія въ порошокъ. Можетъ быть приготовлена
также тинктура на разбавленномъ водою спир-
тѣ; послѣдняя скоро измѣняется.

Hepar sulphuris kaline—тоже.

Hippomanes—тинктура.

Hippocastanum—тинктура.

Humulus—тинктура.

Hura brasiliensis—тинктура.

Hydrastis canadensis—тинктура.

Hydrocotyle asiatica—тинктура.

Hydrocyanicum acidum—водный, перегонкою по-
лучаемый, легко измѣняющійся растворъ и
разведеніе на спиртѣ.

Huoscyanus—тинктура.

Hypericum—тинктура.

Jacaranda caroba—тинктура.

Jalappa—тинктура.

Jatropha—тинктура.

Iberis amara—тинктура.

Ignatia—тинктура.

Imperatoria—тинктура.

Indigo—тинктура.

Iodium—тинктура.

Ipecacuanha—тинктура.

Iris—тинктура.

Juglans regia—тинктура.

Juncus effusus—тинктура.

- Juniperus communis*—тинктура.
Kali arsenicosum—растворъ.
Kali bioxalicum—тоже.
Kali bichromicum—водный растворъ (5:95, первое дѣленіе на водѣ, 2 и 3 на спиртѣ съ водою, дальнѣйшія на спиртѣ).
Kali bromatum—тоже.
Kali carbonicum—тоже.
Kali chloricum—тоже.
Kali hydrjodicum—тоже.
Kalmia—тинктура.
Kobaltum—первыя 3 растиранія въ порошокъ.
Kreosotum—тинктура.
Lacerta agilis—тоже.
Lachesis—третье растираніе въ порошокъ.
Lactuca—тинктура.
Lamium—тинктура.
Lapis albus—растираніе.
Laurocerasus—тинктура.
Ledum—тинктура.
Lepidium—тинктура.
Leptandria—тинктура.
Limulus—тинктура.
Linaria—тинктура.
Linum catharticum—тинктура.
Lithium carbonicum—первыя 3 растиранія въ порошокъ.
Lobelia—тинктура.
Lolium—тинктура.
Lonicera—тинктура.

Lycopodium—тинктура, а также первыя растиранія въ порошокъ.

Magnesia carbonica — первыя 3 растиранія въ порошокъ.

Magnesia sulphurica — водный растворъ и разведенія на спиртъ.

Manicella—тинктура.

Manganum aceticum—водный растворъ и разведение на спиртъ.

Manganum muriaticum—тоже.

Manganum sulphuricum—тоже.

Marum verum (*Teucrium*)—тинктура.

Matico—тинктура.

Mentha piperita—тинктура.

Menyanthes trifoliata—тинктура.

Mephitis putorius—тинктура.

Mercurialis perennis—тинктура.

Mercurius acetatus—первыя 3 раст. въ порошокъ.

Mercurius bijodatus—тоже.

Mercurius corrosivus—растворъ въ слабомъ спиртъ (1:19) и разведенія, а также первыя растиранія въ порошокъ.

Mercurius dulcis (*Calomel*)—первыя 3 растиранія въ порошокъ.

Mercurius nitrosus — водный растворъ и разведенія на спиртъ. Легко разлагается.

Mercurius phosphoricus — первыя 3 растиранія въ порошокъ.

Mercurius praecipitatus albus—первыя 3 растиранія въ порошокъ.

- Mercurius praecipitatus ruber*—тоже.
Mercurius protojodatus—тоже.
Mercurius solubilis Н.—тоже.
Mercurius vivus—тоже.
Mezereum—тинктура.
Millefolium—тинктура.
Mimulus moschatus—тинктура.
Morphium—первыя 3 растиранія въ порошокѣ.
Morphium aceticum—3 растиранія въ порошокѣ, а также водный растворъ и разведенія на спиртѣ.
Morphium muriaticum—тоже.
Morphium sulphuricum—тоже.
Moschus—тинктура. Приготавливаются также растиранія въ порошокѣ.
Murex purpurea—первыя 3 растиранія въ порошокѣ.
Muriaticum acidum—водный растворъ и разведенія на спиртѣ.
Myrtus communis—тинктура.
Naja tripudians—растиранія въ порошокѣ.
Narcotin—растиранія въ порошокѣ, а также водный растворъ и разведенія на спиртѣ.
Natrum carbonicum—водный растворъ (1:10) и разведенія на спиртѣ. Приготавливаются также растиранія въ порошокѣ.
Natrum muriaticum—тоже.
Natrum nitricum—тоже.
Natrum sulphuratum—растворъ въ разбавленномъ спиртѣ (скоро измѣняющійся) и разведенія на спиртѣ.

Natrum sulphuricum—водный растворъ и разведенія на спиртѣ.

Niccolum carbonicum—первыя 3 растиранія въ порошокѣ.

Nicotinum—растворъ и разведенія на спиртѣ.

Nitrum—водный растворъ и разведенія на спиртѣ.

Nitri acidum—первое разведеніе на водѣ, послѣдующія на спиртѣ.

Nux. mochatata—тинктура.

Nux. vomica—тинктура.

Nymphaea alba—тинктура.

Oenanthe тинктура.

Oleander—тинктура.

Oleum animale—растворъ въ спиртѣ.

Oleum jecoris aselli—растиранія въ порошокѣ, преимущественно децимальныя.

Oniscus asellus—тинктура.

Opium—тинктура.

Osmium—первыя 3 растиранія въ порошокѣ.

Oxalicum acidum—растворъ въ спиртѣ съ водою и разведенія на спиртѣ.

Raeonia—тинктура.

Palladium—первыя 3 растиранія въ порошокѣ.

Pareira brava—тинктура.

Paris quadrifolia—тинктура.

Paulinia pinnata—тинктура.

Pediculus capitis—первыя 3 растиранія въ порошокѣ.

Petroleum—спиртнѣй растворъ и разведенія.

Petroselinum—тинктура.

- Phellandrium—тинктура.
Phosphorus—тинктура.
Phosphori acidum—растворъ въ спиртѣ съ водою и разведенія на спиртѣ.
Phytolacca decandra—тинктура.
Pimpinella saxifraga—тинктура.
Pinus sylvestris—тинктура.
Piper nigrum—тинктура.
Platina—первыя 3 растиранія въ порошокѣ.
Plumbum—первыя 3 растиранія въ порошокѣ.
Plumbum aceticum—водный растворъ и разведеніе на спиртѣ.
Podophillum peltatum—тинктура.
Pothos foetidus—тинктура.
Prunus padus—тинктура.
Prunus spinosa—тинктура.
Pyretrum—тинктура.
Pyrolignosum acidum—водный растворъ.
Pulsatilla—тинктура.
Quassia—тинктура.
Ranunculus bulbosus—тинктура.
Ranunculus sceleratus—тинктура.
Raphanus sativus—тинктура.
Rathania—тинктура.
Rhamnus frangula—тинктура.
Rheum—тинктура.
Rhododendron—тинктура.
Rhus radicans—тинктура.
Rhus toxicodendron—тинктура.
Rhus venenata—тинктура.

- Rumex crispus*—тинктура.
Ruta—тинктура.
Sabadilla—тинктура.
Salamandra maculata—тинктура.
Sabina—тинктура.
Sambucus—тинктура.
Sanguinaria canadensis—тинктура.
Sarracenia purpurea—тинктура.
Sassaparilla—тинктура.
Scilla—тинктура.
Scrofularia nodosa—тинктура.
Secale cornutum—тинктура.
Selenium—первыя 3 растиранія въ порошокъ.
Senega—тинктура.
Senna—тинктура.
Sepia—первыя 3 растиранія въ порошокъ. Приготавливается также тинктура.
Serpentaria—тинктура.
Silicea—первыя 3 растиранія въ порошокъ. Приготавливается также водный растворъ подъ названіемъ *Aqua silicata*.
Sinapis—тинктура.
Solanum lycopersicum—тинктура.
Solanum nigrum—тинктура.
Spigelia—тинктура.
Spirea ulmaria—тинктура.
Spiranthes—тинктура.
Spongia—тинктура, а также первыя 3 растиранія въ порошокъ.
Stannum—первыя 3 растиранія въ порошокъ.

Stannum muriaticum—водный растворъ.

Staphisagria—тинктура.

Stramonium—тинктура.

Strontiana carbonica—первыя 3 растиранія въ порошокъ.

Strychninum—первыя 3 растиранія въ порошокъ.

Первыя дѣленія безъ крайней нужды не употребляются.

Sulphur—первыя 3 растиранія въ порошокъ. Приготавливается также тинктура.

Sulphuris acidum—водный растворъ и разведеніе на спиртъ.

Sumbul—тинктура.

Symphitum—тинктура.

Tabacum—тинктура.

Tanacetum—тинктура.

Tarantula—тинктура и первыя 3 растиранія въ порошокъ.

Taraxacum—тинктура.

Tartarus emeticus—водный растворъ и первыя 3 растиранія въ порошокъ.

Taxus baccata—тинктура.

Telephium—тинктура.

Tellurium—первыя 3 растиранія въ порошокъ.

Terebinthinae oleum—растворъ и разведеніе на спиртъ.

Thea—тинктура.

Theridion—тинктура.

Thuja—тинктура.

Tilia—тинктура.

Tongo—тинктура.

Tussilago—тинктура.

Upas tieute—тинктура.

Uranium nitricum—первыя 3 растиранія въ порошокъ.

Urtica urens—тинктура.

Uva ursi—тинктура.

Valeriana—тинктура.

Veratrum—тинктура.

Veratrum viride—тинктура.

Veratrinum—первыя 3 растиранія въ порошокъ.

Verbascum—тинктура.

Viburnum opulus—тинктура.

Vinca minor—тинктура.

Viola odorata—тинктура.

Viola tricolor—тинктура и растиранія порошокъ.

Vipera berus—тинктура.

Xanthium spinosum—тинктура.

Zincum metallicum—первыя 3 растиранія въ порошокъ.

Zincum aceticum—растворъ.

Zincum hydrocyanicum—растиранія въ порошокъ.

Zincum muriaticum—растворъ.

Zincum oxydatum—растиранія.

Zincum sulphuricum—растворъ.

Zingiber—тинктура.

Zizia aurea—тинктура.

ISOPATHICA.

Anhrakinum—тинктура.

Ascaridinum—растиранія въ порошокѣ.

Carcinominum—тоже.

Hydrophobinum—тинктура.

Odontonecrosinum—тоже.

Psoricum—тоже.

Sulphilinum—тоже.

Vaccininum—тоже.

Variolinum—тоже.

СОСТАВЪ АПТЕЧЕКЪ

- a) *Въ 24 лекарства:* Acon., Apis., Arnic., Ars., Bell., Bry., Calc., Cham., Chin., Cin., Coff., Dros., Duls., Hep., Ipec., Merc., N.-vom., Phos., Pulsat., Rhus., Spig., Spong., Sulph., Veratr., (Цѣна 6 руб).
- b) *Въ 40 лекарствъ:* Acon., Antim., Apis., Arn., Ars., Baryt.-m., Bellad., Bry., Calc.-carb., Canth., Carb.-v., Cham., Chin., Cin., Cocc., Coff., Coloc., Cupr.-ac., Dros., Dulc., Euphr., Merc.-corr., Merc.-cyan., Graph., Hep., Hyosc., Ign., Ipec., Creos., Merc., N.-vom., Phosph., Puls., Rhus., Secale.-corn., Sep., Sil., Spig., Spong., Sulph., Veratr. (Цѣна 10 руб).
- c) *Въ 60 лекарствъ:* Acon., Antim., Apis., Arn., Ars., Aur.-mur., Bar-mur., Bell., Bry., Cact., Calc., Calc.-ac., Cann.-ind., Canth., Caps., Carb.-veg., Caust., Cham., Chin., Cin., Cocc., Coff., Colch., Coloc., Con., Cupr.-ac., Digit., Dros., Dule., Euphr., Ferr.-met., Gelsem., Graph., Hep., Hyosc., Ign., Jod., Ipec., Kali-c., Kreos., Lach., Lyc., Merc., Merc.-corros., Merc.-cyon., Nitr.-ac., N.-vom., Op., Phos., Phosph.-ac., Plat., Puls., Rhus., Secal.-corn., Sep., Sil., Spig., Spong., Staph., Sulph. Tart.-em., Thuj., Veratr., (Цѣна 15 руб).

d) Въ 80 лекарствъ: Acon., Ant., Apis., Arn., Ars., Aur-mur., Bar-m., Bell., Bry., Cactus, Calc., Calc.-ac., Cann., Canth., Caps., Carb.-veg., Caust., Cham., Chin, Cin., Clem., Cocc., Coff., Colch., Coloc., Con., Cupr.-ac., Dig., Dros., Dulc., Euph., Ferr.-m., Gelsem., Glonoin, Graph., Helleb., Hep., Hyosc., Ign., Jod., Ipec., Kali.-buchr., Kali-carb., Kali-jod., Kreos., Lach., Lyc., Merc., Mer-cor., Merc.-cyan., Mez., Natr.-m., Nitr.-ac., N-vom, Op., Petr., Phosph., Phosph.-ac., Plat., Puls., Rheum., Rhod., Rhus, Sabin., Seneg., Sec-corn., Sep., Sil., Spig., Spong., Stann., Staph., Sulph., Sulph.-ac., Tart-m., Thuj., Uva ursi, Valer., Veratr., Zinc., (Цѣна 20 руб).

e) Полный составъ по списку лекарствъ, цѣна 33 руб.

КАТАЛОГЪ

ГОМЕОПАТИЧЕСКИХЪ КНИГЪ.

Аппельтъ. Арника. Руководство къ употребленію оной внутрь и снаружи по правиламъ гомеопатіи. Переводъ съ нѣмецкаго. Москва, 1856. Цѣна 30 к., съ пересылкою 35 к.

Альтшуль. Гомеопатическій домашній и дорожный альманахъ. Переводъ съ нѣмецкаго, съ прибавленіями *В. Бримера*. Москва. Цѣна 1 р. за пересылку 20 к.

— Гомеопатическій зубной врачъ. Переводъ съ нѣмецкаго. Москва, 1857. Цѣна 50 к., за пересылку 25 к.

Алфавитъ болѣзней, съ назначеніемъ лекарствъ противъ нихъ по гомеопатической методѣ. Составленъ по послѣднимъ, лучшимъ гомеопатическимъ сочиненіямъ и по собственнымъ, долговременнымъ наблюденіямъ, практикующимъ врачомъ. Москва, 1855. Цѣна 1 р. 50 к., за пересылку 25 к.

Боянусъ. Опытъ приложенія гомеопатіи къ хирургіи. Нижний-Новгородъ, 1861. Пояснительные рисунки къ опыту приложенія гомеопатіи къ хирургіи. Цѣна книги съ рисунками 2 р. 50 к., съ пересылкою 3 р.; одной книги безъ рисунковъ 1 р. 50 к., съ пересылкою 2 р.

Брукнеръ. Карманный гомеопатическій лечеб-

никъ. Переводъ съ нѣмецкаго. Москва, 1864. Цѣна 50 к., съ пересылкою 60 к.

Бурачекъ. Человѣческій организмъ, да и вся природа, есть гомеопатическая лабораторія жизненныхъ производствъ. 1869. Цѣна 1 р., съ пересылкою.

Бухнеръ. Возвратная горячка, предохранительныя мѣры противъ нея и леченіе. Составлено для врачей и неврачей. Переводъ съ 2-го дополненнаго нѣмецкаго изданія. Москва, 1865. Цѣна 25 к., съ пересылкою 30 к.

Бѣлявскій. Вѣрный способъ леченія женскихъ и дѣтскихъ болѣзней по методу Ганемана, составленный для чадолюбивыхъ матерей, изъ новѣйшихъ гомеопатическихъ сочиненій и практическихъ наблюденій. Москва, 1836. Цѣна 1 р. 43 к., за пересылку 25 к.

Вальзеръ. Что такое аллопатія и что гомеопатія. Публичная лекція, читанная 22 февраля 1871 г. въ залѣ музея въ Штутгартѣ. Переводъ съ нѣмецкаго. *К. Боянусъ.* Москва, 1875. Цѣна 25 к.

Гартлаубъ. Искусство сохранить здоровье и достигнуть глубокой старости, практически изложенное по правиламъ и новѣйшимъ опытамъ гомеопатическаго врачебнаго искусства. Переводъ со втораго нѣмецкаго изданія. Москва, 1836. Цѣна 90 к., за пересылку 25 к.

Гартлаубъ. Краткое изложеніе гомеопатическаго способа леченія для неврачей. Переводъ съ нѣмецкаго. Москва, 1834. Цѣна 30 к., съ пересылкою 40 к.

Гартманъ. Дѣтскія болѣзни и ихъ леченіе по правиламъ гомеопатіи. Переводъ съ нѣмецкаго. Москва, 1855. Цѣна 2 р., на пересылку за 4 фунта.

— Специальная терапія острыхъ и хроническихъ болѣзней, изложенныхъ по правиламъ гомеопатіи, въ двухъ частяхъ и четырехъ томахъ. Переводъ съ третьяго нѣмецкаго изданія. Москва, 1854. Цѣна 5 р., на пересылку за 7 фунтовъ.

Гезенъ. Гдѣ больше раціональности, въ аллопатіи или въ гомеопатіи. С.-Петербургъ, 1865. Цѣна 30 к., съ пересылкою 40 к.

Гергардтъ. Практическое руководство къ гомеопатической медицинѣ. Переводъ съ нѣмецкаго. Москва, 1859. Цѣна съ пересылкою 3 рубля.

Герингъ. Домашній врачъ-гомеопатъ. Дополненный докторами: Гуллономъ, Гроссомъ и Штапфомъ. Третье дополненное русское изданіе. Москва, 1858. Цѣна 2 р. 30 к., за пересылку 30 к.

Гиршель. Домашній гомеопатическій лечебникъ. Съ приложеніемъ Характеристики наиболѣе употребляемыхъ гомеопатическихъ лекарствъ. Переводъ съ 3-го нѣмецкаго изда-

нія. Москва, 1862. Цѣна 2 р. 50 к., съ пересылкою 3 р.

Гиршель. Характеристика гомеопатическихъ лекарствъ, или очеркъ дѣйствій наиболѣе употребляемыхъ и новѣйшихъ гомеопатическихъ медикаментовъ. Извлеченіе изъ лечебника. Москва, 1862. Цѣна 75 к., за пересылку 25 к.

Гомеопатическій сборникъ, три книжки. Цѣна каждой 1 р. За пересылку 1 книжки 20 к., выписывающіе всѣ три книжки, прилагаютъ на пересылку 40 к.

Грауфогль. Гомеопатическій законъ подобія. Открытое посланіе къ г. профессору д-ру барону Юстусу фонъ-Либиху, съ примѣчаніями переводчика. С.-Петербургъ, 1862. Цѣна 75 к., за пересылку 25 к.

Гроссъ. Содержаніе матери и младенца отъ мгновенія зачатія до того времени, когда она сего послѣдняго отниметъ отъ груди, въ діететическомъ и врачебномъ отношеніи. Карманная книжка для новобрачныхъ. Переводъ съ нѣмецкаго. Москва, 1836. Цѣна 75 к., за пересылку 25 к.

Гуллонъ. Болѣзни малолѣтнихъ дѣтей и Гомеопатическое ихъ леченіе. Переводъ съ нѣмецкаго. Съ приложеніями. Изданіе Флемминга. С.-Петербургъ, 1873. Цѣна 1 р.; въ красивомъ переплетѣ 1 р. 50 к.

Гюнтеръ. Дѣтя въ здоровомъ и болѣзненномъ

состояніи, или правила физическаго воспитанія дѣтей и краткій гомеопатическій лечебникъ дѣтскихъ болѣзней. Переводъ съ нѣмецкаго. Москва, 1856. Цѣна 1 р. 50 к., за пересылку 25 к.

Гюнтеръ. Женскія болѣзни и ихъ леченіе по правиламъ гомеопатіи, съ прибавленіемъ календаря беременности. Москва, Цѣна 1 р., съ пересылкою 1 р. 20 к.

— Гомеопатическій ветеринарный врачъ. 2 части, переводъ съ 10-го нѣмецкаго изданія. Второе дополненное русское изданіе. Часть первая: о болѣзняхъ лошадей; часть вторая: о болѣзняхъ рогатаго скота, овецъ, свиней, козъ и собакъ. Москва, 1867. Цѣна 2 р. 50 к., съ пересылкою 3 р. Аптека съ болѣе употребительными лекарствами 20 р., полная по этому лечебнику 30 р. съ пересылкой, кромѣ лечебника.

Дерикеръ. Гомеопатическая фармакологія, полный сводъ всѣхъ до-сихъ-поръ изслѣдованныхъ лекарствъ, съ присоединеніемъ данныхъ патологической анатоміи и съ терапевтическими указаніями. Изданіе Ф. Флемминга. Четыре части, 120 листовъ печати, 1920 страницъ. С.-Петербургъ, 1867—1869. Цѣна 10 р. с., на пересылку прилагается за 6 фунтовъ.

— Что производитъ хина и можетъ-ли она отравлять? Справка гомеопата о мнѣ-

ніяхъ и наблюденіяхъ аллопатовъ. С.-Петербургъ, 1862. Цѣна 20 к., съ пересылкою 30 к.

Дерикеръ. Физиологическая исторія женщины, сохраненіе здоровья и красоты, воспитаніе. Рѣшеніе женскаго вопроса. Книга для матерей и воспитательницъ. Второе изданіе. С.-Петербургъ, 1873. Цѣна 1 р. 75 к., съ пересылкою 2 р.

— Предохранительное средство отъ оспы, основанное на дознанныхъ фактахъ. Цѣна 20 к., съ пересылкою 25 к.

— Гомеопатическое леченіе холеры. Краткое руководство для врачей и неврачей. Изданіе Ф. Флемминга. С.-Петербургъ, 1866. Цѣна 20 к., съ пересылкою 25 к.

— Сборникъ народноврачебныхъ средствъ знахарями въ Россіи употребляемыхъ. С.-Петербургъ, 1866. Цѣна 1 р. 50 к., за пересылку 25 к.

— О знахаряхъ. Священникамъ и грамотнымъ людямъ. О домашнемъ леченіи въ народѣ. С.-Петербургъ, 1862. Цѣна 10 к., съ пересылкою 15 к.

Де-феръ. О месмеризмѣ. Переводъ съ французскаго. С.-Петербургъ, 1827. Цѣна 30 к. съ пересылкою.

Журналъ гомеопатическаго леченія. Годы: 1861, 1862 и 1863. Цѣна: одинъ годъ 3 р., всѣ 3 года 6 р. съ пересылкою.

Журналъ С.-Петербургскаго Общества врачей-гомеопатовъ 1872 и 1873/4 годъ по 4 р., оба вмѣстѣ 6 рублей.

Каспари. Гомеопатическій домашній и дорожный лечебникъ, дополненный д-ромъ Ф. Гартманомъ. Переводъ съ седьмага нѣмецкаго изданія. Москва, 1847. Цѣна 1 р., за пересылку 25 к.

Крозерию. Гомеопатическое пособіе беременнымъ и роженицамъ. С.-Петербургъ, 1862. Цѣна 50 к., съ пересылкою 60 к.

Лори. 12 главныхъ гомеопатическихъ лекарствъ и ихъ примѣненіе къ леченію обыкновенныхъ болѣзней. Популярное руководство, переводъ съ 8-го англійскаго изданія, съ прибавленіями д-ра А. Рида. Москва, 1874. Цѣна 50 к. сер.

Маклаковъ. Опытъ приложенія гомеопатіи къ леченію. (Изъ замѣтокъ врача-аллопата). Москва, 1854. Цѣна 50 к., за перес. 20 к.

Миллеръ и Дерикеръ. Домашній гомеопатическій лечебникъ, или наставленіе къ пользованію болѣзней гомеопатическими средствами. Пятое изданіе. С.-Петербургъ, 1876. Цѣна 1 р. 75 к.; въ красивомъ переплетѣ 2 р. 25 к., за пересылку 25 к.

Миллеръ. Характеристика тридцати важнѣйшихъ гомеопатическихъ лекарствъ для облегченія ихъ употребленія въ болѣзняхъ, перевелъ съ нѣмецкаго д-ръ медицины В.

Дитманъ, изданіе Ф. Флемминга. С.-Петербургъ, 1874. Цѣна 75 к. Къ ней имѣются аптечки въ капляхъ, въ которыхъ помѣщаются мѣрочка для чайныхъ и столовыхъ ложекъ и облатки для дачи лекарствъ. Цѣна 9 руб., на пересылку за 8 фунтовъ, а также карманныя аптечки въ крупинкахъ, которымъ цѣна 8 рублей, на пересылку за 4 фунта.

Молинали. Общепонятный гомеопатическій лечебникъ, составленный по новѣйшимъ гомеопатическимъ сочиненіямъ. Москва, 1860. Цѣна 1 р., съ пересылкою 1 р. 30 к.

Наставленіе относительно діетическихъ предосторожностей, требуемыхъ при гомеопатическомъ леченіи. 1856. Цѣна 25 к., съ пересылкою 30 к.

Письмо къ пріятелю о гомеопатіи и гомеопатическомъ леченіи съ приложеніемъ исторіи болѣзни Н. П. Р., продолжавшейся 20 лѣтъ и излеченной по гомеопатической методѣ. Москва, 1852. Цѣна 40 к., за пересылку 10 к.

Программа для нагляднаго убѣжденія въ дѣйствительности гомеопатическаго леченія и въ возможности допустить гомеопатію, какъ врачебное искусство, профессоровъ Козлова и Здекауера, и отвѣты гомеопатовъ, д-ровъ А. фонъ-Гюббенета, Бека, К. Боянуса и К. фонъ-Виллерса. Въ переводѣ и подѣ

редакціей *В. Дерикера*. С.-Петербургъ, 1863. Цѣна 75 к., за пересылку 25 к.

Розенбергъ. Гомеопатическая діѣта, или краткое указаніе образа жизни и діѣты, необходимыхъ во время леченія, и правилъ при разсказѣ врачу о своей болѣзни. Переводъ съ нѣмецкаго. Москва, 1850. Цѣна 30 к., съ пересылкою 35 к.

Рюкертъ. Обзоръніе въ таблицахъ гомеопатическихкихъ средствъ, ихъ обыкновенной степени разжиженія, величины приѣмовъ, продолженія времени дѣйствія въ острыхъ и хроническихъ болѣзняхъ, антидотовъ и дѣйствій ихъ на человѣческое тѣло, въ облегченіи употребленія гомеопатическихкихъ сочиненій для начинающихъ врачей и неврачей, въ двухъ таблицахъ. Москва, 1836. Цѣна 1 р. 43 к., за пересылку 30 к.

Шарпъ. Что такое гомеопатія? Переводъ съ англійскаго. С.-Петербургъ, 1856. Ц. 10 к. съ пересылкою 15 к.

Шенмель. Гомеопатическій домашній лечебникъ Москва, 1861. Цѣна 1 р. 25 к., за пересылку 25 к., а вмѣстѣ съ аптечкою 10 руб.

Шеферъ, Гомеопатическій скотолечебникъ, составленный для леченія болѣзней лошадей, рогатаго скота, овецъ, свиней, собакъ и домашнихъ птицъ. Москва, 1860. Цѣна 1 р. 50 к., за пересылку 25 к. Аптечка съ бо-

лѣе употребительными лекарствами 15 р., полная — 28 р. съ пересылкою и вмѣстѣ съ лечебникомъ.

Шреберъ. Врачебно-комнатная гимнастика, или изображеніе и описаніе врачебно-гимнастическихъ движеній, не требующихъ ни снарядовъ, ни пособій, и потому всегда и вездѣ удобоисполнимымъ для всякаго возраста и пола. Съ 45 изображеніями. Переводъ съ нѣмецкаго. Москва, 1859. Цѣна 75 к., съ пересылкою 1 р.

Яръ. Гомеопатическая позологія, или правила о приѣмахъ лекарствъ, съ краткимъ наставленіемъ для употребленія электричества, гальванизма и магнита. Переводъ съ французскаго. Москва, 1855. Цѣна 50 к., за пересылку 25 к.

— Клиническія наставленія, какъ пользоваться болѣзнями по гомеопатическому способу, или полный гомеопатическій лечебникъ для врачей и неврачей, съ характеристическимъ очеркомъ важнѣйшихъ гомеопатическихъ средствъ и алфавитнымъ указателемъ. Переводъ съ нѣмецкаго. С.-Петербургъ, 1876. Второе изданіе. Цѣна 3 р. 50 к., на пересылку за 3 фунта.

— Первоначальныя понятія о гомеопатіи и о способахъ ея употребленія, съ описаніемъ дѣйствій десяти гомеопатическихъ средствъ. Переводъ съ французскаго. Мос-

ква, 1852. Цѣна 75 к.; вмѣстѣ съ лекарствами и пересылкою 5 р.

Ярѣ. Руководство къ гомеопатической медицинѣ, переводъ съ французскаго. 4 тома. Москва, 1850. Цѣна 10 р., на пересылку за 8 фунтовъ.

НА ПОЛЬСКОМЪ ЯЗЫКѢ.

Cechy trzydziestu wazniejszych homeopatycznych lekarstw dla ulatwienia uzycia onych w chorobach przez D-ra medycyny K. Millera. przekład z niemieckiego wydanie T. Flemminga. St.-Petersburg. 1875. Cena 75 c.

Cholery Azyatyckiej Homeopatyczny sposob leczenia, przez Antoniego Kaczkowskiego D-r med. We Lwowie 1872. Cena 30 c.

Domowy Lekarz-Homeopata czyli Poradnik jak leczyc zwyczajne choroby homeopatycznymi srodkami w (*nie obecność*) i do przybycia lekarza, napisany przez Dr Klotara Millera. Tłomaczenie z niemieckiego 1858. Cena 1 r. 50 c; z poczta 2 rub.

Kaczkowskiego, Antoniego. Poradnik dla Matek, o pielegnowaniu i wychowaniu dzieci oraz o leczeniu ich chorób od urodzenia do siódmego roku Lwow. 1874. Cena 1 r. 20 c.

Nauka homeopatyi Artura Lutzego, spolszczona za upowaznieniem autora opracowana, abeca-

dłowo (*uporząd kowana*), wtelce dodatkami pomnożona i wydana przez Doktora, medycyny i chirurgii Antoniego Koczkowskiego. Lwow. 1873. Cena 4 rubli spebrem, z przesyłka 4 r. 50 c.

O **uzyciu** ławni parowej przez D-ra Antoniego Koczkowskiego. Lwow. 1861. 15 c.

O **dyecie** homeopatyczne w łabosciach zapalnych chronicznych przez D-ra A. K. Lwow. 1861. 25 c.

Prezerwatywne srodki dla sabokienzenia 1. Zazie bydlecej, 2. ospie owozej; 3 wsciekłiznie, przez Antoniego Kaczowskiego. Lwow. 1866. 75 c.

Terapia Popularna czyli wskazanie sposobu radzenia sobie i innym w razie nieobecności lekarza i do przybycia tegoż, Srodkami nieszkodliwymi i najpewniejszymi ze wszystkich znanych metod, ale podług zasad i przepisow homeopatycznej szkoly. Napisana przez D-ra Stefana Kuczynskiego. Warszawa 1868. Cena 1 r. z przesyłka.

НА ФРАНЦУЗСКОМЪ ЯЗЫКѢ.

Bruckner et Schaedler. Médecine homoeopathique domestique. Leipsic. 1873. Prix 1, 75 c.

Chargé (A) L'Homoeopathie et ses détracteurs, à l'occasion de l'épidémie de choléra qui a régné à Marseille en 1854. Paris, 1855, in-8, 236 p. 1 r. 20 c.

Chargé. Traitement homoeopathique préservatif et curatif du choléra épidémique. Instruction populaire pouvant servir de guide en l'absence du médecin. 11^e édit. Paris, 1866, in-12. Prix 30 c.

Davasse. La Syphilis, ses formes, son unité 1865, 3 r. 25 c.

Espanet. (le frère Alexis). Traité méthodique et pratique de matière médicale et de thérapeutique, basé sur la loi de semblables. Paris, 1861, in-8 de XXXII—808 p. 3 r. 50 c.

Espanet D-r A. La pratique de homoeopathie simplifiée Paris. 1874. Prix 1 r. 80 c.

Gallavardin. Projet d'hopitaux mixtes allopathiques et homeopathiques, projet de dispensaires mixtes. Mémoire adressé à MM. les administrateurs des hopitaux in-8, 96 pages. Prix 75 c.

Günther. Nouveau manuel de médecine veterinaire homoeopathique, ou traitement homoeopathique des maladies du cheval, des bêtes bovines, des chèvres, des porcs et des chiens. Paris, 1871. 2 r. 40 c.

Hahnemann. Exposition de la doctrine médicale homoeopathique, ou Organon de l'art de guérir, par S. Hahnemann; traduit de l'allemand, sur la dernière édition, par le docteur A. J. L. Jourdan. Quatrième édition, augmentée de Commentaires, et précédée d'une notice sur la vie, les travaux et la doctrine de l'auteur, par le docteur Leon Simon, avec le portrait de S. Hahnemann, gravé sur acier. Paris, 1856, 1 vol. in-8 de 568 p. Prix 3 r.

Hahnemann (S). Doctrine et traitement homoeopathique des maladies chroniques. Traduit de l'allemand, sur la dernière édition, par A. J. L. Jourdan. Seconde édition, entièrement refondue et considérablement augmentée. Paris, 3 volumes. Prix 9 r.

Hartmann. Thérapeutique homoeopathique des maladies des enfants. Traduit de l'allemand, avec des notes par le docteur Leon Simon fils, membre de la Société médicale homoeopathique de France. 1 vol. in-8 de 700 pages. Prix 3 r.

Hering (G). Médecine homoeopathique domestique. Sixième édition française, traduite sur la sixième édition américaine, récemment publiée par l'auteur lui-même; revue, corrigée et augmentée d'un grand nombre d'additions tirées de la onzième édition allemande, et précédée d'indications générales d'hygiène et de prophylaxie 1873. Prix 2 r. 80 c.

Hirschel (B.). Guide de médecin homoeopathe au lit du malade, et Répertoire de thérapeutique homoeopathique. Traduit de l'allemand par le docteur Leon Simon 1874. Prix 2 r.

Jahr (G. H. G.). Principes et règles qui doivent guider dans la pratique de l'homoeopathie. Exposition raisonnée des points essentiels de la doctrine médicale de Hahnemann. Prix 2 r. 90 c.

— Nouveau manuel de médecine homoeopathique, divisé en deux parties: 1^o Manuel de matière médicale, ou résumé des principaux effets des médicaments homoeopathiques, avec indication des observation cliniques. 2^o Répertoire thérapeutique et symptomatologique ou Tables alphabétiques de principaux symptômes des médicaments homeopathiques, avec des avis cliniques. Huiptième édition, revue et considérablement augmentée. 4 vol. in-12. 1872. Prix 7 r. 20 c.

— Du traitement homoeopathique des maladies des organes de la digestion, comprenant un Précis d'hygiène générale, et suivi d'un Répertoire diététique à l'usage de toutes les personnes qui veulent suivre le régime rationnel de la methode de Hahnemann. in-18 jésus, XII—520 pages. Prix 2 r. 40 c.

— Du traitement homoeopathique des maladies de la peau et des lésions extérieures en général. 1 vol. in-8, XVI—608 pages. Prix 2 r. 40 c.

Jahr. Du traitement homoeopathique des maladies des femmes. Prix 2 r. 40 c.

— Du traitement homoeopathique des affections nerveuses et des maladies mentales Prix 2 r. 40 c.

— **et Catelan (A.).** Nouvelle Pharmacopée homoeopathique ou Histoire naturelle et préparation des médicaments homoeopathique, et Posologú ou de l'administration des doses. Troisième édition, revue et considérablement augmentée, accompagnée 140 figures intercalées dans le texte. Prix 2 r. 80 c.

Jusset (P.). Éléments de médecine pratique, contenant le traitement homoeopathique de chaque maladie, par le docteur P. Jusset. Paris, 1868, 2 vol. Prix 6 r.

Noack fils. Guide homoeopathique domestique à l'usage des familles. Lyon, 1865, in-8, 264 p. Prix 1 r. 60 c.

Nunez. Etude médicale sur le venin de la tarentule d'après la méthode de Hahnemann, précédée d'un résumé historique du tarantulisme et du tarantisme, et suivie de quelques indications thérapeutiques et de notes cliniques par le marquis Joseph Nunez, médecin de S. M. la reine d'Espagne; traduite par le docteur J. Perry. Paris, 1866, 1 vol. in-8, 268 p., avec, fig. Prix 1 r. 50 c.

Petit guide homoeopathique, contenant les indications nécessaires pour l'emploi des princi-

paux remèdes homoeopathique dans les maladies les plus ordinaires par D-r Bruckner. 1872 Prix 60 c.

Prost-Lacuzon (S.). Formulaire pathogénétique usuel ou Guide homoeopathique, pour traiter soi-même les maladies. Deuxième édition, corrigée et augmentée. Prix. 2 r. 60 c.

— **et-Berger.** Dictionnaire veterinaire homoeopathique. Paris, 1865, 2 r. 40 c.

Regard D-r. Quelques mots sur les specifics du comte Mattei. Petit guide pratique pour l'emploi de ces remèdes. Genève 1872. Prix 60 c. arg.

Simon (Leon) fils. Des maladies vénériennes et de leur traitement homoeopathique. Prix 2 r. 40 c.

Simon (Léon). Leçons de Médecine homoeopathique. Prix 3 r.

Teste. Systématisation pratique de la matière médicale homoeopathique. Prix 3 r.

— Traitement homoeopathique des maladies aiguës et des maladies chronique des enfants. Deuxième édition, revue et augmentée. Prix 1 r. 60 c.

НА НѢМЕЦКОМЪ ЯЗЫКѢ.

Anleitung zur sicheren und schnellen Heilung der Cholera für verständige Leute und angehende

homoeopathische Aerzte, von D-r Bolle. Aachen 1866. Preis 60 c.

Bähr (D-r Bernhard). Die Therapie nach den Grundsätzen der Homöopathie, 2 Theile. Leipzig, 1862. Preis 12 r.

Caspari's homöopathischer Haus und Reisearzt. Mit besonderer Berücksichtigung der Frauen und Kinderkrankheiten 1 r. 50 c.

Charakteristik von 30 des wichtigsten hom. Heilmittel. Behufs ihrer Anwendung in den gewöhnlichsten Erkrankungsfällen von Dr Clotar Müller, Leipzig, 1873. Preis broch. 60 c., geb. 75 c.

Der Hausthierarzt. Die Krankheiten der Pferde, Rinder, Schafe, Ziegen, Schweine, Hunde und des Federviehes, Herausgegeben von Dr. W. L. Schwabe, 2-te vermehrte und verbesserte Auflage mit 50 Abbildungen. Eingebunden 2 Rbl.

Das Naturwidrige der allopathischen Behandlung des wirklichen Croups, der Hirnentzündung der Kinder, der Rachenbräune und der mehr oder weniger Lebensgefährlichen Stuhlverhaltung, von D-r Wilhelm Elwert. Hannover, 1866. Preis 30 c.

Die Cholera, eine epidemische Lähmung der Darmschleimhaut und ihrer Nerven, von D-r Johannes Schweikert. Preis 60 c.

Die homoeopathischen Thier-Arzneimittel, deren Bereitung, physiologische Wirkung und

klinische Anweisung, für Thierärzte und gebildete Landwirthe, von Carl Boehm. Wien, 1867. Preis 1 r. 50 c.

Die Magenschmerzen, ins besondere der Magenkrampf — Gastrodynie, auch Cardialgie genannt — ihre Auffassung und Behandlung nach homöopathischen Grundsätzen, von D-r Bernhard Hirshel. Leipzig, 1866. Preis 2 r.

Der homoeopathische Haus und Familienarzt. Eine Darstellung der Grundsätze der Homoeopathie zur Heilung der Krankheiten, von D-r Clotar Müller, 9-te vermehrte und verbesserte Auflage. Leipzig, 1874. Preis 1 r. 50 c.

Der homoeopathische Arzneischatz, in seiner Anwendung am Krankenbette, von D-r B. Hirschel; 10-te verbesserte und vermehrte Auflage. Leipzig, 1875. Preis 2 r.

Günther. D-r F. A. der homoeopathische Hausfreund. Ein Hülfsbuch für alle Hausväter, welche die am häufigsten vorkommenden Menschlichen Krankheiten in Abwesenheit oder Ermangelung des Arztes, schnell, sicher und wohlfeil selbst heilen wollen. 3 Bände. I Band, die Krankheiten des Erwachsenen. II Band, die Kinderkrankheiten. III Band, die Frauenkrankheiten. Preis jedes Bandes. 2 Rb. Lübeck 1873.

— homoeopathischer Thierarzt: 1 Theil. Die Krankheiten des Pferdes und ihre homoeo-

pathische Heilung; 12-te vermehrte und verbesserte Auflage. 2 Theil. Die Krankheiten der Rinder, Schafe, Schweine, Ziegen und Hunde und ihre homoeopathische Heilung; 11-te vermehrte und verbesserte Auflage. Sonderhausen, 1870. Für jeden Band Preis 2 r.

Gullon Dr. K. Die Krankheiten der ersten Lebensjahre und ihre homoeopathische Behandlung nach eigenen Erfahrungen. Leipzig, 1869. W. Schwabe. Preis 50 cop.

Hering. Homoeopathischer Hausarzt. Nach den besten homoeopathischen Werken und eignen Erfahrungen bearbeitet. 12 Auflage, durch eine Anweisung zur Lebensordnung und zum Berichterstatten und einen Arzneinachweiser vermehrt. Jena. 1869. Preis 2 r.

Hübner. Der homoeopathische Thierarzt. Ein praktischer Rathgeber für alle Viehbesitzer, welche die Krankheiten ihrer Pferde, Rinder, Schafe, Schweine, Ziegen und Hunde schnell, sicher und wohlfeil selbst heilen wollen. Nach langjährigen eigenen Erfahrungen und unter Benutzung der besten Hülfsmittel bearbeitet. Mit 5 Holzschnitten, 6-te Auflage. Berlin. Preis 2 r. 50 c.

Hirsch (D-r J.). Homoeopatischer Arzt in der Kinderstube. Leipzig, 1865. Preis 2 r.

Jahr's D-r G. H. Therapeutischer Leitfaden für angehende Homöopathen. Zusammenfassung eigener Beobachtungen in einer mehr als

vierzigjährigen Praxis über die als wahrhaft gültig bewährten Heilanzeigen in vorkommenden Krankheitsfällen nebst kritischen Bemerkungen und Zusätzen zu Rückert's Klinischen Erfahrungen. Leipzig, 1869. 2 r.

Kafka (D-r J.). Die homoeopatische Therapie auf Grundlage der physiologischen Schule. Ein practisches Handbuch für Aerzte. 1868. 2 Theile. 18 r.

Klinische Anweisungen zu homoeopathischer Behandlung der Krankheiten. Ein vollständiges Taschenbuch der homoeopathischen Therapie für Aerzte und Verehrer dieser Heilmethode, nach den bisherigen Erfahrungen, bearbeitet von D-r G. H. Jahr; 3-te verbesserte und vermehrte Auflage. Nebst einer Einleitung, enthaltend Winke für die Praxis, einer Charakteristik der wichtigsten Mittel und systematischer Inhaltsübersicht. Leipzig. 1867. Preis 3 r. 75 c.

Kurze Anleitung zum richtigen Gebrauch der wichtigsten homoeopathischen Arzneimittel in den leichteren Erkrankungsfällen, von D-r Th. Bruckner. 2-te Aufl. Leipzig, 1864. Preis 50 c.

Lehrbuch der Homoeopathie von D r von Grauvogl. Zwei Theile. Nürnberg, 1866. Preis 6 r.

Lehrbuch der Homoeopathie von Arthur Lütze 7-te vermehrte Auflage. Cöthen, 1874. Preis 3 r. 25 c.

Populäre Anleitung zur Kenntniss und Beurthei-

lung der Heilkunde im Allgemeinen und der Homoeopathie im Besondern, von D-r Bolle. 1 Theil. Wie lernen die Allopathen und Homoeopathen die Wirkungen der Arzneien erkennen? Aachen, 1866. Preis 1 r. 20 c.

Was ist Allopathie und was ist Homöopathie. Ein öffentlicher Vortrag, gehalten am 22 Februar 1871 im Saale des oberen Museum's zu Stuttgart von D-r E. Walser. 75 c.

Wislicenus. Entwicklung eines wahrhaft physiologischen Heilverfahrens. Preis 3 r. 60 c.

Populäre Zeitschrift für Homöopathie. Herausgegeben von D-r W. Schwabe in Leipzig. Jährlich 12 Nummern. 1 r. 50 c.

Prinzipien der Homöopathie, nebst erläuternden pharmakologischen Studien für Aerzte und Studirende der Medizin, von D-r med. Carl Heinigke. Leipzig 1871. 1 Rb.

Praktische Beiträge zur Arzneimittellehre enthaltend die neuesten Erfahrungen über die Heilanzeigen, von D-r A. Raron Leipzig, 1872. Preis 75 c.

Preussendorff, D-r Georg. Kurze Darstellung der Heilung des Zahnschmerzes, nach der neueren Heilmethode. Kosten, 1868. Preis 30 Cop.

Zimpel Ch. F. die vegetabilische Elektricität zu Heilzwecken und die homoeopathisch vegetabilischen Heilmittel des Grafen Cesare Mattei. Leipzig. W. Schrage 1869. Preis 75 Cop.

НА АНГЛІЙСКОМЪ ЯЗЫКѢ.

- Laurie's.** Epitome of the „Homoeopathic Domestic Medicine“ Twenty-fourth Edition. 2 r. 60 c.
- The homoeopathic domestic Medicine,** by Joseph Laurie. M. Dr. Nineteenth editon. London, 1869. 9 r.
- The homoeopathic guide for Family use** by Dr. Laurie M. London. 75 c.
- The homoeopathic domestic Physicain,** by C. Hering M. D. 5 r.
- The Text-Book of Veterinary homoeopathic Practice:** Containing a Description of the Diseases of the Horse, Dog, Ox, Cow, Sheep and Pig. Second Edition. 2 Rb.
- Homoeopathie domestic Practice** by E. Guernsey. London 3 r.
- Jahr's** Pocket Dictionary, Concordance and Repertory of Homoeopathic Practice. 4 r. 75 c.
- D-r Ruddock.** Homeopathic Vade Mecum Medical and Surgical, 1872. 5 r. 25 c.
- The Common Diseases of Women, 1872. 75 c.
 - Stepping-Stone to Homoeopathy and Health 1872. 60 c.
 - Lady's Manual of Homoeopathic Treatment 1872. 1 r. 80 c.
- Ruddock D. E. H.** On Consumption and Tuberculosis of the hunds, heir diagnosis, causes, and preventive, and general treatement II Edition. London. 1873. 85 Cop.
-

18

Цѣна 1 р. 75 к.

8
и





2012401359